

Observation d'un bécassin *Limnodromus* sp. dans les Landes

Frédéric CAZABAN

Le genre *Limnodromus* regroupe trois espèces appartenant à la famille des *Scolopacidae* :

- Bécassin à bec court *Limnodromus griseus* ;
- Bécassin à long bec *Limnodromus scolopaceus* ;
- Bécassin d'Asie *Limnodromus semipalmatus*.

Les bécassins nichent dans les marais des régions situées entre le nord-est de la Sibérie et la baie d'Hudson et hivernent sur les côtes s'étendant du sud des États-Unis au nord de l'Amérique du Sud. Le Bécassin à long bec a une zone de nidification plus concentrée au nord-ouest que le Bécassin à bec court. (DEL HOYO *et al.*, 1996).

DESCRIPTION DE L'OBSERVATION


L'observation a été réalisée le vendredi 10 octobre 2008 en fin d'après-midi sur la réserve de faune sauvage de Saint-Martin-de-Seignanx (Landes - 40). À cette époque, le site voit passer nombre d'oiseaux en halte migratoire bientôt suivis par les hivernants.

Ce jour-là, une fois ma première analyse de la réserve effectuée à la longue-vue, je décide de revenir sur un Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* repéré quelques minutes auparavant, ce dernier étant un oiseau rare du lieu. Je remarque alors un petit limicole en train de sonder la vase à la façon d'une bécassine. Dès les premiers instants je me rends compte qu'il n'en est rien par l'absence de bretelles claires sur le dos et une coloration générale brun-gris. Je pense alors à une barge mais la présence de Vanneaux huppés *Vanellus vanellus* proches m'indique que la taille de l'oiseau est de loin inférieure à ces derniers. Je comprends alors qu'il est temps de prendre des notes, pressé par la tombée de la nuit.

Quelques photos de très mauvaise qualité ont permis de se rendre compte du gabarit de l'oiseau, de son comportement alimentaire et de quelques contrastes du plumage. En plus des photos que je savais quasiment inexploitables au vu de la lumière ambiante, j'ai essayé de croquer le limicole en essayant de faire ressortir les traits les plus marquants (voir croquis de terrain ci-contre).

En parallèle, j'ai noté les détails suivants :

- long bec noir disproportionné ;
- calotte sombre, sourcil long plus clair ;
- lores sombres se poursuivant en ligne sombre jusque loin derrière l'œil ;



Croquis de terrain du bécassin *sp.*

- haut sur pattes mais plus petit que le Vanneau huppé ; la coloration des pattes n'a pu être notée, ces dernières étant sous l'eau ;
- ventre clair uni, cou et poitrine blanc sale / gris ;
- dos marron / gris, scapulaires à plumes du centre noirâtres et bordure plus claire (chamois) ;
- lorsqu'il étend sa queue : pas de zone blanche sur la queue, mais zones sombres grisées ou noires ;
- dessous des ailes blanc sale ;
- assez trapu, pas de projection primaire et rémiges ne dépassent pas la queue.

L'observation a duré une quinzaine de minutes avant l'envol de l'oiseau en compagnie de vanneaux. Le crépuscule étant bien avancé, il ne m'a pas été permis de noter quoi que ce soit des détails du plumage en vol. Un cri un peu plus haut que les autres, rappelant le Chevalier arlequin *Tringa erythropus* m'a bien interpellé mais le lendemain j'observai également cette espèce sur le site, ne me permettant pas d'affirmer de qui provenait ce cri. J'apprendrai par la suite que le cri du Bécassin à long bec ressemble assez à celui du Chevalier arlequin. Mais je ne puis conclure par manque d'expérience et par un souvenir trop flou de ce cri. De fait, les critères ne me permettent pas de statuer avec certitude sur l'espèce mais simplement sur le genre *Limnodromus*.

DISCUSSION

En Europe, 257 mentions de Bécassin à long bec ont été répertoriées et 4 mentions pour le Bécassin à bec court (MITCHELL & YOUNG, 1997).

Les bécassins sont des espèces occasionnelles à occurrence non annuelle en France. De 1976 à 2005, 51 mentions du genre *Limnodromus* ont été répertoriées soit 9 % des observations européennes (pour comparaison, 71 % des données proviennent des îles britanniques) (DUBOIS *et al.*, 2008) :

- 30 concernent le Bécassin à long bec ;
- 1 concerne le Bécassin à bec court ;
- 20 concernent un bécassin non spécifiquement identifié.

En Espagne les bécassins ont également le statut d'oiseaux occasionnels. De 1975 à 2005 ont été reconnues (DE JUANA, 2006) :

- 10 mentions de Bécassins à long bec ;
- 1 mention (douteuse) de 3 oiseaux ensemble de Bécassin à bec court ;
- 9 mentions de *Limnodromus sp.*

En Aquitaine, une seule mention de *Limnodromus* a été homologuée, elle concerne un Bécassin à long bec observé le 7 mai 1997 sur le Domaine de Certes à Audenge – 33. (DUBOIS, FREMONT & le C.H.N., 1998).

L'observation discutée ici correspond donc à la deuxième mention du genre *Limnodromus* en Aquitaine et la première pour la période automnale.

Les observations françaises se distribuent pour la grande majorité de fin août à la deuxième décennie d'octobre. L'observation de Saint-Martin-de-Seignanx correspond à la période d'occurrence maximale de l'espèce, qui s'étend de fin septembre à mi-octobre.

Pour le reste notons une seule donnée hivernale dans le Finistère et 4 données printanières (du 24 avril au 8 mai).

CONCLUSION

Cette observation de bécassin s'intègre dans un contexte d'un fort afflux de limicoles néarctiques constaté cet automne 2008 sur le littoral français. Précisons que cette donnée à l'heure de l'écriture de cette note n'a pas encore été validée en tant que *Limnodromus sp.* par le Comité d'Homologation National.

Summary - Record of a Dowitcher *Limnodromus sp.* in the department of the Landes

A Dowitcher of an unidentified species was recorded on 10/10/2008 at Saint-Martin-de-Seignanx. Dowitchers are occasional species in France and are not annual occurrences. This sighting, the second for Aquitaine, occurred during the maximal period when this species occurs in France. It is also noted that at the same time there were a number of Nearctic species recorded on the french coasts.

Resumen - Observación de una Agujeta *Limnodromus sp.* en los Landes

Una Agujeta que no ha podido ser identificada con certeza fue observada el 10/10/2008 en Saint-Martin-de-Seignanx. Las Agujetas son especies de presencia muy ocasional en Francia. Esta observación, la segunda en Aquitania coincidió con la temporada de aparición máxima de la especie en Francia. Podemos destacar también que al mismo tiempo hubo invasión de especies neárticas en la costa francesa.

Bibliographie

- DE JUANA E., 2006. *Aves raras de España : un catálogo de las especies de presentación ocasional*. Lynx Edicions, Barcelone, 473 p.
- DEL HOYO J., ELLIOTT A. & SARGATAL J., 1996. *Handbook of the Birds of the World - Vol 3 : Hoatzin to Auks*. Lynx Edicions, Barcelone, 821 p.
- DUBOIS P.-J., FREMONT J.-Y. & le C.H.N., 1998. Les oiseaux rares en France en 1997. rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos*, 5 (4) : 153-179.
- DUBOIS P.-J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YESOU P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, Paris, 560 p.
- MITCHELL D. & YOUNG S., 1999. *Photographic Handbook of the Rare Birds of Britain and Europe*. New Holland, Londres, 191 p.

Frédéric CAZABAN : 403, résidence les Abélias, chemin les Abélias, 40390 St Martin de Hinx
fczaban@yahoo.fr