

# Découverte de l'hivernage du Pipit de Richard *Anthus richardi* sur le littoral basque

Stéphane DUCHATEAU & Jean-Bernard ETCHEBARNE

**Résumé** – L'hivernage du Pipit de Richard a été observé sur l'aéroport de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) d'octobre 2009 à avril 2010, avec un effectif maximal de 4 individus. Les précédentes mentions régionales de cette espèce rare sont rappelées, de même que les quelques cas d'hivernage documentés en France.

Le Pipit de Richard *Anthus richardi* se reproduit en Russie orientale, dans l'est du Kazakhstan, en Mongolie et en Chine ; il hiverne principalement en Asie du Sud (DEL HOYO, ELLIOTT & CHRISTIE, 2004). Le passage régulier de l'espèce en Europe occidentale et les observations en période hivernale en Espagne (principalement sur les Îles Baléares et les régions côtières de Galice et des Asturies), au Portugal, en Sicile, en Italie, au Maroc et en Afrique sahélienne indiquent qu'une zone d'hivernage secondaire existe dans ces régions (DE JUANA, 2006).

En France, pour DUBOIS & al. (2008), c'est un migrateur rare, hivernant très rare mais régulier dans le Midi. La plupart des 309 observations recensées dans notre pays de 1900 à 2005 concernent les départements littoraux, de la frontière belge aux Pyrénées-Atlantiques et secondairement la zone méditerranéenne. Près de 80 % des observations ont été effectuées à l'automne, le passage postnuptial s'étendant de début septembre à mi-décembre avec un maximum d'intensité de fin septembre à fin octobre. Les dates extrêmes d'observation en France sont le 26 août 1975 dans le Pas-de-Calais et le 11 mai 2001 en Vendée.

## LES OBSERVATIONS

Le 9 octobre 2009, alors que nous recensons les oiseaux présents sur l'aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) dans le cadre d'un inventaire ornithologique destiné à améliorer les méthodes de lutte contre le risque aviaire, notre attention est attirée par un pipit survolant à faible hauteur les pelouses et s'y posant. La grande taille, la queue longue et le cri particulier (un bref « *piu* ! » évoquant le Moineau domestique *Passer domesticus*) nous permettent d'éliminer les espèces les plus communes, y compris le Pipit rousseline *Anthus campestris* de taille inférieure et au cri bien distinct. Notre suspicion d'un Pipit de Richard est confirmée à l'écoute d'enregistrements de cris de cette espèce.

Notre visite suivante, le 28 octobre, ne permet pas l'observation de l'espèce. Le 24 novembre, 2 Pipits de Richard sont observés posés sur le site (nous notons alors leur allure de grive, due à leur grande taille et à leur tête souvent dressée, le bec relevé), puis l'hivernage est confirmé au fil des visites suivantes : au moins 2 individus contactés le 27 janvier et le 19 février 2010. L'information ayant été communiquée aux naturalistes locaux, des observations complémentaires pour le site nous sont parvenues : 3 le 28 novembre (F. CAZABAN, X. BAILHES), 2 le 1<sup>er</sup> décembre (A. NERRIÈRE), 3

le 31 janvier (A. NERRIÈRE), 4 le 2 février (A. NERRIÈRE, J.-L. GRANGÉ), 4 le 14 février (F. CAZABAN, S. TILLO, L. GOYENECHÉ), 3 le 14 mars (F. CAZABAN) et 2 le 1<sup>er</sup> avril (A. NERRIÈRE).

J.-L. GRANGÉ et S. DUCHATEAU ont de nouveau observé 2 Pipits de Richard sur l'aéroport d'Anglet le 26 octobre 2010, puis 3 individus y ont été signalés le 4 décembre (S. TILLO, F. CAZABAN, P. LEGAY) et au moins 1 le lendemain (P. LEGAY), laissant augurer un nouvel hivernage sur le site. Le milieu fréquenté par ces pipits est une vaste prairie plane située de part et d'autre des pistes de l'aéroport, en l'occurrence dans sa partie est. Les différentes hauteurs de fauche et le sol plus ou moins compacté et humide induisent une certaine variation dans la composition et la densité de la prairie. Il nous a semblé que les Pipits de Richard appréciaient plus particulièrement les zones de prairie maigre où une strate herbacée basse est complétée par des touffes plus hautes en moindre densité. Des Pipits farlouses *Anthus Pratensis* fréquentent également ces lieux ; les deux espèces sont parfois temporairement réunies mais ne forment pas de troupes mixtes aux mouvements coordonnés.

## LES AUTRES CAS D'HIVERNAGE EN FRANCE

Le premier cas prouvé d'hivernage en France date de l'hiver 1991-1992 à Puygaillard-de-Quercy dans le Tarn-et-Garonne, site où un individu avait déjà été noté en janvier, mars et avril 1991 (REDON, 1992). De nouveaux sites d'hivernage ont par la suite été découverts : aérodrome d'Agen (Lot-et-Garonne) durant les hivers 1995-1996 et 1996-1997 (DULAU, 1997), plaine de la Crau (Bouches-du-Rhône) à partir de l'hiver 1995-1996, avec jusqu'à 17 individus en 2004-2005, baie de Somme (novembre-décembre 1996), Manche (décembre 2002-février 2003), Pyrénées-Orientales (hivers 2003-2004 et 2004-2005, PEIGNOT, 2004 & 2005) et Vendée (décembre 2005-janvier 2006). Des observations hivernales ponctuelles existent aussi dans le Calvados, l'Ain, le Var et en Corse-du-Sud (DUBOIS & *al.*, *op. cit.* ; DULAU, *op. cit.*).

L'aéroport d'Anglet constitue donc l'un des très rares sites d'hivernage du Pipit de Richard en France. Ce site n'ayant guère fait l'objet de visites par des ornithologues au cours des années précédentes, il est difficile de savoir si la présence de l'espèce y est un fait récent ou si une tradition de stationnement postnuptial et/ou d'hivernage y existe depuis plus longtemps. Cette remarque semble également valable pour le reste du pays, la recrudescence des mentions de cette espèce pouvant tout autant être attribuée à une plus forte pression d'observation qu'à une augmentation de ses effectifs.

## LES MENTIONS ANTÉRIEURES DANS LE BASSIN DE L'ADOUR

Plusieurs auteurs anciens signalent la présence du Pipit de Richard dans le bassin de l'Adour. LOCHE (1852) en capture plusieurs dans les environs de Bayonne du 20 septembre au 10 décembre 1851 (date tardive laissant envisager un début d'hivernage) ; il indique que « *ces oiseaux d'un naturel excessivement farouche, sont seulement de passage dans ce pays, où je n'ai jamais rencontré ensemble plus de deux individus (...). J'ai trouvé les quelques individus que j'ai tués, dans de vastes prairies avoisinant des champs de maïs : tous étaient très-maigres, et je n'ai trouvé dans leur estomac que quelques débris de fourmis* ». DUBALEN (1876) mentionne l'espèce comme « *de passage régulier en septembre et octobre. Se rencontre dans les herbages près des étangs, et dans les prairies qui bordent les grands cours d'eau : Royan, Blaye, Arcachon, Cazaux, Bayonne, Saint-Jean-de-Luz* » ; dans un travail ultérieur (DUBALEN, 1890-1892) il qualifie ce pipit d'assez rare et rajoute les mois de mars et avril pour le passage pré-nuptial. Les affirmations de PHILIPPE (1873) pour les Hautes-Pyrénées semblent plus fantaisistes : « *Le Pipit richard nous arrive accidentellement en juin et repart en septembre. C'est un oiseau très sauvage* ». GRANGER (1893) indique enfin que l'espèce est « *peu commune ; de passage régulier en septembre et octobre dans toute la région littorale* ».

Plus récemment, les bilans d'activité du centre régional de baguage de Biarritz (BARRIÉTY, 1960 & 1962) mentionnent la capture de 13 individus de 1953 à 1961 (5 de 1953 à 1957, 5 en 1958, 3 en 1959, aucun en 1960 et 1961). L'activité de ce centre couvrait les départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées.

Les autres données connues pour le bassin de l'Adour sont les suivantes :

- 5 individus bagués au Domaine d'Abbadia à Hendaye (64) entre fin septembre et début octobre 1974 par une équipe britannique (CARBONNAUX, 2005)
- 1 capturé à Ahetze (64) le 8/10/1979 (conservé au Musée de la Mer de Biarritz)
- 1 à Tarnos (40) le 7/11/1989 (J.S. DEVISSE)
- 1 à Orx (40) le 6/11/1990 (J.L. GRANGÉ)
- 1 à Saint-Laurent-de-Gosse (40) le 14/02/1993 (P. GRISSER)
- 1 à Estérençuby (64) le 27/09/1994 (H. VIGOUREUX)
- 1 à Rivière-Saas-et-Gourby (40) le 15/11/2005 (D. GENOUD)
- 2 migrateurs au Courant d'Huchet (40) le 12/11/2009 (S. TILLO)
- 1 au Courant d'Huchet (40) le 24/11/2009, se pose sur la dune (S. TILLO)
- 2 sur la plage de Bidart (64) le 24/10/2010 (A. NERRIÈRE)
- 1 sur la dune à Capbreton (40) le 12/11/2010 (S. TILLO)

En conclusion, le Pipit de Richard semble de passage régulier en automne dans le bassin de l'Adour, la plupart des données étant comprises entre la fin septembre et la fin novembre. La mention de février dans la tourbière de Saint-Laurent-de-Gosse pouvait concerner un hivernant. Une présence plus accrue des ornithologues sur le littoral basco-landais depuis la fin des années 1980 mais surtout ces deux dernières années, paraît expliquer le mieux l'augmentation du nombre d'observations. L'hivernage de l'espèce reste sans doute rare dans notre région, bien qu'une prospection plus régulière des milieux prairiaux (aéroports, corniche basque, barthes de l'Adour...) puisse permettre la découverte de nouveaux cas.

## Remerciements

Ils s'adressent aux différents naturalistes nous ayant communiqué leurs observations de ces oiseaux, ainsi qu'au syndicat gestionnaire de l'aéroport pour nous avoir facilité l'accès au site.

---

### Summary – Discovery of the overwintering of the Richard's Pipit *Anthus richardi* on the Basque coast

The overwintering of the Richard's Pipit *Anthus richardi* was observed on the airport at Biarritz in the department of the Pyrénées-Atlantiques from October 2009 to April 2010, with a maximum of four birds. The previous regional records of this rare species are noted as well as other cases of its overwintering in France.

### Resumen – El descubrimiento de la invernada de la Bisbita de Richard *Anthus richardi* en la costa vasca

Cita de la Bisbita de Richard *Anthus richardi* invernante en el aeropuerto de Biarritz (Pirineos Atlánticos) con un máximo de cuatro individuos entre octubre de 2009 y abril del 2011. Se recaudan las citas anteriores así como los casos de invernantes.

---

## Bibliographie

BARRIÉTY L., 1960. Le centre régional de baguage de Biarritz en 1958 et 1959. *Bull. Cent. Etud. Rech. Sci. Biarritz*, 3 (2) : 163-172.

- BARRIÉTY L., 1962. Le Centre régional de Bagnage de Biarritz en 1960 et 1961. *Bull. Cent. Etud. Rech. Sci. Biarritz*, 4 (1) : 7-18.
- CARBONNAUX S., 2005. Estuaire de la Bidassoa - Baie de Chingoudy. Historique de l'aménagement. Écosystèmes. Menaces et conservation. Avifaune migratrice et hivernante – 1977 / 2000. *Le Casseur d'os*, 5 (1-2) : 5-61.
- DE JUANA E., 2006. *Aves raras de España. Un catálogo de las especies de presentación ocasional*. Lynx Edicions, Barcelona, 480 p.
- DEL HOYO J., ELLIOTT A., CHRISTIE D., 2004. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 9. Cotingas to Pipits and Wagtails*. Lynx Edicions, Barcelona, 863 p.
- DUBALEN P.E., 1872. Catalogue critique des oiseaux observés dans les départements des Landes, des Basses-Pyrénées et de la Gironde. *Actes Soc. linn. Bordeaux*, 28 : 439-502.
- DUBALEN P.E., 1890-1892. Monographie raisonnée des oiseaux observés dans les départements des Landes, de la Gironde, du Gers, des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées et sur le Golfe de Gascogne. *Bull. Soc. Borda*, 15 : 169-176 ; 17 : 173-191.
- DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G., YÉSOU P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, Paris, 559 p.
- DULAU S., 1997. Nouveau cas d'hivernage du Pipit de Richard *Anthus richardi* dans le sud de la France. *Ornithos*, 4 (2) : 90-91.
- GRANGÉ J.-L., 2002. Liste commentée des oiseaux des Pyrénées occidentales et du sud des Landes. *Le Casseur d'os*, 2 (2) : 84-132.
- GRANGÉ J.-L., DUCHATEAU S., FOURCADE J.-M., 2006. Notes d'Ornithologie Pyrénéenne N° XI. Novembre 2005 à octobre 2006. *Le Casseur d'os*, 7 : 6-56.
- GRANGER A., 1893. Faune ornithologique de la région du sud-ouest. Catalogue des oiseaux sédentaires ou de passage observés dans les départements de la Charente-Inférieure, de la Gironde, des Landes et des Basses-Pyrénées. *Rev. scien. nat. Ouest*, 3 (1) : 44-67 ; (2) : 116-142.
- LOCHE V., 1852. Observations ornithologiques faites en 1851 dans les Pyrénées. *Actes Soc. linn. Bordeaux*, 18 (2<sup>e</sup> série : 8) : 80-90.
- PEIGNOT C., 2004. Un cas d'hivernage du Pipit de Richard *Anthus richardi* dans les Prades de Saint-Nazaire (Pyrénées-Orientales). *La Mélando*, N° 11 : 23-26.
- PEIGNOT C., 2005. Premier cas d'hivernage du Pipit de Richard *Anthus richardi* en Languedoc-Roussillon. *Meridionalis*, N° 7 : 51-61.
- PHILIPPE X., 1873. *Ornithologie pyrénéenne. Oiseaux sédentaires. Oiseaux de passage régulier, irrégulier & accidentel dans les Pyrénées françaises*. Impr. J. Cazenave, Bagnères-de-Bigorre, 158 p.
- REDON H., 1992. Un Pipit de Richard *Anthus novaeseelandiae* (ou *Anthus richardi*) hivernant en Tarn-et-Garonne. *Le Pistrac*, N° 14 : 24-29.