

Observation d'une Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* dans les Hautes-Pyrénées. Mise au point sur son statut dans le bassin de l'Adour

Philippe MILCENT

avec la collaboration de Jean-Louis GRANGÉ

Résumé - À la suite de l'observation d'une Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* sur le massif du Pibeste en avril 2009, nous faisons le point sur le statut de cette espèce méditerranéenne dont la nidification est inconnue pour le moment dans le bassin de l'Adour mais où certains milieux spécifiques pourraient lui être favorables.

C'est le 18 Avril 2009 en début de matinée, sur la commune de Salles-Argelès (Hautes-Pyrénées) que je pus observer une Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* qui se déplaçait de buisson en buisson, apparaissant et disparaissant pendant 5 à 10 minutes au milieu de la végétation composée de plantes épineuses (églantiers, ronces, ajoncs, prunelliers). Ayant déjà observé l'espèce en Espagne dans sa partie aragonaise, j'ai tout de suite remarqué la moustache blanche caractéristique séparant la gorge et la poitrine orange brique du dessus gris-bleu ardoisé, ainsi que la silhouette avec une queue plus courte que la Fauvette pitchou *Sylvia undata* que l'on peut observer dans les mêmes milieux. Par moments, l'oiseau était bien visible et j'ai pu le détailler tranquillement aux jumelles à 10-15m . Vu les couleurs vives, je pense qu'il s'agissait d'un mâle en livrée nuptiale. La période pluvio-neigeuse qui a suivi aura probablement fait fuir l'oiseau vers des contrées plus hospitalières, et bien que je sois revenu sur les lieux quelque temps après, l'oiseau n'y était plus. A proximité de ce site situé à 950m d'altitude en versant sud, au milieu d'une fougeraie à Fougère aigle parsemée de quelques hêtres et d'aubépines, j'ai contacté également le Bruant jaune *Emberiza citrinella*, le Bruant fou *E. cia* et plusieurs Pipits des arbres *Anthus trivialis* chanteurs, ainsi qu'un couple de Tariers pâtres *Saxicola torquatus* partageant les mêmes buissons que la fauvette.

Inconnue des auteurs anciens pour le bassin de l'Adour (GRANGÉ, 2000), la Fauvette passerinette a été contactée pour la première fois en 1986 (GRANGÉ, 1990), notre observation constituant la huitième donnée connue pour ce territoire, la dernière datant du 29 avril 2010 à Béhorléguy (Pays-Basque). Une observation a été réalisée le 9 avril 2007 à Arrens-Marsous à 850m d'altitude dans la vallée adjacente (val d'Azun). Celle d'Arreau du 4 mai 2001 constituant la première pour les Hautes-Pyrénées, bien que très brève est cependant intéressante car le milieu est identique à celui de mon observation. De plus, l'oiseau chantait ce qui signifie que cette fauvette serait susceptible de nicher dans le bassin de l'Adour. Les autres observations sont situées dans les Pyrénées-Atlantiques (5) et les Landes (1) (voir Annexe). Sept données au moins concernent des mâles dont 4 en livrée nuptiale et 2 chanteurs. Elles sont toutes comprises entre le 9 avril et le 10

mai (soit une amplitude d'un mois) sauf une le 18 août. Les 3 données des Hautes-Pyrénées se situent entre 700 et 950m d'altitude, celle d'Angais, à 380m (basse altitude), celle de Mendive à 850m et celle de Béhorléguy à 750 m.

La Fauvette passerinette est distribuée sur le pourtour méditerranéen avec *Sylvia cantillans cantillans* du Portugal à l'Italie, *S. c. moltoni* en Corse, Sardaigne et Baléares, *S. c. albistriata* de l'Italie à l'ouest de la Turquie et *S.C. inornata* au nord du Maghreb (DEL HOYO *et al.*, 2006). Le milieu de reproduction préféré de l'oiseau est la garrigue haute, avec strate arbustive développée (chêne vert et chêne liège, landes à genévriers) (OLIOSO, 1994) d'où son nom espagnol de *Curruca carrasqueña* (Fauvette du chêne vert). Cette fauvette peut s'élever exceptionnellement jusqu'à 1900m en Espagne (JESCHKE et MUNOZ GALLEGO, 2003) dans les zones montagneuses, ce qui lui a valu autrefois son nom de Fauvette subalpine. Bien qu'elle niche exclusivement en zone méditerranéenne, elle est occasionnelle en mai-juin au nord de son aire de répartition (DUBOIS *et al.*, 2008), notamment sur la côte atlantique. Son occurrence, hors zone de reproduction, en automne, est plus rare. Hivernant dans la zone sahélienne, elle revient dès mars-avril pour repartir en août-septembre, le passage s'étalant jusqu'en octobre.

En France, elle est notée nicheuse dans 19 départements (OLIOSO, 1994) pour environ 100 000 couples nicheurs. En Espagne, son aire de reproduction débute à environ 50 kms au sud de la frontière française (sud d'Anso et Hecho, au plus près en Navarre et Aragon) pour une population estimée à 1 100 000- 2 100 000 couples (JESCHKE & MUNOZ GALLEGO, 2003).

Le 26 mai 2007, j'avais moi-même observé un mâle non loin de l'*embalse* de la Peña (Aragon) et entre le 20 et le 23 août 2007 je l'avais notée du côté de Lécina en Sierra de Guara (Aragon).

En Midi-Pyrénées, elle est notée comme nicheuse certaine dans 4 départements dans le nouvel atlas des oiseaux nicheurs (données comprises entre 2003 et 2009) : Lot, Aveyron, Haute-Garonne et Tarn. Nicheur probable en Ariège et possible en Tarn-et-Garonne, elle est absente du Gers et des Hautes-Pyrénées, même si les observations de 2007 et 2009 dans ce dernier département doivent inciter à rechercher assidument sa reproduction. Plusieurs ornithologues travaillant sur cet atlas soulignent une bonne progression de l'espèce dans le Lauragais (Tarn et Haute-Garonne), jusqu'à Revel (J. JOACHIM, J.F. BOUSQUET, J. RAMIÈRE, L. GILOT ; *in* feuille d'info de l'atlas NMP 2009).

En Aquitaine, à ce jour, aucun indice de reproduction n'a été rapporté bien que plusieurs sites du Pays-basque de type « garrigue » orientés au sud paraissent très favorables à l'installation de l'espèce.

Une prospection ciblée sur certaines zones adéquates de notre région pourrait réserver de bonnes surprises concernant cette espèce mais également les Fauvettes mélanocéphale *Sylvia melanocephala* (trouvée en 2009 près de Lourdes par A. LEBLANC avec de forts soupçons de reproduction) et orphée *S. hortensis*.

Summary – Record of a Subalpine Warbler *Sylvia cantillans* in the department of the Hautes-Pyrénées. An update of its status in the Adour basin.

Following the observation of a Subalpine Warbler *Sylvia cantillans* on the Pibeste massif in April, 2009, we look at the status of this mediterranean species that, at present, is not known as breeding in the Adour basin but where some habitat could suit it. A specific prospection could produce some surprises concerning discrete passerines, particularly mediterranean *Sylviidae*.

Resumen – Observación de una Curruca carrasqueña *Sylvia cantillans* en el departamento de los Altos-Pirineos. Revisión de su situación en la cuenca del Adour.

Después de la observación de una Curruca carrasqueña en el macizo del Pibeste en abril del 2009, intentamos recabar información sobre esta especie mediterránea cuya cría se desconoce por ahora en la cuenca del Adour. Sin embargo algunos biotopos específicos podrían convenir para la cría. Una prospección podría en este caso particular reservarnos algunas sorpresas para las pequeñas aves discretas, las curruca mediterráneas en particular.

Bibliographie

- DEL HOYO J., ELLIOTT A. & CHRISTIE D.A. (Eds.), 2006. *Handbook of the Birds of the World, Vol. 11 Old world Flycatchers to old world Warblers*. Lynx Edicions, Barcelona.
- DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSO G. & YÉSOU P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delacheaux et Niestlé, 560 pages.
- GRANGÉ J.L., 1990. Observation d'une fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*) en Béarn. *La Bergeronnette*, 3 : 2-3.
- GRANGÉ J.L., 2000. Sur l'occurrence récente de quelques espèces à affinité méditerranéenne dans le département des Pyrénées-Atlantiques. *Le Courbageot*, 16 : 37-41.
- JESCHKE M.A. & MUNOZ GALLEGO R., 2003. Curruca carrasqueña *Sylvia cantillans* In MARTY R. & DEL MORAL J.C. (Eds.): *Atlas de las Aves reproductoras de España* pp. 474-475. SEO, Madrid.
- OLIOSO G. 1994., Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* in: YEATMAN-BERTHELOT D. & Jarry G. – *Nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de France* pp.566-567. SOF, Paris.

Philippe MILCENT : Chemin de la Montjoye, 65400 Salles-Argeles
 philmil65@orange.fr

**Annexe : bilan des observations de la Fauvette passerinette
 dans le Bassin de l'Adour jusqu'au printemps 2010**

- 5/05/1986 à Angaïs (Pyrénées-Atlantiques) : 1 mâle adulte (J.L. GRANGÉ)
- 10/05/1990 à Mendive (Pyrénées-Atlantiques) : 1 individu (J.Y. FRÉMONT, M. DUQUET, A. LAROUSSE)
- 4/05/2001 à Arreau (Hautes-Pyrénées) : 1 mâle (J.C. ALBERNY)
- 18/08/2001 à Baigts de Béarn (Pyrénées-Atlantiques) : 1 individu (R. DESTRE)
- 10/04/2004 à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques) : 1 mâle (B. LAMOTHE)
- 7 au 9/04/2007 à Arrens (Hautes-Pyrénées) : 1 mâle (J.P. GANS, in LPO Info n°47)
- 14/04/2009 à Moliets (Landes) : 1 mâle (P. LESCLAU, Réserve Naturelle du Courant d'Huchet)
- 18/04/2009 à Salles-Argeles (Hautes-Pyrénées) : 1 mâle (Ph. MILCENT)
- 28/04/2010 à Béhorléguy (Pyrénées-Atlantiques): 1 mâle chanteur (J.L. GRANGÉ)