

Note sur le comportement antiprédateur du Pic de Lilford *Dendrocopos leucotos lilfordi* en présence d'un écureuil roux *Sciurus vulgaris* proche de la cavité de reproduction

José Luis ROMERO ROMERO

Les 21 et 22 mai 2011, en forêt d'Iraty (Navarre espagnole), lors du suivi d'un nid de Pic de Lilford contenant des jeunes de 14-16 jours, j'ai observé, par deux fois, la façon dont les membres du couple ont réagi différemment devant la présence d'un Écureuil roux qui cherchait à se nourrir en creusant dans le bois dépérissant de l'arbre de nid et qui se montrait très confiant, proche de la cavité.

Quand le Pic mâle a surpris l'écureuil près du nid, il l'a survolé en vol et poursuivi, celui-ci s'enfuyant en courant et sautant du tronc de l'arbre de nid à des branches de l'arbre voisin. Alors, le mâle pénétra dans le nid, tout en restant près de 15 minutes à l'entrée de la cavité, surveillant les alentours, jusqu'à l'arrivée de la femelle avec de la nourriture au bec. Cependant, en détectant la présence de l'écureuil, la femelle réagit différemment du mâle : elle poursuit directement, de manière agressive, l'intrus, se précipitant sur lui et tentant de lui donner des coups de bec, jusqu'à ce qu'il quitte l'arbre de nid et s'éloigne définitivement. Elle revint quelques minutes plus tard au nid, nourrir les jeunes.

Summary. Note on the antipredator behavior of the Lilford Woodpecker *Dendrocopos leucotos lilfordi* in the presence of a red Squirrel *Sciurus vulgaris* near their breeding cavity.

Note describing the behavior of a couple of Lilford Woodpecker in front of the presence of a Red squirrel near their breeding cavity in Navarra (Spain), with a different reaction of each adult facing this threat.

Resumen. Nota sobre el comportamiento antidepredador del Pico de Lilford *Dendrocopos leucotos lilfordi* ante la presencia de una ardilla roja *Sciurus vulgaris* en las inmediaciones del nido de cría.

Nota que describe el comportamiento de una pareja de Pico de Lilford ante la presencia de una ardilla roja cerca de su cavidad reproductiva en Navarra (España), con una reacción diferente de cada adulto frente a esta amenaza.

José Luis ROMERO ROMERO : pico.menor@hotmail.com

Note de la Rédaction

L'Écureuil roux est un prédateur potentiel des œufs et jeunes des Pics bigarrés comme le pense I. STENBERG (comm. pers.) pour la Norvège: « This indicates that, in my study, it might be more probable that the squirrel is the predator on nestlings (of white-backed Woodpecker) : it may penetrate openings of about 5 cm. ». Dans ces cas, des poils de mammifère sont trouvés à la cavité qui n'a pas été élargie, écartant la Martre et le Loir.