

Notes d'Ornithologie Pyrénéenne n° XVIII Novembre 2011 à octobre 2012

Jean-Louis GRANGÉ, François BALLEREAU, Stéphane DUCHATEAU,
Jean-Jacques HOURCQ, Sébastien PÉRÈS & Patrice URBINA-TOBIAS
Rédacteurs pour le GOPA

Ces 18^{èmes} Notes d'Ornithologie Pyrénéenne sont caractérisées par le nombre d'espèces occasionnelles contactées durant la période considérée : Busard pâle *Circus macrourus* (12 individus différents), Buse pattue *Buteo lagopus*, Aigle pomarin *Aquila pomarina* (2 individus), Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* (4 individus), Faucon crécerellette *Falco naumanni* (afflux avec 67 individus différents comptés), Faucon d'Eléonore *Falco eleonora* (11 individus différents), Outarde barbue *Otis tarda* (6 individus), Mergule nain *Alle alle* (4 individus), Goéland d'Audouin *Larus audouini* (4 individus différents), Goéland à ailes blanches *Larus glaucooides*, Coucou geai *Clamator glandarius* (2 individus), Rollier d'Europe *Coracias garrulus* (11 individus différents), Fauvette passerinette *Sylvia cantillans*, Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* (5 individus).

Concernant les espèces rares (moins de 2 à 3 données dans les dernières décennies), il faut noter le Faucon lanier *Falco biarmicus* (première donnée pour le Bassin de l'Adour), la Marouette de Baillon *Porzana pusilla* (1^{ère} et 2^{ème} observations contemporaines), le Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis* (2^{ème} donnée, sur le même site que la première observation, l'année précédente), le Chevalier grivelé *Actitis macularia* (première donnée pour le Bassin de l'Adour), la Sterne élégante *Sterna elegans*, la Sterne de Dougall *Sterna dougallii* (3^{ème} donnée récente), la Mouette atricille *Larus atricilla* (première donnée), la Corneille mantelée *Corvus cornix* (1^{ère} donnée depuis un siècle), la Fauvette orphée *Sylvia hortensis* (5^{ème} donnée contemporaine), la Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* (3^{ème} donnée pour le Bassin de l'Adour) et le Sizerin flammé *Acanthis flammea / cabaret* (3^{ème} et 4^{ème} données). Plusieurs de ces observations sont en attente de validation par le CHN ou le CHR.

Parmi les autres faits marquants, il faut relever le nombre inhabituel de Puffins *sp.* à mi-octobre sur nos côtes : 1196 Puffins cendrés *Calonectris diomedea* à Capbreton le 14/10, 90 Puffins majeurs *Puffinus gravis* en mer, au large d'Hendaye le 13/10, plus de 100 Puffins fuligineux *Puffinus griseus* le 14/10 à Capbreton. Un nombre record de 8080 Sarcelles d'hiver *Anas crecca* a été relevé à Rivière-Saas-et-Gourby à mi février, montrant les capacités d'accueil des barthes de l'Adour, hors période de chasse. Le suivi journalier de la migration printanière du Faucon hobereau *Falco subbuteo* à Trébons (65) a permis de mettre en évidence un nombre insoupçonné d'oiseaux passant en ce lieu, soit près de 3000 individus comptés en l'espace d'un mois.

Une première preuve de reproduction du Tarin des aulnes *Spinus spinus* est apportée pour 2012 pour le département des Landes.

Les noms des espèces soumises à homologation régionale en Aquitaine sont suivis d'un astérisque (*) ; ceux des espèces soumises à homologation nationale de deux astérisques (**).

Nous avons utilisé les appellations suivantes pour nommer les principaux sites ornithologiques : lac de l'Arrêt-Darré (commune de Laslades), Ger (« lande de Ger » sur les communes d'Ossun, Azereix, Ger et Ibos), lac du Gabas (Luquet, Gardères, Laurenties et Eslourenties-Daban), lac de l'Ayguelongue (Momas et Mazerolles, comprenant le plan d'eau amont creusé en 2011), Artix (« lac d'Artix » à Pardies et Artix), Biron (« Saligue aux Oiseaux » à Castétis et Biron), Huchet

(Réserve Naturelle Nationale du Courant d'Huchet et ses alentours, sur les communes de Léon, Moliets-et-Maa et Vielle-Saint-Girons), Vieux-Boucau (lac marin de Port-d'Albret, sur les communes de Vieux-Boucau-les-Bains et Soustons), Étang Blanc (Seignosse, Soustons), Hossegor (lac marin d'Hossegor, sur les communes de Soorts-Hossegor et Seignosse), Orx (Réserve Naturelle Nationale des Marais d'Orx, sur les communes de Labenne, Orx et Saint-André-de-Seignanx), Plaiaundi (commune d'Irún).

Nous remercions tous les contributeurs à ces NOP, sans qui cette synthèse annuelle ne serait pas et espérons que vous continuerez à alimenter notre base de données par l'envoi régulier de vos observations.


Remarques taxinomiques

Le lecteur sera sans doute un peu désorienté en parcourant ces nouvelles « Notes d'Ornithologie Pyrénéennes ». Il nous a en effet paru impossible d'ignorer plus longtemps les nombreux changements de séquences proposés par les études phylogénétiques de ces toutes dernières années (Laridés, Limicoles et Passereaux principalement), d'autant plus qu'ils ont été validés par plusieurs organismes reconnus : Comité taxinomique de la BRITISH ORNITHOLOGISTS' UNION (BOU) et CSNA (Comité taxinomique hollandais) principalement. De plus, les futurs guides d'identification, rédigés en anglais, suivront cette nouvelle séquence, comme le font déjà plusieurs revues étrangères d'ornithologie de terrain (*British Birds*, *Birding World*, *Dutch Birding*) ou à caractère scientifique (*The Ibis*).

Les changements les plus significatifs concernent les Passereaux oscines. Les raisons en sont résumées dans SANGSTER *et al.* (*Ibis*, 152-1, 2010) qui donnent une bibliographie exhaustive des articles originaux pris en compte. Concernant les Galliformes, Laridés et Limicoles, le nouvel arrangement est moins important avec, cependant, l'« absorption » des Tétrionidés par les Phasianidés ainsi que des changements de genre pour certaines espèces (Combattant varié et Bécasseau rousset qui deviennent des *Calidris*) (SANGSTER *et al.*, 2012). Il est à remarquer que certaines propositions sont encore empreintes de flou (par exemple les *Régulidés* considérés comme *incerta sedis* jusqu'à de nouvelles études), d'où de futurs ajustements de cette nouvelle séquence à attendre. Les changements de genre des Fringillidés sont basés sur les résultats de divers travaux dont ceux de ZUCCON *et al.* (in *Moléculaire Phylogenetics and Evolution*, 62).

Liste des observateurs

Franck D'AMICO (FDA), Aurélien ANDRÉ (AAn), Jonathan & Petrina ASH (JAs), François BALLE-REAU (FBa), Luc CANTEGREL (LCa), Jacques BOUILLERCE (JBo), Frédéric CAZABAN (FCa), Michel CHALVET (MCh), Claude CHARRON (CIC), Valérie DUCASSE (VDu), Stéphane DUCHATEAU (SDu), Emmanuel DUMAIN (EDu), Geoffrey DUPONT (GDu), Jacques FERRÉ (JFe), Philippe FONTANILLES (PFo), Jean-Marc FOURCADE (JmF), Jean-François GLEYZE (JfG), Luc GONZALES (BGo), Laurence GOYENECHÉ (GoL), Claude GRANGÉ (CGr), Jean-Louis GRANGÉ (JIG), Christian GUINCHAN (CGu), Muff GUSH (MGu), David HAMON (DHa), Alfredo HERRERO GORROTXATEGI (AHG), Stéphane & Rachel HOMMEAU (SHo), Charles HOPPER (CHo), Jean-Jacques HOURCQ (JjH), Didier LABAN (DLa), Guy LAFFERRÈRE (GLa), Henri LAPEYRE (HLa), Arnaud LEBLANC (ALe), Sophie LEBLANC (SLe), Philippe LEGAY (PhL), Paul LESCLAUX (PLe), Philippe MILCENT (PMi), Pierre NAVARRE (PNa), Alain NAVES (ANa), Alain NEAU (NeA), André NERRIÈRE (ANe), Alain PAGOAGA (APa), Sébastien PÈRES (SPé), Jean-Paul PIOUS (JpP), Dominique & Claudine RAGUET (DRa), Véronique RENAUDIN (VRe), Réserve Naturelle du Courant d'Huchet (RNNCH), Robert SMITH (RSm), Stéphan TILLO (STi), Jean-Michel TISNÉ (JmT), Patrice URBINA-TOBIAS (PUT).



ANATIDAE

Cygne tuberculé *Cygnus olor* (d=196)

De juillet à fin décembre, Artix accueille en moyenne 25 oiseaux (divers obs.) ; c'est la seule période de l'année où l'espèce se montre grégaire. En hivernage, la moyenne des contacts est de

4 individus mais davantage de sites sont répertoriés, démontrant la dispersion des oiseaux. La reproduction s'étend principalement de mars à juin et est notée sur 6 communes : Artix, Orx, Montgaillard, Uza, Onesse-et-Laharie et Léon avec en moyenne 4,6 jeunes produits par reproduction réussie constatée (divers obs.).

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus**

Cygne chanteur *Cygnus cygnus (d=1)**

Un seul contact cette année encore d'un oiseau en vol de nuit vers le sud mais suffisamment bruyant pour être reconnu le 22/10 à Saint-Geours-de-Maremne (PLE).

Oie des moissons *Anser fabalis*

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus***

Oie rieuse *Anser albifrons* (d=26)

Les observations sont réparties sur 4 communes : Saint-Martin-de-Seignanx, Pontonx-sur-l'Adour, Capbreton et Puydarrieux (divers obs.). Pontonx-sur-l'Adour héberge entre 8 et 12 individus du 9/11 au 11/02 (divers obs.). Ailleurs, les oiseaux sont contactés à l'unité. Dernières observations hivernales le 11/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi) et Pontonx-sur-l'Adour (GLa). Premiers retours automnaux les 23 et 28/10 à Puydarrieux (VDu, DRa).

Oie cendrée *Anser anser* (d=165)

La migration postnuptiale est décelée principalement près de la côte courant novembre avec notamment 200 oiseaux posés le 8/11 au Huchet à 9h puis seulement 25 à 13h (PLE / RNNCH). Derniers vols migratoires nocturnes décelés le 22/12 à Morcenx (PUT). En hivernage, dans les terres, Puydarrieux rassemble jusqu'à 107 Oies cendrées le 03/01 (JIG, JpP). Orx accueille au maximum 970 individus le 16/01 (FCa). Les premiers mouvements migratoires pré-nuptiaux sont notés le 30/01 avec 100 oiseaux au Huchet (PLE / RNNCH) puis se généralisent fin février avec 42 oiseaux à Messanges et 31 à Rivière-Saas-et-Gourby le 19/02 (STi). La reproduction est notée à Pontonx-sur-l'Adour où le premier oison est vu le 02/04 (JFe) et où 16 jeunes naitront en tout (CIC). 2 jeunes seront produits pour la première fois à Artix (SDu, JIG) ; reproduction également à Denguin (SDu) et à Orx (FCa). Premiers mouvements postnuptiaux le 10/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et jusqu'à 120 à Messanges le 27/10 (STi, FCa, PhL).

Bernache du Canada *Branta canadensis* (d=20)

Présente toute l'année sur des étangs de Chalosse et de Tursan comme à Saint-Gein, Hontanx, Perquie, ou Pontonx-sur-l'Adour (CIC).

Bernache nonnette *Branta leucopsis* (d=1)

1 le 24/07 au Huchet (PLE / RNNCH), certainement issue de captivité.

Bernache cravant *Branta bernicla* (d=20)

Observée à l'unité ou en très faible nombre entre le 06/11 et le 03/03 à Capbreton, Vieux-Boucau, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye (divers obs.). Retour le 27/10 d'un groupe de 20 individus à Vieux-Boucau (FCa, STi, PhL), puis à nouveau à l'unité ou par paire jusqu'à la fin du mois à Anglet et Hossegor (divers obs.).

Bernache à cou roux *Branta ruficollis***

Ouette d'Egypte *Alopochen aegyptiaca*

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea* (d=1)

6 oiseaux observés le 22/06 à Pontonx-sur-l'Adour (GLa), mais l'origine sauvage demeure douteuse.

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* (d=69)

Premier contact le 06/11 avec un oiseau remontant au nord à Capbreton (coll. GOPA), puis le 05/12 avec un individu prenant ses quartiers d'hiver à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL et al.). Début d'hivernage également à Puydarrieux à partir du 18/12 (VDu). Hendaye, Tercisles-Bains, Capbreton, Orthez, Orx et le Huchet accueillent l'espèce au cours de la mauvaise saison. Les 20 tadorne vus à Orx le 04/04 marquent la fin du passage pré-nuptial. Des oiseaux demeurent présents sur les barthes landaises au printemps : 4 le 09/03 à Heugas (JIG, ANe), 3 le 16/03 (FCa), 2 le 27/04 à Pey et à Orist le 04/05 (FCa). Un couple adopte des attitudes agressives à l'égard de colverts à Puydarrieux le 27/03 (DRa), sans suite. Reprise des contacts le 30/08 à Pontonx-sur-l'Adour (JFe) puis courant septembre à Orx et Hendaye (divers obs.).

Canard mandarin *Aix galericulata* (d=4)

L'espèce est contactée en 3 sites : Lucbardez-et-Bargues le 11/11 (CIC), sur le lac de Lourdes le 6/06 (CHo) et à Ustaritz avec 3 ind. le 30/01 (GoL). À noter que l'espèce niche désormais depuis plusieurs années au Huchet (PLe / RNNCH).

Canard carolin *Anas sponsa* (d=1)

Un mâle de cette espèce est observé le 21/03 à Bours (SPé).

Canard siffleur *Anas penelope* (d=130)

La majorité des effectifs hivernants se répartit sur 4 sites : Orx et Pontonx-sur-l'Adour avec respectivement 106 et 150 oiseaux (FCa), Puydarrieux avec 146 (JIG, JpP) et Saint-Martin-de-Seignanx avec 340 (STi). Ailleurs, 25 à Bours le 29/12 (EDu) et 16 à Plaiaundi le 16/02 (JFe). Dernier contact le 2/05 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Retours les 25/09 à Orx (PhL), 9/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, JFe) et 13/10 à Pontonx-sur-l'Adour (CIC).

Canard à front blanc *Anas americana***

Canard chipeau *Anas strepera* (d= 208)

Maxima à la mi-janvier de 291 à Orx (FCa & RNN Orx), 82 à Saint-Martin-de-Seignanx le 28/11 (FCa) et 91 à Bésingrand le 13/02 (PhL). Un mâle marqué le 6/08/11 en Bavière fréquentera ce dernier site du 9/11 au 22/01 (PhL, SDu, ANa). Egalement 25 à Cazères-sur-l'Adour le 10/02 (CIC) et 49 à Bours le 8/02 (DRa). Concernant la reproduction, un accouplement est noté le 7/01 à Plaiaundi (ANa), site sur lequel 2 jeunes non volants sont vus le 17/07 (JFe) ; des oiseaux sont également cantonnés au Huchet (PLe / RNNCH).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* (d=350)

Les bastions de l'hivernage demeurent Orx avec 5461 ind. le 16/01 (FCa, RNN Orx) et Saint-Martin-de-Seignanx avec 3000 le 8/02 (FCa). Les barthes de l'Adour accueillent de gros contingents après la fermeture de la chasse, en témoignent ces 8080 sarcelles comptabilisées le 17/02 à Rivière-Saas-et-Gourby, record pour le site (FCa) ! Ailleurs, Bassillon-Vauzé, Benquet, Lussagnet, Pontonx-sur-l'Adour et Renung hébergent au-moins 200 oiseaux (divers obs.), le

lac du Gabas en totalisant à lui seul 700 le 12/02 (FCa). Parmi les cas atypiques, une observation d'un oiseau albinos le 5/09 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL) et un hybride Sarcelle d'hiver x Canard chipeau observé à trois reprises à Saint-Martin-de-Seignanx entre le 10/11 et le 24/01 (FCa). Hormis quelques couples apparus, voire cantonnés (7 mâles cantonnés au Courant d'Huchet – PLe / RNNCH), aucune preuve de reproduction n'est rapportée cette année. À noter une jolie troupe de 42 ind. en mer le 6/11 à Capbreton (coll. GOPA).

Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis***

Canard colvert *Anas platyrhynchos* (d=666)

En hiver, maxima de 1197 oiseaux à Orx (FCa, RNN Orx), 300 sur le lac du Gabas (DRa) 202 sur celui de l'Ayguelongue et 196 à Lussagnet (CIC). La reproduction de l'espèce est avérée certaine sur 32 communes, chiffre sensiblement identique à l'année passée. Des poussins sont observés du 2/04 à Benquet au 16/08 sur le lac de l'Ayguelongue (CIC). En dispersion postnuptiale, 400 à Cazères-sur-l'Adour le 2/09 (CIC) et 1000 à Orx le 13/09 (FCa). Un mâle muni d'une marque nasale observé à Orioux le 8/08 avait été marqué au Portugal (FBa).

Canard pilet *Anas acuta* (d=85)

Au passage prénuptial, important stationnement de 1000 ind. les 10 et 11/02 à Orx (JIG, JpP, STi) et de 500 le 11/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (STi). Egalement 15 oiseaux à Pontonx-sur-l'Adour le 11/02 (FCa), 17 à Benquet le 12/02 (CIC), 80 à Rivière-Saas-et-Gourby et 20 à Saubusse le 29/02 (STi) ou encore 14 à Puydarrieux le 5/03 (VDu). Dernier contact le 26/03 à Saint-Martin-de-Seignanx puis réapparition postnuptiale le 21/08 à Orx (FCa).

Sarcelle d'été *Anas querquedula* (d=33)

La migration prénuptiale est décelée le 16/02 à Plaiaundi (JFe), le 10/03 simultanément à Cazères-sur-l'Adour (CIC), Messanges (STi) et Puydarrieux (VDu) puis le 12/03 à Artix (JIG) et au Huchet (PLe / RNNCH). Jusqu'à 14 oiseaux stationnent le 17/03 sur l'étang de Léon (Roxane Augé *fade* PLe / RNNCH) et 11 le 18/03 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL). Der-

nier contact sur ce site le 16/04 (JIG, PhL). Retour dès le 3/07 à Puydarrieux (VDu) et les 21 et 23/07 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL) ; le dernier ind. est observé le 28/08 à Orx (STi).

Sarcelle à ailes bleues *Anas discors***

Canard souchet *Anas clypeata* (d=275)

269 oiseaux passent en mer le 6/11 à Capbreton (coll. GOPA). Durant l'hiver, stationnement de 2000 oiseaux à Orx (JIG, JpP), 200 à Saint-Martin-de-Seignaux (STi), 130 à Rivière-Saas-et-Gourby et 120 à Pontonx-sur-l'Adour (FCa) ou encore 111 à Biron (CIC). Bien qu'observé d'avril à juin sur différents sites, aucune preuve de reproduction n'est rapportée cette année. Premier gros arrivage automnal le 13/09 à Orx avec 400 ind., puis 1000 le 12/10 sur ce même site (FCa).

Nette rousse *Netta rufina* (d=22)

L'espèce est observée sur trois sites différents au cours de l'hiver : Plaiaundi avec jusqu'à 6 oiseaux (JFe, GoL), le Huchet le 14/12 (PLe / RNNCH) et Hossegor du 12/01 au 18/02 (JfG, JFe, ANa *et al.*). En migration postnuptiale, contactée dès le 18/06 puis du 14/07 au 17/10 à Plaiaundi (AHG, JFe), le 14/07 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL) et le 10/09 à Ustaritz (GoL).

Fuligule milouin *Aythya ferina* (d=183)

Hivernage conséquent avec notamment 290 oiseaux à Artix le 17/02 (SPé), 236 à Miramont-Sensacq le 14/01 (coll. GOPA), 190 sur le lac du Gabas le 12/02 (FCa), 187 à Sère-Rustaing le 8/02 (FBa), 164 sur le lac de l'Ayguelongue le 16/11 (PhL). Egalement, 144 à Cazères-sur-l'Adour le 13/11 et 133 à Montgaillard-40 le 10/12 (CIC) ou encore 121 sur la gravière de Maubourguet le 13/02 (SPé). Seulement deux communes voient l'espèce se reproduire : Hontanx avec une femelle accompagnée de 5 juv. le 1/06 et Saint-Gein où 3 couples auront produit un total de 7 jeunes (CIC). À signaler l'observation d'un mâle hybride milouin x nyroca à Bésingrand/Artix du 27/02 au 4/03 (JIG, PhL, STi *et al.*). Une femelle munie d'une selle nasale est observée le 16/11 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL) : il s'agit d'un oiseau

marqué le 13/05/2011 à Saint-Philibert-de-Grand-Lieu-44.

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris**

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* (d=11)

Espèce observée à Cazères-sur-l'Adour le 13/11 avec 2 individus (CIC), puis à l'unité sur le lac de l'Arrêt-Darré le 25/11 (DRa, JmF), à Sère-Rustaing les 8 et 17/02 (FBa), à Artix du 12/02 au 23/02 (ANa, PhL, JIG *et al.*), sur le lac du Gabas le 11/03 (DRa) et à Montgaillard-40 le 31/10 (CIC).

Fuligule morillon *Aythya fuligula* (d=115)

Durant la mauvaise saison, maxima de 89 à Labatut-40 le 18/12 (PLe), 57 à Bours le 29/12 (EDu), 43 à Artix le 14/01 (coll. GOPA), ou encore 47 à Montgaillard-40 le 8/02 (CIC). Un accouplement est noté le 28/02 à Bours (DRa). Dernier oiseau le 11/04 à Artix (JIG). Retour postnuptial les 2/07 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL), 4/07 à Artix (JIG) et 17/07 à Plaiaundi (JFe).

Fuligule milouinan *Aythya marila* (d=1)

Une seule observation de cette espèce : un oiseau le 27/11 à Labatut-40 (PLe).

Fuligule à tête noire *Aythya affinis***

Eider à duvet *Somateria mollissima* (d=18)

Le mâle qui stationne en baie de Txingudi est présent jusqu'au 14/03 (JFe *et al.*). Un groupe de six femelles et un mâle vole vers le nord le 06/11 à Capbreton (STi). Dernière observation, un mâle fait une halte à Anglet le 18/04 (ANe, JIG).

Harelde boréale *Clangula hyemalis (d=1)**

Un oiseau supposé femelle est observé en mer, volant vers le nord le 06/11 à Capbreton (coll. GOPA).

Macreuse noire *Melanitta nigra* (d=23)

Mouvements assez marqués en automne à Capbreton avec 45 oiseaux le 05/11 (FCa, STi), 254 le 06/11 volant vers le Nord (coll. GOPA) et 40 vers le sud à Vieux-Boucau le 11/11 (STi). Dernière observation hivernale le 05/01 à Cap-



L'une des 6 **Nettes rouges** présentes à Plaiaundi au cours de l'hiver 2011-2012, donnée doublement originale : les observations se produisent généralement au cours de la migration postnuptiale et concernent majoritairement 1 ou 2 individus (photo J. FERRÉ).

breton (PhL, STi). Premiers retours automnaux les 09/09 (SPe, FBa, VRe) et 13/09 avec 9 oiseaux à Capbreton (FCa). Le passage s'intensifie fin octobre : 43 le 27/10 à Vieux-Boucau (FCa, STi, PhL).

Macreuse brune *Melanitta fusca* (d=4)

Peu d'individus et seulement à Capbreton : 3 le 06/11 (STi, GoL), 1 le 20/12 (SDu, SHo) et 4 le 05/01 (PhL, STi).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* (d=2)

Comme l'année dernière et à la même saison, un individu est observé à Cazères-sur-l'Adour le 10/03 (CIC). Observation aussi d'un mâle sur le lac de Léon le 11/02 (PLe, STi).

Harle piette *Mergellus albellus* (d=6)

Comme l'an passé, Montgaillard-40 héberge une femelle du 14 au 28/01 (CIC). Ailleurs, un oiseau à Hossegor le 07/02 (ANe), puis à Orx les 10/02 (JpP, JIG) et 11/02 (FCa, STi).

Harle huppé *Mergus serrator* (d=5)

À l'unité et ponctuellement entre le 12/11 et le 11/02 à Tarnos (ANa), Puydarrieux (VDu), au

Huchet et à Orx (STi). Un mâle précoce noté ensuite le 24/09 à Biarritz (EDu).

Harle bièvre *Mergus merganser* (d=1)

Une seule donnée contrastant avec l'afflux de l'hiver dernier : 3 femelles et 2 mâles font étape les 27 et 28/02 à Puydarrieux (VDu).

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*

ODONTOPHORIDAE

Colin de Virginie *Colinus virginianus*

PHASIANIDAE

Caille des blés *Coturnix coturnix* (d=58)

Une année médiocre pour cette espèce, avec des premières mentions seulement les 29/04 à Mesanges (STi) et Trébons (DRa) et 3/05 à Ustaritz (GoL). En montagne, des chanteurs à 1400 m à Osse-en-Aspe (MGU) et de 1700 à 1900 m en haute vallée d'Ossau (JIG, JpP, SDu, LCa). Dernières mentions les 26/09 à Escout (RSm) et 28/10 à Ger (CHO).

Perdrix rouge *Alectoris rufa* (d=14)

Présence en période de reproduction à Rabastens-de-Bigorre (un oiseau chante sur un toit !) (FBa), Lanne-65 (DRa), Mazerolles-40, Cauna (CIC), Solférino et Messanges (STi). Les seuls individus certainement d'origine naturelle ont été observés près du col du Pourtalet (1650 m) les 28/06 et 3/07 (JIG).

Lagopède alpin *Lagopus muta pyrenaica* (d=9)

Les quelques données reçues, comprises entre 2090 et 2600 m d'altitude, concernent le massif de l'Anie (PNa, SDu, STi) et les communes d'Eaux-Bonnes (SDu, PNa), Arrens-Marsous et Barèges (PMi).

Grand Tétrás *Tetrao urogallus aquitanicus* (d=23)

Les observations concernent 11 communes des Pyrénées-Atlantiques, jusqu'à Arette à l'Ouest, entre 1330 et 1950 m d'altitude (divers obs.). Une poule accompagnée d'un poussin emplumé est observée le 10/08 à Escot (SDu). Une seule mention en Bigorre : le 2/06 à Barèges (CHo).

Perdrix grise *Perdix perdix hispaniensis* (d=14)

Espèce présente à Arette (STi), Sainte-Engrâce, Léés-Athas, Etsaut, Accous, Béost (SDu), Laruns (SDu, JIG), Arbéost (JIG) et Barèges (CHo), les mentions s'étalant de 1350 à 2090 m d'altitude. Des individus issus de lâchers à vocation cynégétique sont observés le 23/05 à Bénéjacq (CGr) et probablement le 16/05 au Baïgoura (ANe).

Faisan vénéré *Syrmaticus reevesii*

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* (d=111)

Premiers chants le 13/03 à Lanne-65 (DRa) et derniers le 7/08 à Momas (ANa), avec des combats de mâles signalés les 4/05 à Trébons (DRa) et 6/05 à Momas (PhL). Une mention aux Eaux-Bonnes (700 m) le 11/04 (SDu). Nichées de 3 jeunes le 20/06 à Hontanx (CIC) et de 7 poussins le 2/07 à Urt (FCa).

GAVIIDAE

Plongeon catmarin *Gavia stellata* (d=16)

Premier le 06/11 à Capbreton (coll. GOPA), puis régulièrement sur différentes localités côtières : Vieux-Boucau-les-Bains, Saint-Jean-de-Luz, Moliets-et-Maa et Biarritz (divers obs.). À l'intérieur des terres, hivernage d'un individu du 17/12 au 10/04 à Puydarrieux (VDu, DRa) et une donnée à Miramont-Sensacq le 11/02 (DRa, FBa, JmF).

Plongeon arctique *Gavia arctica* (d=4)

Le premier est vu à Biarritz le 24/11 (EDu), puis un individu le 18/12 à Sanguinet en compagnie d'un Plongeon catmarin (STi) et un autre le 20/12 à Capbreton (SDu, SHo). Dernière donnée très tardive d'un oiseau volant vers le sud le 19/04 à Capbreton (SDu).

Plongeon imbrin *Gavia immer* (d=21)

Contacté plutôt à l'unité. Le premier à Capbreton le 06/11 (GoL, STi), puis à Hendaye le 24/11 (AHe) et à l'intérieur des terres à Cazères-sur-l'Adour le 27/11 (CIC). Maximum de 3 à Biarritz le 17/11 (EDu). L'hivernage est régulier jusqu'au 29/01 à Hendaye (GoL). Dernière donnée isolée et tardive le 23/03 à Bascons, loin de la côte (CIC).

PROCELLARIDAE

Fulmar boreal *Fulmarus glacialis* (d=11)

La seule donnée d'un oiseau vivant (mais très affaibli) provient du lac marin de Vieux-Boucau-les-Bains le 20/12 (SDu, SHo), les autres correspondent à des cadavres trouvés en plusieurs points du littoral sud-landais entre le 11/12 et le 9/01 (FCa, STi, GoL, PhL).

Pétrel de Bulwer *Bulweria bulwerii***

L'observation d'un individu le 29/11/2009 à Tarnos a été refusée par le CHN (*Ornithos*, 19-6 / 2012).

Puffin cendré *Calonectris diomedea* (d=20)

Le passage automnal est détecté, avec une belle abondance sur une période d'un mois, du 13/09 au 14/10 depuis les sites traditionnels du littoral (divers obs.). Les plus gros effectifs sont notés à Capbreton les 25/09 et 14/10 avec respectivement 280 et 1196 migrants (STi, PhL), ainsi



Fulmar boréal épuisé sur la plage : les espèces pélagiques se rencontrent souvent affaiblies sur la côte suite aux tempêtes du large (photo S. HOMMEAU).

que depuis Vieux-Boucau-les-Bains, avec 630 individus le 11/10 (STi).

Puffin majeur *Puffinus gravis** (d=9)

Passage de 20 individus le 5/11 et de 4 le 6/11 devant Capbreton (STi *et al.*). L'espèce est ensuite contactée entre le 14/09 à Moliets-et-Maa et le 14/10 à Capbreton (STi, GoL, FCa, SDu), avec un total d'au moins 90 individus le 13/10 au large d'Hendaye lors d'une sortie en mer, attestant la présence en nombre de l'espèce dans le golfe de Gascogne (divers obs.).

Puffin fuligineux *Puffinus griseus* (d=10)

Un individu tardif le 5/11 à Capbreton (ST, FCa). La migration d'automne est notée du 24/09, où un effectif max. de 100 est noté depuis Capbreton, au 14/10 sur le même site (STi, PhL) ; 80 sont aussi observés le 13/10 lors d'une sortie en mer au large d'Hendaye (divers obs.).

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus** (d=8)

Une observation du 6/11 à Capbreton (coll. GOPA), deux données printanières les 19/04 et 21/05 sur ce site (SDu, FCa) puis quelques données dans les derniers jours de septembre et les premiers d'octobre, avec 11 individus le 24/09 à Capbreton (coll. GOPA).

Puffin des Baléares *Puffinus mauretanicus* (d=55)

Des migrateurs sont encore notés en novembre avec jusqu'à 562 oiseaux le 5/11 et 447 le 6/11 à Capbreton (coll. GOPA), les flux s'étaient jusqu'en décembre, puis la présence de l'espèce semble plus sporadique jusqu'en janvier où un dernier individu est noté à Biarritz le 20/01 (EDu), suivi par une mention le 18/05 à Capbreton (SHo). Les mouvements automnaux sont perceptibles à partir du 25/08 avec 6 à Capbreton (GoL, PhL, STi), culminant vers fin septembre-début octobre : 373 le 25/09 sur le même site (STi, PhL) et 550 en 1 heure le 12/10 au Cap Figuier (AHG). L'observation de l'espèce est faite sur tout le littoral, du Cap Figuier au Courant d'Huchet.

Puffin de Macaronésie *Puffinus baroli***

HYDROBATIDAE

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus* (d=20)

L'espèce est observée, en automne et en hiver lors des événements météo synonyme de cette océanite, 31 le 6/11 à Capbreton (divers obs.), un max. de 80 sur ce site le 17/12 (K. Schmale, P.A. Crochet, F. Veyrunes), 27 le 23/12 à l'embouchure du Courant d'Huchet (STi). Les données hivernales ultérieures concernent des cadavres découverts sur les plages de la région (STi, FCa, GoL). Deux observations printanières, 3 le 21/05 à Capbreton (FCa) et 1 le 23/05 à Tarnos (SDu).

Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* (d=9)

Une donnée automnale de 49 en migrations le 6/11 à Capbreton (divers obs.) puis 30 à Biarritz le 17/12 (EDu), 5 à Anglet (ANe) et 6 à Capbreton (K. Schmale, P.A. Crochet, F. Veyrunes) le même jour ; vue ensuite à l'unité sporadiquement lors de l'hiver (SHo, SDu, FCa). Une seule donnée de fin d'été, 1 le 24/09 Vieux-Boucau (SDu).

SULIDAE

Fou de Bassan *Morus bassanus* (d=94)

Hormis les trois mois d'été, l'espèce est observée au passage ou en pêche toute l'année depuis les sites côtiers, avec des pics de présence en hiver, 600 par ex. le 7/02 à Soorts-Hossegor (ANe) et surtout en fin d'été lors du passage postnuptial, avec 500 le 25/09 à Capbreton (PhL, STi), les effectifs déclinant ensuite au cours du mois d'octobre.

PHALACROCORACIDAE

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (d=825)

Derniers migrateurs postnuptiaux les 16/11 (FBa, SPé) et probablement 3/12 (FCa, STi) à Capbreton. Effectifs hivernants en forte baisse sur les dortoirs (Tableau 1). La migration pré-nuptiale est signalée du 9/03 à Seignosse (PLe) au 9/04 à Messanges (STi). En période de reproduction, jusqu'à 92 nids occupés à Artix (SDu), 26 à Bascons, 4 à Saint-Gein (CIC) et une dizaine à Orx (FCa). Premiers migrateurs postnuptiaux dès les 4 et 18/08 à Messanges (STi).

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* (d=26)

Sur le reposoir d'Hendaye, l'effectif maximum rapporté n'est que de 17 individus le 28/02, avec 4 nids occupés le 3/04 (AHG). Aucune mention cette année au nord de Biarritz.

ARDEIDAE

Butor étoilé *Botaurus stellaris* (d=22)

Un hivernant est noté à Bours du 6/02 au 6/03, avec 2 individus les 28 et 29/02 (DRa, SPé, FBa). Les autres sites d'hivernage sont plus

classiques : l'Étang Blanc (JfG, STi), le Huchet avec 2 individus (PLe / RNNCH) et l'étang de Moïsan à Messanges (STi). Dernières mentions les 26/03 et 22/04 (tardif) au Huchet (PLe / RNNCH).

Blongios nain *Ixobrychus minutus* (d=18)

L'ensemble des données reçues concerne l'étang de Moïsan à Messanges, où après une observation précoce le 20/03, un nid contenant 2 jeunes âgés de 15 jours est découvert le 18/08. Il s'agissait certainement d'une deuxième reproduction pour ce couple, un second nid récemment occupé étant installé à proximité. Dernière mention sur ce site le 9/09 (STi *et al.*). Sur les autres étangs du Marensin, l'année est catastrophique puisque seul 1 mâle chanteur a été contacté à Léon (PLe / RNNCH).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* (d=141)

L'hivernage est principalement noté à Biarritz (3 le 6/01 au lac Mouriscot, FCa), Labatut (12 individus le 14/01, FCa & PLe) et Orthez (32 le 14/01, SDu & JBo). On compte au moins 1 nid au Huchet (PLe / RNNCH), 10 à Urt (GoL, SDu, ANe), 9 à Saint-Etienne-d'Orthe, 5 à Estibeaux (nouveau site) (FCa), 19 à Bascons, 15 à Benquet, 1 à Duhort-Bachen (CIC) et 32 à Artix (STi).

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* (d=22)

2 individus stationnent autour du lac de l'Ayguelongue du 1/07 au 7/08 (ANa, PhL *et al.*). Ailleurs, 1 les 13/06 à Orx (FCa), 12/07 à Bours (SPé) et 19/07 à Saint-Laurent-de-Gosse (SDu, GoL).

Site-dortoir	Effectif	Site-dortoir	Effectif
Vieux-Boucau-les-Bains (FCa)	148	Saint-Etienne-d'Orthe (FCa)	55
Ustaritz (GoL)	107	Orthez (SDu, JBo)	127
Biarritz (Mouriscot) (FCa)	36	Artix (coll. GOPA)	79
Biarritz (Roche Ronde) (FCa)	64	Arrêt-Darré (FBa)	6
Saint-Martin-de-Seignanx (FCa)	68		

Tableau 1 – Effectifs de Grand Cormoran recensés sur divers dortoirs (maxima de décembre 2011 à février 2012)

Site-dortoir	Effectif	Site-dortoir	Effectif
Ustaritz (GoL)	2421	Antin (HLa)	289
Saint-Martin-de-Seignanx (FCa)	660	Sarriac-Bigorre (SPé)	478
Orthez (SDu, JBo)	1327	Bours (DRa)	800
Artix (coll. GOPA)	310	Arrêt-Darré (FBa)	2705
Oloron-Sainte-Marie (SDu)	2000	Horgues (DRa)	986
Bruges-Capbis-Mifaget (JIG)	300	Puydarrieux (VDu)	1520
Escaunets (D. PORTIER / NMP)	420	Laran (P. HARLÉ & A. DE SEYNES / NMP)	400
Sauveterre (D. PORTIER / NMP)	214		

Tableau 2 – Effectifs de Héron garde-bœufs recensés sur divers dortoirs (maxima de novembre 2011 à février 2012)

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* (d=332)

Les effectifs hivernants atteignent semble-t-il des records sur un grand nombre de dortoirs (Tableau 2), mais une forte mortalité et la désertion des sites d'hivernage sont par la suite constatés au cours de la vague de froid de début février. Sur les colonies de reproduction, les effectifs seront logiquement en baisse : 85 nids à Urt (SDu), 115 à Saint-Etienne-d'Orthe, 120 à Heugas, 20 à Estibeaux, nouveau site (FCa), 55 à Bascons, 50 à Benquet, 10 à Hontanx (CIC) et 40 à Artix (STi). A noter un individu migrateur observé au col du Pourtalet (1800 M) au printemps 2012 (JIG, fide Gardes PNP).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* (d=673)

Dortoirs hivernaux de 4 individus à Horgues, 27 à Bours (DRa), 19 à Artix (coll. GOPA), 10 à Orthez (SDu, JBo), 41 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 4 à Ustaritz (GoL). Les colonies de reproduction ne sont guère florissantes, avec 20 nids à Artix et Urt, 7 à Sauvagnon (SDu), 3 à Saint-Martin-de-Seignanx, 2 à Saint-Etienne-d'Orthe, 10 à Heugas (FCa) et 1 à Benquet (CIC). Regroupements de 120 individus (migrateurs ?) le 21/08 à Plaiaundi (ANe).

Grande Aigrette *Ardea alba* (d=563)

Hivernage exceptionnel pour cette espèce, notée sur 116 communes du bassin de l'Adour. La fréquentation des zones agricoles est en nette

progression. À noter 27 en dortoir le 14/01 à Artix (coll. GOPA), un groupe remarquable de 21 individus le 3/05 dans un champ à Bordères-et-Lamensans (PhL) et un vol de 15 migrateurs le 11/10 à Messanges (STi). Aucun indice de reproduction n'est rapporté, malgré une présence continue sur de nombreux sites tout au long du printemps et de l'été et l'observation de parades nuptiales au Huchet (PLe / RNNCH).

Héron cendré *Ardea cinerea* (d=605)

Observation insolite d'un individu transportant le cadavre d'un Vanneau huppé le 13/02 (vague de froid) à Saint-Pé-de-Bigorre (JIG). Un groupe de 12 migrateurs pré-nuptiaux est signalé le 12/03 au Huchet (PLe / RNNCH). Au passage postnuptial, des groupes de migrateurs sont observés entre le 16/09 au Huchet (SDu) et le 13/10 au large de Saint-Jean-de-Luz (divers obs.). Pour les comptages aux colonies de reproduction, voir le Tableau 3. À noter un individu transportant une branche le 2/05 à Aydius (NeA) et un juvénile encore au nid le 12/08 à Orioux (FBa). En montagne, notamment 1 à Artouste (1350 m) le 31/07 (JIG) et 1 à Lescun (1000 m) le 25/10 (NeA).

Héron pourpré *Ardea purpurea* (d=70)

Premiers les 26/03 au Huchet (PLe / RNNCH) et Bazillac (SPé) et 1/04 à Orx (JfG), le passage se prolongeant au moins jusqu'au 30/05 à

Tableau 3 – Dénombrements effectués sur diverses colonies de Héron cendré dans le bassin de l'Adour en 2012

Colonie de reproduction	Couples	Colonie de reproduction	Couples
Lucbardez-et-Bargues (CIC)	15	Hontanx (CIC)	11
Coudures (STi)	1	Bascons (CIC)	6
Léon (PLe / RNNCH)	15	Renung (CIC)	12
Messanges (STi)	3	Duhort-Bachen (CIC)	48
Vieux-Boucau-les-Bains (STi)	1	Orthez (CIC)	2
Orx (SDu)	27	Artix (SDu)	91
Saint-Martin-de-Seignanx (SDu)	51	Sauvagnon (SDu)	30
Saint-Etienne-d'Orthe (FCa)	19	Labastide-Villefranche (SDu)	9
Orist (FCa)	6	Issor (SDu)	5
Heugas (FCa)	30	Ayros-Arbouix (PMi)	23
Benquet (CIC)	29	Cabanac (FBa)	2

Anglet (JFe). Des individus sont observés en juin à Saint-Etienne-d'Orthe (JIG, SPé) et Saint-Laurent-de-Gosse (FCa), mais la nidification n'est avérée qu'à Orx (2 nids occupés le 16/04, PLe) et au Huchet avec 4 couples (PLe / RNNCH). Après la dispersion postnuptiale, les derniers contacts ont lieu les 14/09 à Momas (DLa) et 3/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). À noter un groupe de 5 migrateurs le 12/08 à Messanges (STi).

CICONIIDAE

Cigogne noire *Ciconia nigra* (d=60)

Une attardée le 5/11 à Puydarrieux (VDu). Retours précoces les 24/02 à Tercis-les-Bains (FCa) et 25 et 26/02 à Armendarits (LGo) ; dernières les 5/06 à Espelette (LGo) et 6/06 à Pey (SPé, JIG). Le passage pré-nuptial concerne 26 individus pour 17 données (divers obs.). Premiers migrateurs postnuptiaux les 24/07 à Arrens-Marsous (ANa) et 26/07 à Momas (JIG), dernier le 31/10 à Saint-Pée-sur-Nivelle

(AHG) ; des groupes de 14 le 29/08 à Accous (MGu) et 12 le 5/09 à Bénéjacq (JIG).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (d=325)

Des observations hivernales (15 novembre au 15 janvier) sont rapportées sur 17 communes, principalement dans la basse vallée de l'Adour et sur la côte, avec jusqu'à 95 individus le 21/11 sur la décharge de Saint-Pée-sur-Nivelle (AHG). Un individu hiverne à Audaux et un autre à Biron (JBo, SDu). En migration pré-nuptiale, rassemblement de 200 le 2/03 à Saubusse (JFe) et dernières les 13/05 à Ustaritz (GoL) et 14/05 à Arrien (DLa). La population reproductrice des barthes de l'Adour est toujours en augmentation, atteignant 129 couples pour la partie landaise (J. Recarte / FDC 40, comm. orale) et au moins 6 pour la partie basque (ANa, GoL, FCa). Trois couples nichent également à Orx (divers obs.), 1 à Bordères-et-Lamensans (CIC) et 1 pour la première fois à Artix (DLa, SDu). La décharge de Saint-Pée-sur-Nivelle continue de rassembler un grand nombre de

cigognes, notamment lors du passage postnuptial : jusqu'à 275 le 16/08, 414 le 21/08 et 204 le 20/09 (GoL, AHG). Ailleurs, à noter des groupes de 100 le 26/08 à Baudreix (JIG) et 136 le 15/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (ANe).

THRESKIORNITHIDAE

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* (d=9)

Quelques individus fréquentent les barthes de l'Adour de février à avril : 6 le 23/02 à Saubusse (JFe), 2 le 7/03 et 5 le 28/03 à Saint-Vincent-de-Paul (FCa), de 3 à 9 individus à Pontonx-sur-l'Adour du 25/03 au 26/04 (GLa *et al.*), 4 le 13/04 à Urt (FCa). Ces différentes observations doivent concerner en grande partie les mêmes individus. Ailleurs, 1 à Puydarrieux le 13/05 (VDu).

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* (d=3)

Deux individus observés les 23 et 24/02 à Saubusse (JFe, FCa), 1 revu le 7/03 à Saint-Vincent-de-Paul (FCa).

Spatule blanche *Platalea leucorodia* (d=207)

Maximum de 20 hivernants à Orx, 16 à Saint-Martin-de-Seignanx (divers obs.) et 3 à Pontonx-sur-l'Adour (SLe, JFe, STi). En migration pré-nuptiale, les mouvements débutent à la mi-février et les dernières sont notées le 7/05 à Messanges (STi), mais des stationnements ont lieu jusqu'à fin juin au Huchet (PLe / RNNCH) ; on compte jusqu'à 50 individus en halte le 2/03 à Saubusse (JFe). La colonie de Saint-Martin-de-Seignanx s'étoffe, avec 12 nids recensés (J. Recarte / FDC 40, comm. orale) ; la reproduction est pour la première fois avérée à Saint-Etienne-d'Orthe (2 nichées) et Heugas (3 nichées) (FCa *et al.*), les effectifs de la colonie d'Orx n'ayant pas été communiqués. En migration postnuptiale, maxima de 190 en stationnement le 21/08 à Orx (FCa), le passage semblant moins fourni qu'en 2011. Au Huchet, le passage est observé du 11/08 au 11/10 avec un pic migratoire entre le 20 et le 22/08 (PLe / RNNCH). Seules mentions à l'intérieur des terres, 1 individu le 26/11 à Saint-Sever, jusqu'à 27 le 12/09 à Benquet (CIC) et 1 les 16 et 31/10 à Puydarrieux (VDu).

PHOENICOPTERIDAE

Flamant rose *Phoenicopterus ruber*

PODICIPEDIDAE

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (d=276)

Comme à l'accoutumée, les hivernants se cantonnent sur trois sites : Bours avec 103 oiseaux le 17/01 (DRa, SPé), Artix avec 70 les 17/12 et 2/01 (JIG) et sur le lac des Gaves avec 46 le 11/01 (PMi). La reproduction est rapportée sur moitié moins de sites que l'an passé ; elle s'étale du 12/06 à Artix jusqu'au 20/08 à Saint-Gein (CIC). À noter la première reproduction de l'espèce à Puydarrieux avec l'observation de 2 juv. le 2/07 (VDu). Le record d'altitude est toujours détenu par le lac de Soum (Arbéost, 1500m) avec des jeunes encore en duvet le 16/08 (SDu, SHo). Déjà 94 à Bours le 29/10 (DRa).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (d = 381)

Alors qu'un jeune de l'année quémande de la nourriture le 17/11 à Bours (DRa) et que des parades nuptiales se prolongent jusqu'au 25/11 sur le lac de l'Arrêt-Darré (DRa, JmF), les populations hivernantes se mettent peu à peu en place. Elles atteignent 60 oiseaux le 11/02 à Miramont-Sensacq (FCa), 52 le 12/02 sur l'étang de Léon (STi), 42 sur le lac de l'Arrêt-Darré le 14/01 (coll. GOPA) ou encore 38 le 3/01 à Puydarrieux (JIG, JpP). La reproduction débute par des parades le 6/02 à Bours. Des jeunes sont vus du 1/06 à Saint-Gein (CIC) jusqu'au 8/10 à Orx (FCa). Une ponte est déposée mi-août à Léon, où 3 couples sont cantonnés (PLe / RNNCH).

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* (d=53)
Observations hivernales à Plaiaundi (JFe, GoL) avec un max. de 6 oiseaux le 3/01 (STi), en baie de Txingudi (FCa, ANe, APa), à Puydarrieux (VDu), Capbreton (SDu, SHo), Vieux-Boucau (FCa, STi), Miramont-Sensacq (FCa, ANa),



Après le littoral, la région d'Aire-sur-Adour apparaît comme le second « site » régional pour le **Grèbe à cou noir** (photo J. FERRÉ).

Pontonx-sur-l'Adour (GLa), Cazères-sur-l'Adour et Montgaillard-40 où un oiseau blessé poursuivra son apparent rétablissement jusqu'au 1/05 (CIC). Retour de l'espèce le 15/07 à Cazères-sur-l'Adour où un passage notable est détecté le 2/09 avec 11 oiseaux (CIC).

ACCIPITRIDAE

Bondrée apivore *Pernis apivorus* (d=164)

Premières les 25/04 à Suhescun et Armendarits (AAn, C. Rolland) et 27/04 à Trébons (DRa), des migrateurs pré-nuptiaux étant signalés jusqu'au 19/05 à Momas (ANa). Des parades nuptiales sont observées entre le 16/05 à Riondes-Landes (STi) et le 21/07 à Collongues (FBa), un couple s'étant reproduit dans une vieille aulnaie à Léon (PLe / RNNCH). Au passage postnuptial, premières les 10/08 à Bénéjacq (JIG) et 11/08 à Messanges (STi, PhL), groupes de 100 le 20/08 à Bénéjacq (JIG) et 93 à Gerde le 3/09 (SPé), dernières les 28/09 à Bayonne (JmF) et 2/10 au col de Soulor (JIG).

Élanion blanc *Elanus caeruleus* (d=375)

L'espèce est mentionnée sur 133 communes au cours de la période considérée. Un exceptionnel dortoir hivernal est découvert le 2/11 à Sauverterre-65, rassemblant au maximum 58 individus le 25/12 (FBa, JmF *et al.*) ; deux autres sites sont localisés à Uzein (8 individus, PhL) et Préchacq-Navarrenx (10 individus, SDu & JBo). La population reproductrice du bassin de l'Adour est toujours en pleine expansion, avec au moins 101 couples repérés en 2012 dont 12 dans les

Hautes-Pyrénées (F. Delage, coordinateur du « Groupe Élanion »). À signaler une première reproduction réussie aux portes d'Oloron-Sainte-Marie (SHo, SDu). Un migrateur est signalé au col de Lindux le 7/09, 2 au col d'Organbidexka le 17/09 et 1 au col de Lizarrieta le 29/10 (www.migracion.net).

Milan noir *Milvus migrans* (d=607)

Un individu hiverne sur la décharge de Loubajac (JIG) et deux autres sont signalés les 22/12 à Saint-Pée-sur-Nivelle (AHG, APa) et 8/01 à Barbazan-Dessus (DRa). Les premiers migrants apparaissent les 29/01 à Saint-Castin (JjH), 31/01 à Ustaritz (GoL) et 11/02 à Haut-de-Bosdarros (PhL), Bénéjacq (JIG) et Tarbes (JjH). À noter un groupe de 184 en halte le 25/02 à Bénac (DRa) et 373 migrants le 28/02 à Bénéjacq (JIG), le passage se prolongeant jusqu'au 17/05 à Trébons (DRa).

Les premiers nids sont visités les 5/03 à Bésin-grand (JIG) et 7/03 à Ouzous (PMi) ; 2 couples couvent le 26/03 à Salles-Adour (DRa) et les premiers juvéniles volants sont notés le 9/06 à Saint-Pée-sur-Nivelle (FCa). Dix nichées contrôlées le 5/06 à Saint-Martin totalisaient 14 jeunes (DRa). Des mouvements postnuptiaux sont décelés dès le 26/06 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL) et le 7/07 dans la plaine d'Ossun, où environ 2000 individus (locaux et en halte) sont rassemblés en soirée (DRa). Un effectif remarquable de 4824 migrants est dénombré le 7/08 au col de Soulor (A. Binvel / OCL), avec un passage à 2400 m d'altitude au Soum d'Aas (Laruns) le 13/08 (SDu) ; dernières mentions les 5/10 à Arcizans-Dessus (DRa) et 18/10 à Escou (SDu).

Milan royal *Milvus milvus* (d=571)

Des migrants postnuptiaux sont encore observés tardivement les 4/12 à Salles-Angelès (PMi) et 7/12 à Laruns (SDu). En hivernage, les comptages aux dortoirs ont permis de dénombrer 1182 milans en Pays Basque, 558 en Béarn et 682 dans les Hautes-Pyrénées (source : A. de Seynes / LPO Mission Rapaces). Le passage de migrants pré-nuptiaux est observé entre le 22/02 à Saint-Gein (PhL) et Saint-Sever (CIC) et le 17/05 à Pau (PhL). Au moins 6 couples sont

localisés en période de reproduction en vallée d'Argelès-Gazost, l'un d'eux produisant 3 jeunes qui s'envolent vers le 9/06 (PMi). Au passage automnal, premiers le 4/09 à Biriatiou (AHG), avec des maxima de 286 migrateurs le 3/10 au col de Soulor (JIG) et de 130 le 24/10 à Messanges (STi).

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla (d=1)**

Une seule mention, celle d'un immature survolant les barthes de Rivière-Saas-et-Gourby le 19/02 (STi, G. Blake, S. Tardy).

Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* (d=60)

Au cours de la saison 2012, les 7 couples cantonnés dans les Pyrénées-Atlantiques déposent 6 pontes mais n'élèvent qu'un jeune, tandis que les 13 couples des Hautes-Pyrénées déposent 12 pontes qui produisent 6 jeunes à l'envol (source : M. Razin / LPO Mission Rapaces, Circulaire réseau Casseur d'os n° 61). En limite de l'aire de répartition, un adulte est observé le 12/02 à Musculdy (SDu, JBo, MGu) et un autre le 25/02 à Tardets-Sorholus (SHo). Deux adultes émettent des sifflements le 7/08 à Laruns (SHo, SDu, PNa).

Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* (d=75)

Les premiers sont de retour les 26/02 à Armendarits (LGo) et 6/03 à Bedous (SDu). Des individus immatures (peu fréquents) sont signalés les 28/06 à Oloron-Sainte-Marie (SDu, SHo, PNa) et 12/07 à Armendarits (GoL). En plaine, l'espèce est observée entre autres à Rébénacq (DLa), Saint-Martin (DRa), Artix (STi, PhL), Gurs (FDA), Ordizan, Trébons (DRa), Momas et Ger (JIG), ainsi qu'à 25 reprises à Bénéjacq (JIG). Dernières mentions les 11/09 à Campan (JIG) et 16/09 au col de Soulor (ANa). En 2012, on compte 43 couples cantonnés dans les Pyrénées-Atlantiques (18 en Pays Basque et 25 en Béarn), produisant 29 jeunes, et 13 couples dans les Hautes-Pyrénées qui produisent 11 jeunes (source : E. Kobierzycki / LPO Mission Rapaces). Deux jeunes sont volants le 16/08 au Pibeste (PMi) et un le 27/08 à Arbéost (JpP, JIG, FCa).

Vautour fauve *Gyps fulvus* (d=306)

Les mentions en plaine (83 cette année, dont 7 dans les Landes) s'étalent du 10/03 à Mouguerre (ANa) et Bénéjacq (JIG) au 30/10 à Goudon (FBa), sans compter quelques observations hivernales à Ustaritz (GoL). À noter 50 individus en curée le 28/05 à Estibeaux (FCa). Le dénombrement exhaustif de la population nicheuse en 2012 a permis de compter 386 nids en Pays Basque, 381 en Béarn et 55 dans les Hautes-Pyrénées (source : M. Razin / LPO Mission Rapaces) ; les effectifs sont donc toujours en expansion. Un individu observé le 15/06 à Borce avait été marqué le 29/09/2009 à Santa-Cilia-de-Jaca (Aragon) (SDu). Un juvénile n'a toujours pas pris son envol le 9/09 à Arbéost (ANa).

Vautour moine *Aegypius monachus (d=2)**

Seulement deux observations : un adulte / subadulte le 14/06 à Itxassou et un immature le 5/07 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (AAn).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* (d=135)

Premiers retours les 22/02 à Viellenave-d'Arthez (ANa), 27/02 en vallée d'Ossau (D. Meininger) et 8/03 au Huchet et à Saint-Lon-les-Mines (PLe / RNNCH). Des couples cantonnés sont signalés en Pays Basque à Itxassou, Saint-Martin-d'Arrossa, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Bidarray, Sainte-Engrâce (AAn) ; dans les Landes à Vielle-Saint-Girons, Moliets-et-Maa (PLe / RNNCH), Pontenx-les-Forges, Sabres, Labrit, Lencouacq, Laluque (STi), Onesse-et-Laharie et Lesperon (PhL). Un jeune est observé volant dès le 12/07 à Bidarray (AAn). En migration post-nuptiale, total remarquable de 21 individus le 25/09 à Arbéost (JIG, CGu) et derniers les 3/10 sur ce site (JIG) et 27/10 à Messanges (STi, PhL, FCa).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (d=209)

L'hivernage, principalement observé à Orx et dans les barthes de l'Adour (divers obs.), concerne aussi le Huchet (PLe / RNNCH), les étangs de Léon et d'Hardy (STi), la moyenne vallée de l'Adour et ses environs à Cazères-sur-

l'Adour, Hontanx (CIC) et Aire-sur-l'Adour (STi), ainsi que la lande de Ger (PhL). En migration prénuptiale, premiers les 12/03 à Arrens-Marsous (ALe) et 13/03 à Itxassou (LGo) ; dernier le 29/04 à Uzein (SDu). Des mentions en période de reproduction au Huchet (PLe / RNNCH), à Saint-Laurent-de-Gosse, Guiche (FCa) et Cazères-sur-l'Adour (CIC), mais sans indice probant. Le passage postnuptial débute ensuite les 25/07 à Momas (JIG) et 28/07 à Bilhères (PhL), avec un total de 24 migrateurs le 24/09 au col de Soulor (JIG, CGu).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (d=202)
Quelques migrateurs sont encore signalés jusqu'au 16/11 à Capbreton (SPé, FBa). Le dortoir de la lande de Ger compte 18 individus le 11/11 (DRa) et au moins 10 le 1/01 (JIG, JpP) ; un autre site découvert à Sauveterre-65 rassemble 10 individus le 30/11 (DRa, JmF, FBa). La migration prénuptiale est signalée du 2/03 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL) au 20/03 à Bénéjacq (JIG). En période de reproduction, 32 communes sont concernées cette année par des mentions de l'espèce (divers obs.), mais un seul couple cantonné est signalé, le 1/04 à Suhescun (AAn). Premier migrateur postnuptial le 14/09 au col de Soulor (JIG, CGu).

Busard pâle *Circus macrourus* (d=2)**
Un mâle adulte en migration le 14/09 à Aydius (PhL) et 2 mâles (ad. et 2^{ème} année) le 17/09 à Puydarrieux (VDu), données homologuées par le CHN. Une observation le 13/09 au col d'Organbidexka a été homologuée (www.chn-france.org), avec un total de 4 migrateurs sur ce site à l'automne 2012 et des observations également depuis les cols de Lindux (4 individus) et de Lizarrieta (1 le 17/09) (www.migraction.net).

Busard cendré *Circus pygargus* (d=28)
Seulement 3 mentions de migrateurs prénuptiaux, les 22/04 à Sarriac-Bigorre (FBa), 28/04 à Lagos (JIG) et 3/05 à Moumour (SHo). Des observations postérieures à Garrosse et Lesperon (PUT, STi, PhL) concernent probablement des oiseaux nicheurs. La migration postnuptiale débute les 14/07 à Bénéjacq (JIG) et 6/08 à


Arette (SDu), pour s'achever très tardivement le 28/10 à Tarnos (ANa).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* (d=38)
Trois oiseaux paradant ont été observés simultanément le 22/03 autour de l'étang de Léon (PLe/RNNCH) ; ailleurs l'espèce est notée en période de reproduction à Tosse (PLe), Garrosse, Riondes-Landes, Messanges (STi), Pontonx-sur-l'Adour (GLa), Saint-Etienne-de-Baïgorry, Saint-Just-Ibarre (AAn), Bordères (JIG), Ger (DLa, ANa), Laruns (SDu, SHo) et Betplan (JmF). Un migrateur le 19/09 à Aureilhan-65 (DRa). Des prédateurs sont observés sur un Pigeon domestique (PLe) et un Moineau domestique (STi).

Épervier d'Europe *Accipiter nisus* (d=259)
Encore un migrateur le 12/11 à Messanges (STi). Des prédateurs (ou tentatives) sont signalés (surtout en hiver) sur Gallinule poule-d'eau, Tourterelle turque, Martin-pêcheur, Alouette des champs, Pipit farlouse, Bergeronnette grise, Rougegorge, Merle noir, Grive musicienne, Mésange charbonnière, Sittelle torchepot et Etourneau sansonnet (divers obs.). Des parades nuptiales sont observées dès le 9/03 à Heugas (JIG, ANe), alors qu'un migrateur prénuptial est encore signalé le 9/04 à Biriou (AHG). La reproduction est certaine (jeunes vus ou entendus) à Aire-sur-l'Adour, Villeneuve-de-Marsan (CIC), Saint-Cricq-du-Gave (FCa), Aureilhan-65 (DRa) et Chis (SPé). Des migrateurs postnuptiaux sont signalés du 2/09 à Messanges (STi) au 24/10 à Biarritz (FCa).

Buse variable *Buteo buteo* (d=772)
L'observation de 28 individus en vol vers le Sud en tombée de nuit, accompagnés de 56 Milans royaux, le 26/02 à Puydarrieux (DRa), concerne probablement des migrateurs en recherche d'un site de halte nocturne. Encore un migrateur le 11/03 à Tostat (SPé). Les premières parades nuptiales sont notées le 24/02 à Tercis-les-Bains (FCa). Des migrateurs postnuptiaux sont signalés les 6/09 au col de Soulor (SDu, PNa) et 29/10 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL).

Buse pattue *Buteo lagopus***



Aigle de Bonelli observé le 3 octobre à Alçay-Alçabéhéty-Sunharette (photo J.-L. SOULÉ).

Un individu est observé à Urrugne le 30/10, lors d'un suivi de la migration « Pigeons » par OCL (M. Lebourgeois, OCL), sous réserve d'homologation par le CHR.

Aigle criard *Aquila clanga*** (d=38)

Un adulte stationne à Saint-Martin-de-Seignanx du 10/11 au 29/02, accompagné par un individu de 2^{ème} année du 10 au 28/01 (FCa *et al.*). Un adulte (pouvant être celui de Saint-Martin-de-Seignanx) est également observé les 10 et 11/02 à Orx (JFe, STi). Un migrateur est signalé le 24/10 au col de Lizarieta et un autre le 30/10 au col d'Organbidexka (www.migraction.net).

Aigle pomarin *Aquila pomarina***

Un individu est observé le 22/09 au col de Lindux et un autre le 28/09 au col d'Organbidexka (www.migraction.net). Le CHN a homologué le survol le 11/10/2010 d'un individu juvénile équipé de balise Argos au nid à Rostock-Allemagne sur le département des Landes (Lipostey, Lit-et-Mixe et Léon notamment), constituant la première donnée pour ce

département. Ce même individu a survolé Sare le 12/10/2010, en route vers l'Espagne (www.chn-france.org).

Aigle botté *Aquila pennata* (d=218)

La saison 2011-2012 se caractérise par des mentions tardives, puis hivernales : les 1/11 à Peyrehorade (PLe), 9/11 et 2/02 à Montaner (FBa), 21/11 à Puydarrieux (VDu), 3/01 à Trie-sur-Baïse (JIG, JpP) ; un cas d'hivernage est observé à Saint-Martin-de-Seignanx, où un individu est signalé du 8/12 au 3/01 (JIG, FCa *et al.*). D'autres mentions de février concernent des retours précoces : 18/02 à Collongues (FBa), 26/02 à Bidarray (L. Goñi) et 29/02 à Arreau (J.C. Alberny). Un site de reproduction est réoccupé le 22/03 à Bénéjacq, avec des parades le 6/04 (JIG). Pour deux couples suivis dans la vallée du Gave d'Oloron, la couvaison est constatée les 21 et 23/04 et un jeune s'envole de chaque nid (JBo). En limite de l'aire de reproduction, un couple élève au moins un jeune jusqu'à l'envol au Huchet (PLe / RNNCH). Un migrateur probable dès le 9/08 à Lescun, à plus de 3000 m d'altitude (SDu), alors que des individus « locaux » sont encore observés les 23/09 à Urrugne (GoL) et 25/09 à Orx (PhL). Dernière mention le 28/10 à Lahontan (ANa).

Aigle royal *Aquila chrysaetos* (d=54)

Rare observation d'un juvénile en plaine, le 10/04 à Bastanès (JBo) ; également un individu le 29/04 à Trébons (DRa). Des parades dès le 26/01 à Arbéost (JIG) et un adulte couvant au nid dès le 12/03 à Larrau (JBo). Bilan de la reproduction en 2012 dans les Pyrénées occidentales : sur 48-50 couples cantonnés (dont 3 frontaliers), 42 ont été suivis et seulement 18 pontes ont été constatées, pour un total très faible de 7 aiglons à l'envol (dont une nichée de 2 jeunes) (données PNP, Saiak & GOPA).

Aigle de Bonelli *Aquila fasciata** (d=3)

Un juvénile est observé le 11/08 sur la lande de Ger (JIG), un juvénile le 6/09 à Estérençuby (BGo) et un autre est photographié le 3/10 à Alçay-Alçabéhéty-Sunharette (J.-L. Soulé, photo ci-contre). Une mention le 22/09 au col d'Organbidexka (www.migraction.net).

Aigle ibérique *Aquila adalberti***

PANDIONIDAE

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* (d=141)

Un migrateur tardif le 12/11 à Campan (DRa) et 2 le 20/11 sur le lac de l'Ayguelongue (STi, PhL). Des hivernants sont installés à Orx (divers obs.), Lahontan et Saint-Cricq-du-Gave (FCa, PLe *et al.*), Bésingrand (JIG), Moumour (SHo, SDu, JBo), Puydarrieux (VDu, JIG, JpP). Des mentions hivernales également à Soustons (STi), Sames (PLe), Vielleségure, Laàs et Aren (JBo). Des migrateurs prénuptiaux sont signalés du 2/03 à Saubusse (JFe) au 30/05 à Tarnos (JIG, ANe). Au passage postnuptial, premiers les 21/07 au Huchet (PLe / RNNCH) et 14/08 à Bésingrand (JIG) ; derniers les 23/10 au Huchet (PLe / RNNCH) et 25/10 à Messanges (STi).

FALCONIDAE

Faucon crécerellette *Falco naumanni** (d=10)

La fin d'été 2012 voit un bel afflux de cette espèce, avec un nombre record d'observations, principalement en zone de montagne où les faucons se nourrissaient d'Orthoptères : 12 le 11/08 à Sarrance (SHo), découverte d'un cadavre le 13/08 à Laruns (SDu, DLa), 3 très probables à Gerde et 5 à Cieutat le 15/08 (FBa, SPé), 2 le 16/08 au col de Soulor (SHo, SDu), 11 le même jour au Somport (JIG), 24 le 18/08 au col du Tourmalet (J.M. Laffitte), 2 le 22/08 à Pumarous (HLa), 4 le même jour à Borce (SDu) et 3 le 26/08 à Urdos (SDu). Un migrateur est enfin signalé le 15/10 sur le col de Lindux (www.migration.net).

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (d=340)

Quelques individus s'attardent l'hiver en montagne, tel celui observé le 26/11 à Louvie-Soubiron vers 1600 m (PhL). Des migrateurs prénuptiaux les 13/03 à Ustaritz et 14/03 à Jatxou (GoL). Accouplements observés entre le 2/03 à Bénéjacq et le 11/05 à Laruns (JIG) ; premiers jeunes volants signalés le 3/07 à Estérençuby (AAn), mais 3 encore au nid le 30/07 près du col du Pourtalet (JIG). 6 individus se regroupent pour harceler un Aigle royal le 31/07 à Gavarnie (FBa). À noter la capture peu cou-

rante d'une hirondelle le 17/07 à Ustaritz (GoL). Un migrateur postnuptial le 15/10 à Anglet (FCa).

Faucon kobez *Falco vespertinus** (d=5)

Deux en migration le 5/05 à Trébons (DRa), 1 le 18/05 à Barraute-Camu (SHo), 1 le 23/05 à Lacassagne (FBa) et 1 les 26 et 27/05 à Ger (JIG et coll. GOPA).

Faucon émerillon *Falco columbarius* (d=52)

Encore un migrateur le 11/11 à Messanges (STi). Les observations hivernales (novembre-février) concernent 13 communes (divers obs.), le dortoir de la lande de Ger regroupant 10 individus le 30/11 (PhL) et 7 le 1/01 (JIG, JpP). Dernières mentions printanières les 25/03 à Ger (coll. GOPA) et 10/04 à Bénéjacq (JIG). Au passage postnuptial, premiers les 6/09 au col de Soulor (SDu, JIG, PNa) et 16/09 à Messanges (STi, SDu). Un individu migre en mer le 25/09 à Capbreton (PhL).

Faucon hobereau *Falco subbuteo* (d=320)

Un migrateur précoce le 14/03 à Halsou (GoL), puis premiers les 2/04 à Garrosse (PUT) et 5/04 à Puydarrieux (VDu). L'année 2012 restera marquée par la découverte d'un site exceptionnel pour le dénombrement des migrateurs prénuptiaux, au niveau de l'Adour à Trébons : 885 individus y défilent en 2 heures le 5/05 ! Environ 3000 individus ont été recensés au cours d'un suivi quasi-quotidien, du 22/04 au 23/05 (DRa). En ce qui concerne la reproduction, de nombreux couples cantonnés sont signalés mais aucun nid n'a été suivi ; des jeunes volants ne sont observés qu'à partir du 8/09 à Messanges (STi). À noter un individu en chasse au col du Pourtalet (1750 m) le 14/06 (JIG). En migration postnuptiale, notamment 5 longeant la côte le 25/09 à Capbreton (PhL) ; derniers les 24/10 à Villefranque, 26/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 27/10 à Messanges (STi, FCa, PhL).

Faucon d'Eléonore *Falco eleonora** (d=25)

L'été 2012 a connu un remarquable afflux sur le littoral landais, avec pas moins de 11 mentions (concernant plusieurs individus) à Messanges entre le 21/08 et le 23/09 (STi *et al.*), ainsi que des observations au Huchet les 31/07, 22 et

23/08 (PLe / RNNCH), à Garrosse le 7/08 (PhL), Lesperon le même jour (STi, PhL), Saint-Pierre-d'Irube le 9/08 (GoL), Ondres le 10/09 (FCa) et Capbreton le 24/09 (STi, FCa). Deux mentions bien à l'intérieur des terres, le 26/08 à Puydarrieux (*fide* DRa) et en août au col de Soulor (OCL). Un individu est également signalé le 9/08 au col d'Organbidexka et 3 au col de Lindux les 11/08, 11/09 et 19/09 (www.migration.org).

Faucon lanier *Falco biarmicus* (d=1)**

1 individu est signalé le 6/10 à Messanges (STi, G. Blake *et al.*), sous réserve d'homologation par le CHN.

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (d=160)

Encore un migrateur le 18/11 à Morcenx (PUT). L'hivernage concerne 23 communes de plaine (période novembre-février), les derniers individus étant signalés les 27/04 à Saint-Jean-de-Marsacq (FCa) et 29/04 à Cazères-sur-l'Adour (coll. GOPA). En plaine, les couples d'Escos (JBo) et de Boucau (ANe, FCa) se sont reproduits avec succès ; quelques mentions en période de reproduction à Bénéjacq (JIG), Montaner (FBa) et Tostat (SPé), sans indice probant.

RALLIDAE

Rôle d'eau *Rallus aquaticus* (d=204)

En hivernage, les seules données de l'intérieur des terres concernent les communes de Bougue, Bégaar (STi), Hontanx, Renung, Duhort-Bachen (CIC), Uzein (PhL, STi), Bours (DRa, SPé) et Puydarrieux (VDu). En période de reproduction, présence de l'espèce au Huchet (PLe / RNNCH), à Messanges, Villefranque (STi), Saint-Gein (CIC) et sur le lac de l'Ayguelongue où un individu est observé le 19/05 (ANa). Des poussins sont entendus le 6/06 au Huchet (PLe / RNNCH) et observés tardivement le 28/08 à Messanges (STi, FCa, GoL).

Marouette ponctuée *Porzana porzana* (d=6)

Une seule mention printanière, le 27/03 sur le lac de l'Arrêt-Darré (FBa), puis 2 le 26/09 et 1 les 6, 12 et 25/10 à Messanges (STi).

Marouette poussin *Porzana parva**

Marouette de Baillon *Porzana pusilla***

Un adulte est observé et photographié du 12 au 14/07 dans les barthes de la Nivelle, observation homologuée par le CHN (www.chn-france.org). Pour mémoire, un juvénile blessé par un chat à Anglet avait été recueilli le 24/08/2007 et apporté en centre de soins, mais n'avait pu être sauvé (GoL, rapport CHN 2011).

Rôle des genêts *Crex crex* (d=1)

Donnée étonnante d'un oiseau chanteur (sans doute en halte pré-nuptiale) le 30/03 à Aire-sur-l'Adour (A. Waechter). Un individu est par ailleurs observé le 23/09 au col d'Organbidexka, 1^{ère} donnée pour le site (www.migration.net).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* (d=346)

Maxima de 53 à Bézingrand le 9/11 (PhL), 13 à Lestelle-Bétharram le 27/11 (JIG), 30 à Castet le 21/01 (SDu), 24 à Plaiaundi le 29/01 (GoL) et 35 à Bours le 14/03 (SPé). La période de reproduction est très étalée : sur l'étang de Moïsan à Messanges, des poussins sont observés dès le 7/05 et jusqu'au 22/09 (STi). Un individu est victime d'une collision routière le 16/10 à Montaner, loin de tout point d'eau (FBa).

Foulque macroule *Fulica atra* (d=419)

En période hivernale (novembre-mars), les sites de Bours (jusqu'à 141 individus, SPé, PNa & JIG), Cazères-sur-l'Adour (jusqu'à 423, CIC), Montgaillard (836 répartis sur 2 sites, CIC), Labatut (310, PLe), Lahontan (150, PLe & FCa), les étangs Blanc et d'Hardy (351 et 295, STi), Saint-Martin-de-Seignanx (170, FCa), Orx (341, FCa) et Plaiaundi (500, GoL) accueillent les plus gros rassemblements. Quelques nouvelles localités de reproduction : Saint-Laurent-de-Gosse, Heugas, Mugron (FCa), Cazères-sur-l'Adour, Bordères-et-Lamensans, Arthez-d'Armagnac (CIC), Coudures (STi), Doazit, Castel-Sarrazin (PLe), Sauvagnon (SDu), Antin (FBa) et Artagnan (SPé).

GRUIDAE

Grue cendrée *Grus grus* (d=289)

Le passage postnuptial (Figure 1) bat sont pleins les 7, 9, 12 et 14/11, des migrateurs faisant encore route au Sud le 24/12 à Orist, Peyrehorade et Saint-Paul-les-Dax (PLe). En hivernage, les effectifs maximum signalés sont de 2100 à Saint-Martin-de-Seignanx le 10/01 (FCa) et 171 à Orx le 16/01 (FCa & RNN des Marais d'Orx). Début du passage prénuptial les 9/02 à Ustaritz (GoL) et 10/02 à Orx (JFe, FCa), celui-ci se terminant le 22/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) avec un effectif remarquable de 10 000 le 24/02 à Pontonx-sur-l'Adour (JFe). La Figure 2 permet de visualiser le déroulement de la migration. Des individus isolés sont encore notés les 19/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (JFe), 30/05 à Tercis-les-Bains (JIG, ANe) et 4 et 8/06 à Rivière-Saas-et-Gourby (SHo, JBo, FCa). Premiers retours postnuptiaux les 6 et 7/10 à Hendaye (APa), 17/10 à Morcenx (PUT) et 18/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) ; le passage est ensuite surtout sensible du 24 au 29/10 avec l'arrivée du froid (divers obs.).

Grue du Canada *Grus canadensis***

Grue demoiselle *Anthropoides virgo***

OTIDIDAE

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* (d=2)

De nouveau des données estivales dans la plaine du Pont-Long, faisant penser à une tentative de reproduction : une femelle en vol le 26/07 à Momas, puis un mâle chanteur accompagné d'une femelle les 10 et 11/09 à Uzein (PhL). Ces mentions bien documentées sont très surprenantes au vu du déclin généralisé de l'espèce et de l'absence de reproduction signalée autrefois dans le bassin de l'Adour : à suivre !

Outarde barbue *Otis tarda* (d=2)**

Un individu est observé le 23/03 à Armendarits (J.B. Etchebarne & L. Bisquey / ONCFS, *fide* SDu) et un mâle signalé le 15/08 à Geüs-d'Oloron (C. Pebosq *fide* SDu). De plus, 4 individus ont été signalés le 19/07 à Saint-Pé-sur-Nivelle (N. Van Meer Ordoqui, www.faune-aquitaine.org).

BURHINIDAE

Edicnème criard *Burhinus oedicnemus* (d=27)

Nombreuses mentions hivernales, principalement en période de vague de froid, sur la côte basque (Plaiiaundi, Biarritz, Anglet, Villefranque) et landaise (Tarnos, Labenne, Capbreton, Vieux-Boucau-les-Bains, Saint-Martin-de-Seignanx), mais aussi à l'intérieur des terres : Coaraze (CGr), Bourg-de-Bigorre (J. Johnston), Clarac et Bordes (VDu). À signaler des groupes de 75 oiseaux le 18/02 à Txingudy (J.M. Gimon *Ardeola*, 59/1 2012),

32 individus sur l'aéroport de Biarritz et de 12 sur le golf d'Anglet le 4/02 (FCa) ; dernière mention printanière le 31/03 à Clarac (FBa, VDu). Observation insolite d'un individu le 24/07 à Taller (STi), sans indice de reproduction, puis retour postnuptial les 13/10 à Ger (ANa) et 15/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

RECURVIROSTRIDAE

Echasse blanche *Himantopus himantopus* (d=72)

Retour de l'espèce le 22/03 à Saint-Etienne-d'Orthe (FCa) et les 25 et 26/03 à Puydarrieux (DRa, VDu). En migration prénuptiale, observée du 27/03 au 18/06 au Huchet, où des accouplements, sans suite, sont notés pour la 3^{ème} année consécutive (PLe / RNNCH). À nouveau 6 couples cette année à Pontonx-sur-l'Adour, dont 3 donneront naissance à 10 poussins (GLa). Au passage postnuptial, premières le 12/07 au Huchet (PLe / RNNCH), puis notamment 28 le 23/08 à Orx (JIG, ANe, JfG). Dernière observation le 25/09 à Orx (PhL).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* (d=38)

L'hivernage complet de 1 à 12 oiseaux est constaté en baie de Txingudy (JFe, EDu, AHG *et al.*) ; contacts hivernaux également au Huchet (STi), à Orx (JIG, JpP, ANe), Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), Artix (ANa, PhL), Puydarrieux (VDu) et sur le lac du Gabas (DRa). Mouvement prénuptial sensible dès le 16/02 avec 18 oiseaux à Plaiiaundi puis 20 le 29/02 (JFe). En migration postnuptiale, 19 à Orx le 13/09 (FCa).




Figure 1 – Migration postnuptiale 2011 de la Grue cendrée dans le bassin de l’Adour, présentée sur une base quotidienne et exprimée en nombre de données reçues.




Figure 2 – Migration pré-nuptiale 2012 de la Grue cendrée dans le bassin de l’Adour, présentée sur une base quotidienne et exprimée en nombre de données reçues.

HAEMATOPODIDAE

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* (d=38)

Présent jusqu'au 29/04 à Hendaye (FDA) en petits effectifs, avec un maximum de 5 oiseaux les 11 et 23/12 en baie de Txingudi (FCa). Retour postnuptial à partir du 13/08 à Messanges (STi). Lors du passage migratoire, un effectif de 62 oiseaux est noté en deux vols le 24/09 à Capbreton (SDu, STi, FCa). Une observation à l'intérieur des terres à Puydarrieux le 10/06 (VDu).

CHARADRIIDAE

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (d=51)

10 en vol le 6/11 à Capbreton (coll. GOPA) et un isolé le même jour à Sauveterre-de-Béarn (SDu, JBo, PhL). En hivernage, des groupes de 170 sont observés à Saubusse (PLe, FCa), 55 à Préchacq-Navarrenx (SDu), 60 au lac de l'Ayguelongue (JIG), 40 à Saucède (SDu) et 36 à Villefranque (GoL). Le 7/02, un total de 325 individus est dénombré entre Saint-Etienne-d'Orthe, Pey et Saubusse (FCa) soulignant l'importance de la vague de froid de cette année. Encore 300 oiseaux le 24/02 à Saubusse (FCa). Les derniers sont vus en migration au Huchet les 12 et 13/03 (PLe, RNN Courant-d'Huchet). Premier retour automnal le 28/10 à Ossun avec un groupe de 6 oiseaux (CHO).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* (d=99)

En hivernage, classiquement le long de la côte avec 65 en baie de Txingudi (STi) et 26 à Hossegor (SLe) le 3/01. Derniers le 24/05 à Seignosse (JFe). Premier retour assez précoce le 21/08 à Orx (FCa) puis le 24/09 à Capbreton (SDu, STi, FCa). Un oiseau fait halte à Puydarrieux le 31/10 (VDu).

Vanneau sociable *Vanellus gregarius***

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (d=470)

A l'automne, les effectifs augmentent en novembre-décembre, comme par exemple à Saint-Martin-de-Seignanx : 40 le 10/11, 250 le 22/11, 470 le 7/12 et 1110 le 13/12 (divers obs.). Les plus gros effectifs sont dénombrés cet hiver à Puydarrieux avec 3000 individus le 3/01 (JIG,

JPP), Saubusse avec 2400 oiseaux le 24/02 (FCa, PLe), Orx et Tercis-les-Bains (FCa). L'espèce atteint Lau-Balagnas et Ayros-Arbouix les 16 et 17/02, en période de vague de froid (PMi). Beaucoup d'oiseaux sont très affaiblis et observés le long des bas-côtés en février, donnant lieu à des collisions routières (divers obs.). Les départs pré-nuptiaux se concentrent vers la fin du mois de février-début mars : ainsi les effectifs à Saint-Martin-de-Seignanx passent de 230 le 29/02 à 80 le 5/03 (FCa) ; encore 2400 à Saubusse et 1035 à Tercis-les-Bains le 24/02 (FCa) mais presque plus aucun les 2 et 3/03 (FCa, JFe). Premiers mouvements postnuptiaux décelés à Rivières-Saas-et-Gourby dès le 8/06 (FCa), mais il faut attendre le 26/08 avec 30 oiseaux à Puydarrieux (DRa) pour qu'un premier groupe important soit signalé. Puis l'afflux est plus marqué avec notamment 210 à Orx le 30/09 (FCa) ou 340 à Montgaillard de 31/10 (CIC).

Petit Gravelot *Charadrius dubius* (d=110)

Des retardataires rencontrés les 1/11 sur le lac de l'Ayguelongue et 9/11 à Lescar (PhL). Retours à partir des 10/03 à Hontanx (CIC) et 11/03 à Messanges (GoL, STi). Au cours du passage pré-nuptial, jusqu'à 6 à Puydarrieux le 27/03 (VDu), 6 à Sabres le 23/05 et 5 à Ustaritz le 07/05 (GoL). Des cantonnements sont signalés à Momas (divers obs.), Cazères-sur-l'Adour (CIC), Aire-sur-l'Adour (PhL) et sur le Lac des Gaves (PMi, CHO), signalant une possible reproduction en fond de vallée. Un maximum de 14 individus dénombrés sur le lac de l'Ayguelongue le 27/07 (JIG). Lors du passage postnuptial, une moindre attirance pour les berges est constatée comme lors de cette observation en bord de piste de l'aéroport d'Uzein le 15/09 (PhL). Derniers le 25/09 à Orx (PhL).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* (d=161)

Jusqu'à 18 le 15/12 en baie de Txingudi (ANe) et 15 à Hossegor les 15/12 et 18/02 (GoL, STi, JFG). Le nombre d'individus reste fluctuant au cours de l'hivernage, indiquant des déplacements le long de la côte où des petits groupes sont perçus çà et là sur les plages comme à Anglet (GoL), Ciboure (FCa, STi) ou Ondres

(FCa). Début du mouvement pré-nuptial le 18/02 à Messanges (STi), puis les 2 et 4/03 à Saubusse (JFe, FCa). C'est en mai que les plus gros groupes sont notés : 15 franchissent le col d'Orgambidé à Estérençuby le 20/05 (LGo *et al.*), 47 sur la plage de Labenne le même jour (SHo) et 50 à Sabres le 23/05 (STi). Dernier groupe de 8 le 5/06 à Tarnos (FCa). Retours dès le 3/08 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) puis rapidement 45 à Orx le 12/08, 32 en baie de Txingudi le 13/08, 70 à Orx le 21/08 (FCa). Un gros afflux survient dans la dernière décade de septembre avec 150 individus le 21/09 à Orx (FCa) et jusqu'à 200 le 25/09 (PhL).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (d=24)

L'hivernage à l'embouchure du Courant d'Huchet demeure stable avec jusqu'à 22 individus notés le 4/01 (FCa, STi, SLe). Une preuve de reproduction au Huchet avec au moins une femelle au nid le 14/05 (PLe / RNNCH). Lors du passage postnuptial, 8 migrateurs sont vus le 24/09 à Capbreton (SDu, STi, FCa) et 3 à Tarnos le même jour (EDu). Un maximum de 31 oiseaux est noté au Huchet le 13/10 (CIC).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus (d=2)**

Cinq observations en migration postnuptiale : 3 individus le 6/09 à Messanges (STi) où l'espèce est revue à l'unité les 8 et 9/09 (STi, GoL), et 3 à Lecumberry (Occabé, 1300 m) le 8/09 (J.B. Etchebarne & A. Lurde / ONCFS, *fide* SDu).

SCOLOPACIDAE

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* (d=36)

Lors de l'hivernage, uniquement observé à Plaiaundi avec 4 individus le 3/01 (STi). Les 3 premiers migrateurs du printemps apparaissent le 15/04 à Abos, loin du littoral (STi, PhL), 1 à Anglet le même jour (FCa), puis 45 en vol le 19/04 au Courant d'Huchet (PLe) ; les 2 derniers sont notés à Tarnos le 23/05 (SDu). Retours postnuptiaux dès le 17/07 à Plaiaundi avec 3 ind. (JFe) puis 16 sur ce même site le 3/08 (AHG), la migration se prolongeant au cours d'août et septembre ; le dernier est noté en vol filant vers le sud le 16/10 à Tarnos (EDu).

Courlis cendré *Numenius arquata* (d=185)

L'essentiel de l'hivernage est concentré dans le secteur du bas-Adour, entre Pontonx-sur-l'Adour, 120 le 8/12 (JFe) et le marais d'Orx, 354 le 16/01 (FCa & RNN Orx) ; également 400 à Saubusse le 23/02 (JFe). Seul site collinaire intérieur, Puydarrieux accueille des effectifs conséquents : 104 le 27/02 (VDu). Hormis le site de la lande de Ger où 11-13 individus sont dénombrés, dont 2 couples accompagnés de poussins le 27/05 (coll. GOPA), la reproduction est suspectée à Rion-des-Landes le 22/04 (PUT), à Garrosse le 8/05 (STi, PUT) ainsi qu'à Uzein où un chanteur se pose sur la piste de l'aéroport le 15/04 (SDu). Retours de 21 migrants postnuptiaux précoces le 10/06 à Puydarrieux (VDu) puis 4 le 13/08 à Plaiaundi (FCa) et 3 aux abords du lac de l'Arrêt-darré le 20/08 (FBa).

Barge à queue noire *Limosa limosa* (d=34)

Encore 7 migratrices à Puydarrieux le 6/11 (VDu) ; au cours de l'hiver, l'espèce est observée dans la baie de Txingudi (JFe, ANe) et au marais d'Orx (FCa, SLe) avec respectivement 6 et 5 oiseaux ; également 2 à Saint-Martin-de-Seignanx le 10/01 (SDu, JIG). La migration pré-nuptiale est sensible à partir du 19/02 à Rivière-Saas-et-Gourby avec 7 ind. (STi), s'étirant jusqu'au 23/05 à Sabres (STi) ; max. de 15 à Saint-Martin-de-Seignanx le 14/03 (FCa). Retours postnuptiaux dès le 13/06 à Orx avec un groupe de 37 (FCa), le pic du passage intervenant au cours du mois de septembre, et encore 92 à Orx le 5/10 (FCa).

Barge rousse *Limosa lapponica* (d=42)

En hiver, présente uniquement à Plaiaundi avec 4 le 3/01 (STi). Le passage pré-nuptial débute le 12/02 à Soustons (STi), puis 20 à Plaiaundi le 14/03 (JFe), les dernières du printemps se montrent à Tarnos le 23/05 (SDu) et à Hossegor le 24/05 (JFe). Les premiers oiseaux postnuptiaux apparaissent le 24/08 à Orx (PhL), le maximum automnal de 12 étant noté sur ce site le 21/09 (FCa).

Tournepierre à collier *Arenaria interpres* (d=226)

Espèce littorale et familière, observée en troupes hivernales sur des sites anthropisés, notamment 112 au Fort de Socoa le 21/01 (FCa, STi), 75 sur le parking de la digue de Tarnos le 5/02, 35 à Saint-Jean-de-Luz le 7/01 (FCa), 33 à Anglet le 2/01 (GoL). La présence printanière est notée jusqu'au 23/05 à Tarnos (SDu), les données de juin sur ce site correspondant à des retours précoces ou au stationnement d'oiseaux non nicheurs. Retours postnuptiaux à des dates classiques à partir du 6/08 à Anglet (GoL) ; rare donnée à l'intérieur des terres de 2 ind. le 23/09 à Puydarrieux (VDu).

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* (d=20)
Seulement deux observations durant l'hiver : 2 oiseaux à Vieux-Boucau le 26/11 et un à Tarnos le 5/02 (FCa). Au printemps, 3 à Hossegor le 24/05 (JFe). Retour postnuptial à partir du 15/08 à Orx avec 5 individus (FCa), un rassemblement de 25 oiseaux étant observé le 25/09 sur ce site (PhL).

Combattant varié *Calidris pugnax* (d=156)
En période hivernale, l'espèce est contactée régulièrement en petits effectifs à Saint-Martin-de-Seignanx, Orx, Saint-Etienne-d'Orthe (FCa *et al.*), Rivière-Saas-et-Gourby, Saubusse (STi, FCa, JFe) et Puydarrieux (VDu, DRa *et al.*). Maximum de 14 à Rivière-Saas-et-Gourby le 19/02 (STi). Le dernier migrateur pré-nuptial est signalé le 23/05 à Sabres (STi). Retour postnuptial précoce le 14/07 à Momas (PhL) ; un groupe de 36 oiseaux le 25/09 à Orx (PhL).

Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata***

Bécasseau falcinelle *Calidris falcinellus***

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* (d=33)
Deux données en période pré-nuptiale : un oiseau le 5/05 à Anglet (FCa) et 5 le 23/05 à Sabres (STi). Retour à partir du 23/07 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL). Effectif maximum de 20 oiseaux à Orx le 10/09 et dernier le 5/10 sur ce site (FCa).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* (d=28)

Deux observations pré-nuptiales sur la côte landaise : 2 le 22/05 au Huchet (PLe / RNNCH) et 1 le 23/05 à Sabres (STi). En migration post-nuptiale, le nombre d'observations est supérieur à la normale, avec des séjours prolongés : 1 puis jusqu'à 3 sur le lac de l'Ayguelongue du 25/07 au 23/09 (PhL, ANa, JIG) au moins 8 individus différents ayant stationné sur ce site (PhL), 1 à Puydarrieux du 27 au 31/07 (VDu), 1 à Orx du 14 au 23/08 puis du 25 au 30/09 (FCa, JIG), 1 au Huchet le 5/09 (PLe / RNNCH).

Bécasseau sanderling *Calidris alba* (d=73)
Espèce présente jusqu'à fin mai avec un effectif maximum de 48 oiseaux au Huchet le 24/12 (STi). Retour à partir du 25/08 avec 13 oiseaux à Capbreton (STi). À noter une observation à l'intérieur des terres le 15/04 à Denguin (STi, PhL).

Bécasseau variable *Calidris alpina* (d=222)
Hivernage régulier sur la côte atlantique en petit nombre : maximum de 200 à Plaiaundi le 3/01 (STi). À l'intérieur des terres, l'hivernage n'est rapporté que de Puydarrieux, avec un maximum de 12 individus (VDu, DRa). Les premiers mouvements pré-nuptiaux ont lieu dès le 24/02 avec 190 individus à Saubusse (FCa) ; derniers le 24/05 à Hossegor et 5/06 à Tarnos (FCa). Premiers retours postnuptiaux le 27/07 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG) et 2/08 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), pour un maximum de 300 oiseaux à Orx le 25/09 (PhL).

Bécasseau violet *Calidris maritima* (d=44)
En hivernage, uniquement sur la côte atlantique avec des maxima de 15 le 6/11 à Capbreton (coll. GOPA) et de 20 le 18/12 à Tarnos (K. Schmale, P.A. Crochet, F. Veyrunes) ; derniers hivernants le 30/04 à Tarnos (FCa, SLe). Retour postnuptial le 21/09 à Capbreton (FCa, STi).

Bécasseau de Baird *Calidris bairdii***

Bécasseau minute *Calidris minuta* (d=41)
Aucune donnée d'hivernage pour l'hiver 2011-12. Premiers retours le 25/07 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG, PhL) pour un maximum de 40 individus le 25/09 à Orx (PhL) ; dernier le 9/10 sur ce même site (JFe).

Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis***

Un individu est observé sur le lac de l'Ayguelongue le 24/07, sous réserve d'homologation par le CHN (A. Guyot *in* <http://www.surfbirds.com>), non revu les jours suivants (PhL). S'agit-il du même individu qui a séjourné du 13 au 21/09/2011 sur ce même site ?

Bécasseau rousset *Calidris subruficollis***

Un individu observé à Organbidexka le 13/09/2011a été homologué par le CHN (www.chn-france.org), ce qui constitue la seconde donnée pour le Bassin de l'Adour après celui ayant stationné au lac de l'Ayguelongue en septembre-octobre 2010.

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos (d=5)**

Espèce d'occurrence annuelle depuis 2007 avec un individu à Orx du 15 au 17/08 (FCa, STi), un second (ou le même !) le 5/09 sur ce même site (FCa) et 1 à Saint-Gein le 23/09 (CIC). Tous ces individus étaient dans leur première année.

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus****Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* (d=6)**

Observé entre le 15 et le 20/12 à Capbreton (FCa, SDu, SHo) et au Huchet (PLe / RNNCH), le 6/01 sur le lac de Mouriscot à Biarritz (FCa), puis de nouveau les 24/09 et 14/10 à Capbreton (STi). Aucun afflux n'est observé, les quelques mentions ne concernant que 1 à 3 individus.

Chevalier bargette *Xenus cinereus*****Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (d=359)**

Mentions hivernales sur de nombreux plans d'eau, rivières et sites côtiers (divers obs.). Au passage prénuptial, notamment 9 à Denguin le 26/04 (JIG), 12 à Pey le 27/04 (FCa), 12 à Ustaritz le 29/04 et 8 le 13/05 (GoL). Des indices de reproduction possible sont obtenus à Laruns sur deux sites d'altitude (FDA, SDu), ainsi qu'à Meillon et sur le Saison entre Tardets-Sorholus et Mauléon-Licharre (SDu). La migration postnuptiale débute le 9/07 à Bostens (CIC) et sur le lac du Gabas (JIG), avec un effectif

remarquable de 55 individus en halte sur la digue de Tarnos le 13/08 (FCa). Un groupe de 8 migrateurs est posé à l'aube du 9/08 sur la route au pont de Lescun (SDu).

Chevalier grivelé *Actitis macularia* (d=1)**

Un individu est signalé le 3/12 à Hendaye (ANe), sous réserve d'homologation par le CHN.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* (d=269)

Des mentions hivernales (décembre-janvier) à Orx (FCa), Saint-Gein, Hontanx, Benquet, Cazères-sur-l'Adour (CIC), Labatut-40, Lahontan (PLe, FCa), Morlanne (STi), Bours (DRa, SPé) et Miélan (JmF). Au passage prénuptial, jusqu'à 25 le 23/02 à Saubusse (JFe) et les 12 derniers le 13/05 à Ustaritz (GoL). Retours dès les 13/06 au Huchet (PLe / RNNCH) et 14/06 à Solférino (STi) et Ustaritz (GoL), le passage s'étalant jusqu'à fin octobre. Maxima de 19 le 6/08 à Saint-Martin-de-Seignanx, 23 le 21/08 à Orx (FCa) et surtout 64 le 18/09 à Plaiaundi (AHG).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (d=64)

Des attardés les 1/11 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL) et 6/11 à Puydarrieux (VDu), puis au maximum 25 hivernants à Orx le 3/01 (FCa, SLe). Les 22 mentions prénuptiales s'étalent du 17/02 à Saubusse (FCa) au 23/05 à Sabres (STi), les observations de février pouvant éventuellement concerner des individus hivernants. Le passage postnuptial débute les 19/07 à Puydarrieux (VDu) et 4/08 à Orx, avec au maximum 40 individus le 25/09 sur ce site (PhL), lequel regroupe l'essentiel des 33 données.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (d=147)

En hivernage (décembre-janvier), l'espèce est présente à Orx, Plaiaundi avec un maximum de 26 individus le 3/01 (STi), Hossegor, Cazères-sur-l'Adour et Saint-Gein (divers obs.). Derniers migrateurs prénuptiaux les 27/05 à Sabres (CIC) et 30/05 à Pey (JIG, ANe). Premiers retours postnuptiaux les 17/07 à Plaiaundi (JFe) et 28/07 à Sère-Rustaing (FBa), pour un maximum de 30 individus le 25/09 au marais d'Orx (PhL).

Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes***

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis** (d=3)
Deux observations pour cette espèce d'occurrence rare : un adulte les 2 et 3/08 à Orx (FCa) et un juvénile le 3/09 au Huchet (PLe / RNNCH).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* (d=96)
Aucune donnée d'hivernage pour l'espèce. Migration printanière à partir du 29/02 à Puydarrieux (DRa), derniers les 23/05 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 27/05 à Sabres (CIC). Retours postnuptiaux les 7/07 au lac de Soum (Arbéost, 1500 m) (SDu) et 9/07 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL). Maximum de 35 individus le 16/08 à Orx (FCa, STi) et dernier le 25/09 sur ce même site (PhL).

Chevalier gambette *Tringa totanus* (d=138)
Après un groupe de 24 attardés le 6/11 à Puydarrieux (VDu), l'hivernage n'est constaté qu'en baie de Txingudi (divers obs.), avec jusqu'à 25 individus le 3/01 à Plaiaundi (STi). Le passage pré-nuptial débute dès les 23/02 à Saubusse (JFe)



L'hivernage du **Chevalier aboyeur** est régulier dans notre région, même à l'intérieur des terres, mais concerne de petits effectifs (photo F. CAZABAN).

et 29/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), pour se terminer le 3/06 à Guéthary (FCa) ; à noter un effectif remarquable de 50 le 24/05 à Hossegor (JFe). La migration postnuptiale reprend dès les 14/06 à Tercis-les-Bains (FCa) et 17/07 à Plaiaundi (JFe) et se poursuit jusqu'en octobre, avec jusqu'à 100 individus le 25/09 à Orx (PhL) et 30 le 17/10 à Plaiaundi (JFe).

Bécassine sourde *Lymnocyptes minutus* (d=4)
Observée en trois sites : 2 oiseaux à Messanges le 13/11 (STi), 1 à Benquet le 12/02 (CIC), 1 à Momas le 7/04 (PhL) et 1 à Messanges le 26/10 (STi).

Bécassin sp. *Limnodromus* sp.**

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (d=38)
Des oiseaux hivernants sont notés sur un total de 21 communes (divers obs.). Cette année encore, des oiseaux en croûle sont entendus en avril et mai sur les communes de Léés-Athas (1470 m), Osse-en-Aspe (1550 m) (SDu) et Accous (1660 m) (coll. GOPA). Retour des hivernants les 26/10 à Moumour (SHo), 28/10 à Messanges (FCa, PhL, STi) et 29/10 à Gurs (SDu).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (d=290)

En hiver, jusqu'à 60 à Plaiaundi le 9/12 (JFe), 41 à Orx le 16/01 (FCa & RNN Orx), 40 à Rivière-Saas-et-Gourby le 12/02 (STi) et 34 à Saint-Martin-de-Seignanx le 29/02 (FCa). L'espèce est observée à 800 m d'altitude à Bilhères-en-Ossau les 5 et 7/03 (15 ind. ce dernier jour, SDu). Derniers contacts les 27/04 à Messanges (STi) et 13/05 à Arthez-d'Armagnac (CIC). Retour postnuptial les 23/07 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL), 27/07 à Puydarrieux (VDu) et 2/08 sur le lac du Gabas (ANa). 45 à Orx le 17/08 (FCa) et au-moins 70 le 31/10 sur ce même site (JFe).

Bécassine double *Gallinago media***

GLAREOLIDAE

Glaréole à collier *Glareola pratincola*

Courvite isabelle *Cursorius cursor*

L'individu observé le 23/09/2011 sur le col de Lindux (commune de Banca) a été homologué par le CHN français (www.chn-france.org). Il s'agit de la première donnée pour notre territoire. A noter qu'un individu (le même ?) a été noté près de Trujillo (province de Cacères) la veille.

STERCORARIIDAE

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* (d=29)

L'espèce est contactée du 15/10 avec un adulte en vol à Fontarrabie (AHG) au 21/12 à Anglet (GoL), avec 8 oiseaux à Capbreton le 15/12 et autant 16/12 (SDu, FCa). Retour à partir du 24/09 avec un effectif remarquable de 35 oiseaux à Capbreton (STi, FCa, SDu), suite à un coup de vent.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* (d=27)
Des observations régulières du 5/11 à Capbreton (FCa, STi) au 7/02 à Hossegor avec 3 oiseaux (ANe). Une donnée tardive le 21/05 à Capbreton (FCa). Retour postnuptial à partir du 25/08 sur le même site (PhL, GoL, STi) avec des effectifs de 6 oiseaux le 24/09 à Biarritz (EDu) et de 4 le 14/10 à Capbreton (STi). Un individu est signalé le 13/10 au col de Lindux (www.migraction.net). Un labbe indéterminé (parasite ou à longue queue) migre dans un vol de bondrées le 22/08 à Bénéjacq (JIG).

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus** (d=1)

Un oiseau vu à Vieux-Boucau-les-Bains le 25/09 (STi) semble correspondre à cette espèce ; 2 individus sont signalés le 21/08 au col de Lindux et un autre est photographié le 23/08 au col d'Organbidexka (www.migraction.net).

Grand Labbe *Stercorarius skua* (d=68)

Des effectifs importants sont vus à Capbreton : 12 oiseaux le 6/11 (coll GOPA), 22 le 3/12, 52 le 15/12, 61 le 16/12 et encore 20 le 5/01 (FCa, STi, SDu, PhL). Dernière observation le 30/04 à Tarnos (FCa). Le retour s'effectue à partir du 13/09 à Capbreton (FCa), avec déjà 19 oiseaux le 25/09 (PhL) et 15 le 13/10 lors d'une sortie en mer dans le Golfe de Gascogne (divers obs).

ALCIDAE

Macareux moine *Fratercula arctica* (d=3)

Donnée exceptionnelle d'une troupe de 30 individus lors d'un coup de vent atlantique le 17/12 à Capbreton (K. Schmale, P.A. Crochet, P. Veyrunes), puis 2 le 5/01 sur le même site (FCa, PhL, STi) et un cadavre découvert le 9/01 sur la plage d'Anglet (GoL).

Pingouin torda *Alca torda* (d=64)

Le passage d'automne s'étale jusqu'à la mi-décembre, avec 250 à Vieux-Boucau-les-Bains le 11/11 (STi), 117 en 2 heures à Capbreton le 16/11 (SPé, FBa) et 141 sur ce site le 4/12 (STi, FCa). En hiver, l'espèce n'apparaît qu'en faibles effectifs malgré ces 34 le 6/01 à Capbreton (PhL, STi) ; des cadavres sont en outre découverts dans les « laisses » de mer. Deux données printanières les 19/04 à Capbreton (SDu) et 21/04 à Hossegor (STi). La migration postnuptiale est ensuite détectée à partir du 9/09 à Capbreton (VRe, SPé, FBa).

Mergule nain *Alle alle** (d=2)

Une observation peu commune de 4 mergules en migration à Capbreton le 16/12 (FCa), et découverte d'un cadavre à l'embouchure du Courant d'Huchet le 29/03 (PLé / RNNCH).

Guillemot de Troïl *Uria aalge* (d=38)

Les plus gros effectifs de migrateurs sont notés en novembre et décembre : notamment 180 le 11/11 à Vieux-Boucau-les-Bains (STi) et 9 le 3/12 à Capbreton (SDu, FCa, STi). La plupart des observations hivernales concernent des cadavres sur les plages ou des oiseaux stationnant affaiblis près du rivage (FCa, STi, GoL, PhL) ; 7 individus sont observés à Biarritz le 3/02 (EDu). Une observation printanière d'un individu le 21/05 à Anglet (FCa).

STERNIDAE

Sterne bridée *Onychoprion anaethetus***

Sterne naine *Sternula albifrons* (d=11)

En période pré-nuptiale, observée les 28/04 au lac des Gaves (PMi) et 29/04 à Cazères-sur-l'Adour (coll GOPA). Lors du passage postnup-

tial, 1 le 19/08 à Puydarrieux (VDu), puis notée sur le littoral du 4/09 à Tarnos (SDu, GoL) au 26/09 au Huchet (JFe).

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* (d=11)

Une observation très tardive de 2 oiseaux le 2/11 à Plaiaundi (JFe), puis des mentions sur le lac de l'Ayguelongue les 29/04 (ANa), 18/05 (PhL, JIG) et 2/07 (PhL), 1 à Puydarrieux le 10/06 (VDu) et enfin 1 le 26/07 et 2 le 22/08 sur le lac du Gabas, dont un juvénile qui quémande (JIG, EDu, FBa).

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* (d=2)

Trois à Chingoudy le 10/09 (BGo) et 2 oiseaux en vol le 24/09 à Capbreton (STi) uniques données pour cette rare espèce.

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* (d=29)

En période prénuptiale, la migration débute le 27/03 avec 2 oiseaux à Saint-Martin-de-Seignanx (coll. GOPA). Des rassemblements remarquables sont notés à l'intérieur des terres : 12 oiseaux sur le lac de l'Ayguelongue le 29/04 (ANa) et 18 à Puydarrieux le 11/05 (VDu). Début de la migration postnuptiale le 8/08 sur le lac de l'Ayguelongue avec 2 oiseaux (ANa) ; dernière observation le 16/08 à Orx (FCA, STi).

Guifette noire *Chlidonias niger* (d=62)

Un migrateur tardif le 6/11 à Capbreton (coll. GOPA). La migration prénuptiale débute le 9/04 avec 50 oiseaux à Puydarrieux (VDu). Quelques autres observations à l'intérieur des terres : un oiseau sur le lac de l'Ayguelongue le 12/04 (JIG), 7 sur le lac des Gaves le 28/04 (PMi), 1 à Bours le 1/05 (SPe) et 4 oiseaux sur le lac du Gabas le 30/08 (JIG). Des effectifs importants sont vus : 30 oiseaux le 24/09 à Orx (JmF, FCa), 38 à Capbreton le 25/09 (PhL).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus**

Sterne élégante *Sterna elegans* (d=1)**

Unique observation pour cette espèce : un oiseau photographié à l'embouchure du Courant d'Huchet le 26/09 (JFe), sous réserve d'homologation par le CHN.

Sterne caugek *Sterna sandvicensis* (d=121)



Sterne hansel observée sur le Gabas le 22/08 : les données à l'intérieur des terres sont exceptionnelles (photo E. DUMAIN).

Présence régulière de l'espèce durant tout l'hiver, des effectifs importants étant notés : 15 oiseaux à Tarnos les 19/12 et 4/01 (FCa), 25 à Anglet le 21/12 (GoL). Passage prénuptial en avril avec 34 oiseaux le 9/04 et 22 le 23/05 à Tarnos (SDu). Le secteur du Courant d'Huchet reste très utilisé au printemps, avec jusqu'à 120 individus dénombrés dont certains paradant avec offrandes de proies (PLe / RNNCH). Retour de la migration postnuptiale à partir du 23/07 à Anglet avec 2 oiseaux (FCa). À Capbreton durant cette période des groupes importants seront vus : 30 le 25/08 (GoL, STi, PhL), 20 les 24/09 (STi) et 27/09 (FCa), encore 16 le 14/10 (STi). Pas d'observation à l'intérieur des terres pour cette année.

Sterne pierregarrin *Sterna hirundo* (d=33)

L'espèce est présente en petit nombre jusqu'au 23/12 au Huchet (STi). Migration prénuptiale à partir du 4/04 à Puydarrieux (VDu), avec 10 oiseaux le 21/05 à Capbreton (FCa). Un adulte est vu à Saint-Laurent-de-Gosse le 2/07 (FCa), puis la migration postnuptiale débute le 3/08 sur le lac de l'Ayguelongue (SDu, ANa, DLa). Des effectifs assez importants sont notés à Capbreton : 8 oiseaux le 24/09 (STi), 14 le 25/09 (STi, PhL) et 35 le 27/09 (FCa). Derniers le 16/10 au Huchet (JFe).

Sterne de Dougall *Sterna dougallii (d=1)**

Un oiseau en vol pouvant correspondre à cette espèce est observé le 24/09 à Capbreton (FCa, STi).

Sterne arctique *Sterna paradisea* (d=5)

Une observation printanière : un oiseau le 21/05 à Capbreton (FCa). Retour de la migration avec 2 oiseaux le 24/09 à Soustons (SDu) et 4 le 14/10 à Capbreton (STi).

LARIDAE

Mouette de Sabine *Xema sabini* (d=10)

L'espèce est vue en petit nombre au cours de l'hiver 2011 : un oiseau les 2/11 et 24/11 à Plaiaundi (JFe), 2 le 5/11 à Capbreton (FCa, STi) et 1 le lendemain (coll. GOPA) ; dernière observation le 4/12 à Capbreton (STi, FCa).

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* (d=57)

L'espèce est présente durant l'hiver jusqu'au 16/01 à Capbreton (JmF, FBa, SPé). Des effectifs importants sont notés à Capbreton les 6/11 avec 410 oiseaux (coll. GOPA) et 16/12 avec 171 individus (FCa). Retour à partir du 30/08 à Fontarrabie (AHG).

Goéland railleur *Chroicocephalus genei**

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* (d=688)

En période hivernale, des effectifs importants sont notés : 255 oiseaux dans les barthes de Tercis-les-Bains le 19/12 (FCa), 800 le 23/12 en baie de Saint-Jean-de-Luz (FCa), 208 le 15/01 au lac Marion à Biarritz (GoL). Retour sur les sites de nidification à partir du 3/03 à Artix (PhL) et du 18/03 sur le lac de l'Ayguelongue avec 19 oiseaux (PhL, ANa). Sur ce dernier site, 5 nids et des accouplements sont observés le 19/05 (JIG) et 8 adultes accompagnés de 4 poussins non volants sont vus le 9/07 (PhL), confirmant la réussite de la reproduction. Par contre, nouvel échec pour l'espèce à Artix (SDu).

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* (d=82)

Présence régulière durant la période hivernale avec des effectifs importants de 45 oiseaux le 5/11, 92 le 3/12 et 115 le 15/12 à Capbreton

(FCa, SDu, STi), jusqu'au 5/02 à Biarritz avec 40 individus (FCa). Le retour s'effectue à partir du 24/09 à Capbreton (coll. GOPA). À l'intérieur des terres, 2 à Puydarrieux le 22/11 (VDu), et surtout à une date inhabituelle un oiseau le 13/05 sur le même site (VDu).

Mouette atricille *Larus atricilla* (d=3)**

Un oiseau de 2^{ème} été est vu le 25/08 à Capbreton (PhL, GoL, STi), première donnée homologuée par le CHN dans le bassin de l'Adour.

Mouette de Franklin *Larus pipixcan***

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* (d=282)

Des groupes importants sont notés durant l'hiver pour cette espèce : 126 oiseaux le 3/12 et 200 le 3/01 à Hossegor (STi, SDu, GoL), 200 le 17/12 à Biarritz (EDu) ou 203 le 23/12 à Saint-Jean-de-Luz (FCa). Dernière observation le 23/05 avec 4 immatures à Tarnos (SDu). Un retour précoce le 24/07 à Anglet (FCa). Quelques observations à l'intérieur des terres : les 1/04 à Antin (FBa), 3/04 à Puydarrieux (VDu), 14/04 sur le lac de l'Ayguelongue avec 9 individus (STi, PhL), 26/04 à Artix (JIG), ainsi que 1 puis 2 oiseaux les 3 et 7/08 sur le lac de l'Ayguelongue durant la période postnuptiale (SDu, DLa, ANa).

Goéland d'Audouin *Larus audouini (d=7)**

Comme l'an passé, l'espèce est vue à plusieurs reprises entre le 16/04 et le 14/06 sur le secteur de Bayonne-Tarnos, avec 4 individus différenciés dont un bague au nid en 2007 dans le delta de l'Ebre (FCa).

Goéland cendré *Larus canus* (d=34)

L'espèce est présente du 3/12 au 7/03, souvent en petits groupes : 9 oiseaux à Saint-Etienne-d'Orthe le 7/02 après un coup de vent (FCa), 15 le 12/02 et 12 le 19/02 à Rivière-Saas-et-Gourby (STi). À l'intérieur des terres, 3 oiseaux le 14/01 au lac d'Orthez (SDu, JBo) et un sur le lac de l'Ayguelongue le 1/08 à une date inhabituelle (PhL).

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis**



La présence du **Goéland brun** hors littoral n'est régulière que dans le quart nord-ouest du pays ; dans notre région, le reposoir du Courant d'Huchet a atteint 2000 individus en décembre alors qu'aucune mention n'a été rapportée de l'intérieur des terres cet hiver (photo S. TILLO).

Goéland brun *Larus fuscus* (d=343)

Durant l'hiver des effectifs parfois très importants sont vus : 1260 oiseaux à Capbreton le 16/12 (FCa), 2000 au Huchet le 11/12 (STi). Sur ce même site, le nombre d'oiseaux va décroître rapidement au cours de l'hiver pour atteindre 350 le 7/01 et 169 le 8/01 (STi). Des attardés sont notés jusqu'au 27/06 à Bayonne (FCa). Retour à partir du 6/08 à Anglet (GoL, STi). Le 20/09, 5 oiseaux à Ciboure dont deux porteurs des bagues : un bagué poussin en 2009 en Allemagne et l'autre bagué en 2011 sur l'île de Breghou dans la Manche (GoL). À l'intérieur des terres, 1 à Puydarrieux le 4/04 (VDu) et 3 le 26/08 (DRa), puis 1 à Sère-Rustaing le 28/10 (FBa).

Goéland argenté *Larus argentatus* (d=95)

La présence de l'espèce sur le littoral est notée jusqu'au 20/02 à Anglet (GoL) avec un maxi-

mum de 20 oiseaux le 20/11 à Hossegor (ANa). 4 oiseaux sont vus tardivement sur le même site le 24/05 (JFe). Le retour postnuptial s'effectue dès les 5/07 à Saint-Pée-sur-Nivelle (AHG) et 14/08 à Vieux-Boucau (STi). Une quinzaine d'oiseaux le 13/10 au large d'Hendaye lors d'une sortie en mer (GoL, STi).

Goéland leucophée *Larus michahellis* d=592)

Jusqu'à 1500 oiseaux au Huchet le 11/12 (STi), 1120 en baie de Txingudi le 7/01 (FCa), 2000 à Saint-Pée-sur-Nivelle le 21/01 (STi, FCa). Des preuves de nidifications sont notées à Hendaye (CIC), au Huchet (PLe), à Orx le 8/06 (JIG, SPé), Biarritz et Anglet (FCa). Quelques observations à l'intérieur des terres : 14 à Bénéjacq le 26/11 (JIG), 60 à Puydarrieux le 3/01 (JIG, JpP), 8 à Préchacq-Navarrenx le 1/07 (SDu, JBo), l'espèce étant notée aussi sur les lacs du Gabas, d'Artix, d'Orthez et de l'Ayguelongue. Obser-

vations d'oiseaux porteurs de bagues : 2 le 25/08 à Capbreton, l'un bagué poussin à San Sebastian et l'autre à Majorque, individu déjà contrôlé en novembre 2008 à Hossegor (GoL). Le 18/09 à Anglet, un juvénile bagué poussin dans le Delta de l'Èbre (GoL).

Goéland pontique *Larus cachinnans** (d=17)
Quelques individus de cette espèce sont présents du 26/11 au 21/01 au Huchet, à Hossegor, Ciboure (3 le 15/01 dont un bagué en Pologne, FCa) et en baie de Txingudi (divers obs.).

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides** (d=14)

Plusieurs contacts avec ce rare hivernant entre le 17/12 à Capbreton (K. Schmale, P. A Cochet, F. Veyrunes) et le 1/03 à Hendaye (AHG). Au moins un adulte et deux immatures sont présents durant l'hiver.

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus**

Goéland marin *Larus marinus* (d=239)
Avec des effectifs toujours réduits, les maximums étant de 15 oiseaux à Hossegor le 18/11 et en baie de Txingudi le 15/01 (FCa), l'espèce est notée très tardivement avec des oiseaux présents encore à la fin du mois de juin. Le retour postnuptial démarre le 24/07 à Tarnos (FCa). À

noter le 22/10 à Anglet, un immature bagué le 11/07/2012 en Charente-Maritime (GoL).

COLUMBIDAE

Pigeon biset domestique *Columba livia* (d=92)
Un couple suivi à Ustaritz élève successivement au moins 3 nichées (GoL). Rassemblements de 200 individus les 15/01 au phare de Biarritz et 22/10 à Boucau (GoL).

Pigeon colombin *Columba oenas* (d=52)
Derniers migrateurs postnuptiaux les 12 et 13/11 à Messanges (STi). Quelques mentions hivernales à Hontanx (CIC), Messanges, Saint-Martin-d'Oney (STi), Saint-Justin (JmF) et Bas-sillon-Vauzé (SDu, JpP). Aucune mention au passage pré-nuptial ! Premier migrateur postnuptial très précoce le 6/08 à Ferrières (EDu), puis les 6/09 à Gerde (SPé) et 16/09 à Messanges (STi) ; le passage semble ensuite assez fourni.

Pigeon ramier *Columba palumbus* (d=652)
Derniers mouvements migratoires le 14/11 à Pau (PhL). Le passage pré-nuptial est observé du 26/02 à Denguin (STi) au 20/03 à Meillon (JIG). Peu de données de reproduction. Un individu est signalé en migration dès le 14/08 à Laruns (FDA), date très précoce, puis le passage post-nuptial débute le 30/09 à Gerde (SPé). Il est à son apogée du 18 au 24/10, puis du 28 au 30/10



Un **Pigeon ramier** leucique ou albinos migre avec ses congénères : le taux de survie de ces individus au plumage aberrant est généralement plus faible que celui de la population (photo A. PAGOAGA).

(divers obs.) ; les effectifs les plus importants signalés sont de 20883 individus le 23/10 à Jatxou (GoL) et 40000 le 24/10 à Messanges (STi).

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* (d=436)

Un individu leucique est observé le 23/11 à Montaner (FBa) et un probable albinos le 4/12 à Ibos (ANa). Rassemblements inhabituels de 130 individus à Saint-Martin-de-Seignanx le 25/11, 120 à Tercis-les Bains et 80 à Saint-Vincent-de-Tyrosse le 20/09 (FCa) ou 81 à Boeil-Bezing le 10/10 (JIG). Un œuf cassé est découvert le 4/12 à Bagnères-de-Bigorre (ALe), un jeune prend son envol le 29/02 à Bénéjacq (JIG) et des poussins sont encore au nid le 9/07 sur ce site (JIG). Observation remarquable d'un individu en halte le 15/05 au col du Pourtalet, 1800 m (JIG).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (d=254)

Premiers retours les 14/04 à Momas (PhL, STi), 25/04 à Hendaye (CIC), 28/04 à Messanges (STi) et Puydarrieux (VDu). Un jeune récemment envolé le 15/07 à Sainte-Colombe (STi). Rassemblement postnuptial de 12 individus sur des fils électriques le 13/09 à Moulédous (FBa) ; dernières les 12/10 à Puydarrieux (VDu) et 13/10 à Vielle-Saint-Girons (CIC).

PSITTACIDAE

Perruche à collier *Psittacula krameri*

CUCULIDAE

Coucou geai *Clamator glandarius* (d=3)

Un individu de 2^{ème} année est présent en bordure du lac du Gabas du 27 au 30/08 au moins (EDu, JIG), ainsi qu'un juvénile à Guiche le 28/08 (L. Delfaut, www.faune-aquitaine.org).

Coucou gris *Cuculus canorus* (d=199)

Premiers individus printaniers à des dates classiques : 13/03 à Bascons (CIC), 15/03 à Escalans (P. Moreau) et 16/03 à Heugas (FCa). En période de nidification, 1 individu poursuivi par Pie-grièche écorcheur et Monticole de roche le

3/07 à Osse-en-Aspe (MGU) ; le 16 mai à Rion-des-Landes, « *une femelle adulte cherche à parasiter le nid d'un Rossignol philomèle qui ne se laisse pas faire. Se pose régulièrement, mais se fait harceler par le rossignol qui la poursuit. Le coucou s'éloigne avec son assaillant pour revenir rapidement « en douce », mais il est repéré à chaque fois* » (STi). Premiers migrateurs postnuptiaux les 21/07 et 12/08 à Ger (JIG), derniers les 12/09 à Benquet (CIC), 14/09 à Montaner (FBa) et 21/09 à Orx (FCa).

TYTONIDAE

Effraie des clochers *Tyto alba* (d=120)

95 communes avec présence de l'espèce sont citées cette année sur l'ensemble de la couverture géographique du GOPA. Les données les plus en altitude concernent un individu vu à 1100 m le 7/10 à Lanne-en-Barétous (SDu) et des indices à 613m le 12/03 à Urepel (GoL). 10 % des contacts concernent des individus morts sur le bord de la route, 9 cadavres sur 12 étant retrouvés en période hivernale de pénurie alimentaire, les 3 autres l'ont été en août, peut-être des jeunes.

STRIGIDAE

Petit-duc scops *Otus scops* (d=5)

Le site de reproduction connu à Luz-saint-Sauveur fournit des données intéressantes : cantonnement du mâle à partir du 20/04, le couple est noté le 24/05 et le dernier contact sur le site survient le 8/08 (CHo). Remarqué aussi ponctuellement à Ondres le 1/06 (JFG) et probablement au cours du passage postnuptial à Messanges le 23/09 (STi).

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* (d=8)

Un couple est présent en basse vallée d'Aure et 2 autres près d'Argelès-Gazost, un accouplement étant observé le 22/01 (DRa, CHo). Une mention sur la commune de Laruns à 1900 m, d'un individu poursuivi par 2 craves le 2/06 (JIG). Enfin, une exceptionnelle observation d'un oiseau en plaine à Lasséran (10 km au sud-ouest d'Auch) le 6/10 (DRa).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* (d=15)

Deux nouvelles communes accueillent l'espèce dans les Hautes-Pyrénées : Fréchou-Fréchet le 8/01(DRa) et Sauveterre le 28/01 (SDu, LCa). Contactée par ailleurs à Louit les 9/11 et 9/07 (FBa) et à Lanne où le suivi régulier permet d'identifier au moins trois mâles chanteurs dont l'un est apparié (DRa, FBa, JmF). Un oiseau est observé sur le noyau ouest landais à Orist le 17/02 (PLe) ; autre contact à Larressore le 18/02 (GoL).

Chouette hulotte *Strix aluco* (d=165)

Commune et contactée sur l'ensemble du bassin de l'Adour, elle monte jusqu'à plus de 1000m comme à Laruns le 28/02 (GoL) ou à Mendive le 26/05 (STi). Des cris de jeunes sont entendus dès le 25/02 au parc Lawrence de Pau (PhL) et le 11/03 à Messanges (STi). 6% des contacts concernent des individus retrouvés morts sur le bord de la route.

Hibou moyen-duc *Asio otus* (d=12)

Peu communément contacté, cette espèce discrète semble néanmoins répartie sur tout le bassin de l'Adour avec des données à Solférino, Messanges et Commensacq pour les Landes (STi), Sauveterre, Clarac, Puydarrieux et Moulédous pour les Hautes-Pyrénées (divers obs.) et Rébénacq ou Uzein pour les Pyrénées atlantiques (PhL).

Hibou des marais *Asio flammeus* (d=15)

Intéressantes observations d'un à deux individus à Sauveterre-65 permettant de borner l'hivernage du 25/12 au 18/02 au moins (divers obs). Les premiers contacts automnaux démarrent par ailleurs sur la côte à Messanges le 22/09 (STi) puis à Montaner le 1/10 (FBa) et à Hendaye le 13/10 (FCa, GoL, STi). Observé par la suite sur la dune à Tarnos les 17/10 (EDu) et 21/10 (ANa), à Capbreton le 21/10 (JFG) et à nouveau à Messanges le 24/10 (STi).

Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* (d=4)

Sur un site d'Accous, un individu est observé en plein jour le 2/05 vers 1600 m (L. Lacharnay / ONCFS *vide* SDu), puis 3 jusqu'à chanteurs y seront entendus et enregistrés du 3 au 9/05 (SDu

& coll. GOPA). Enfin un chanteur est noté le 1/05 vers 1500 m à Arette (J.L. Iratchet / ONCFS *vide* SDu).

CAPRIMULGIDAE**Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* (d=98)**

Trois fois plus de données que l'année précédente, résultat lié à une prospection spécifique plus poussée. L'ensemble du plateau landais est occupé et constitue le bastion de l'espèce dans la région (STi). Premier précurseur le 22/04 à Messanges (STi) puis courant mai (STi, PUT). Des poussins sont vus les 17/07 à Morcenx, 24/07 à Linxe, 3 et 4/08 à Messanges (STi). Seulement 5 données ailleurs : 3 en période de reproduction, à Agos-Vidalos le 25/05 (DRa), Amou le 27/05 (SLe), Castéra-Lou le 31/05 (FBa), et 2 pouvant aussi être de la migration, à Bénéjacq le 28/08 (CGr) et à Soréac le 12/09 (FBa). Dernière observation le 5/10 à Messanges (STi), site sur lequel 25 individus ont pu être bagués d'août à octobre (STi *et al.*).

APODIDAE**Martinet noir *Apus apus* (d=332)**

Premiers retours pré-nuptiaux à des dates classiques : 4/04 à Bours (SPé), 11/04 à Artix (JIG), 12/04 à Pau (PhL) et à Bours avec 55 individus (SPé). En période de reproduction, visites de cavités dès le 25/04 à Mont-de-Marsan (STi), accouplements à Aureilhan-65 le 3/05 (DRa) et à Aire-sur-l'Adour le 7/05 (CIC), nourrissage toutes les 10 mn à Biriadou le 9/07 (ANe) pour une colonie en falaise ; encore des nourrissements le 23/07 à Pau (PhL). En altitude, au col du Pourtalet (1950 m) le 1/06, un individu, certainement migrateur, essaie de s'agripper à des nids d'Hirondelles de fenêtre en construction durant 15 mn (JIG). Premiers migrateurs les 23/07 à Ger (FBa), 24/07 à Saint-Jean-Pied-de-Port (APa) ; derniers les 8/09 à Bénéjacq (JIG), 23/09 à Messanges (STi) et 22/10 à Bours (DRa).

Martinet pâle *Apus pallidus (d=8)**

L'espèce est rapportée du site de reproduction traditionnel de Biarritz, avec deux noyaux connus : Rocher de la Vierge avec 3 nids minimum

(ANe, FCa) et Rue du Port-Vieux avec 4 à 5 nids (ANe) et des nourrissages le 18/07 sur ces deux sites. Un probable à Anglet le 4/07 (FCa). Par ailleurs 3 observations très probables sont effectuées à Moumour les 3/05, 20/05 et 14/06 (SHo), laissant planer un doute quant à la reproduction de l'espèce dans la région oloronaise.

Martinet à ventre blanc *Apus melba* (d=11)

Une seule donnée en période de reproduction dans le Cirque de Lescun : 7 individus le 28/06 à Ansabère (SHo, SDu). Les observations restantes sont toutes d'août, du 1^{er} au 28/08, et concernent certainement des migrateurs (divers obs.) ; maximum de 8 le 15/08 à Gerde (SPé, FBa).

ALCEDINIDAE

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* (d=401)

En hiver, l'espèce est présente sur 37 communes (divers obs.) dont Laruns le 27/11 (PhL, STi) et Louvie-Juzon (PhL). En période de reproduction, juvéniles volants observés les 27/05 à Moulédous (FBa) et 30/05 au Huchet (PLe / RNNCH) avec présence sur 30 communes (divers obs.). Maximum de 8 individus à Plaiaundi le 20/09 (GoL).

MEROPIDAE

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* (d=23)

Premiers retours prénuptiaux les 9/04 à Lespouey (FBa) et 29/04 à Puydarrieux (VDu) ; derniers migrateurs le 29/05 au col de Pourtalet (JIG). En période de reproduction, colonies occupées à Féas (SDu, SHo), Saint-Jean-de-Marsacq (JIG, SPé, PLe) avec nourrissages les 3 et 6/07 (ANe, JfG), Escalans (P. Moreau) et Saint-Martin-d'Arrossa, nouveau site (AAn). Premiers migrateurs postnuptiaux le 9/08, derniers les 23 et 24/09 à Bénéjacq (CGr).

CORACIIDAE

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* (d=16)

Deux contacts printaniers : un adulte à Peyreget (vallée d'Ossau, 1650 m) le 25/05 (Y. Bielle) et à Castelnaud-Magnoac le 9/06 (D. Portier *fade*

FBa). Observations postnuptiales pour un total de 9 à 11 individus : 1 juvénile à Cieutat du 2 au 15/08 (FBa), 2 à Ger du 12 au 18/08 (PNa, JIG, ANa) et 3 le 17/08 (ANa) dont un adulte minimum, 2 à Argelès-Bagnères du 20 au 28/08 (FBa, B. Blancheteau), 2 (adulte et juvénile) à Asson du 22/08 au 6/09 (E. & R. Champagne *et al.*), 1 juvénile à Saint-Jean-Pied-de-Port du 23 au 26/08 (S. Tardy, www.faune-aquitaine.org), 1 juvénile à Saint-Sever du 22 au 31/08 (V. Dourthe, www.faune-aquitaine.org), 1 à Ciboure le 2/09 (D. Domec, www.faune-aquitaine.org) et 1 juvénile à Orioux le 5/09 (FBa). Il s'agit de l'année où le plus grand nombre d'individus ont été notés.

UPUPIDAE

Huppe fasciée *Upupa epops* (d=302)

Un individu tardif est observé à Tarnos le 1/11 (STi). Les premiers prénuptiaux sont contactés les 13/03 à Ustaritz (GoL), 16/03 à Tostat (SPé) et Escalans (P. Moreau). En période de reproduction, nourrissages du 6/05 à Taller au 12/07 à Saint-Justin (divers obs.). Premiers migrateurs postnuptiaux le 21/07 à Bilhères-en-Ossau (FDA), derniers les 28/08 au lac du Gabas (JIG) et 29/08 à Messanges (STi). Un individu est



Rollier d'Europe juvénile présent à Asson du 22/08 au 06/09 ; année record pour le nombre d'individus, on retiendra également la présence d'oiseaux adultes (photo S. HOMMEAU).

observé le 2/08 à 1800 m d'altitude sur la commune de Bagnères-de-Bigorre (FBa).

PICIDAE

Nous rappelons que dans le cadre d'une étude à long terme, il est demandé de noter les caractéristiques principales des cavités de pics trouvées (anciennes ou nouvelles) avec mention de l'espèce concernée, lieu, altitude, type de boisement, essence support du nid, hauteur de l'arbre et de la cavité, diamètre du tronc à 1,30 m et à hauteur de la cavité, condition de l'arbre (mort, étêté...), orientation de la cavité et position de celle-ci sur l'arbre (tronc ou branche). Des fiches à compléter sont disponibles à cet effet sur notre site internet ; une synthèse en sera faite dans notre revue dès que le nombre de données sera significatif.

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* (d=41)

Premiers retours printaniers les 4/04 à Capvern (FBa), 15/04 à Salles-Argelès (PMi) et 21/04 à Ger (ANa). Seulement 11 communes ont accueilli cette espèce en forte diminution en période de reproduction, avec visite de nichoir par un couple début mai à Salles-Argelès (PMi). Premier migrateur postnuptial le 19/08 à Ger (JIG), puis le lendemain à 1800 m à Accous (SDu). Derniers les 1/10 à Hendaye (ANe) et 6/10 à Morcenx (PUT).

Pic vert *Picus viridis viridis* (d=809)

Les chants débutent timidement en décembre puis deviennent plus réguliers courant janvier (JIG, FCa). Malgré le nombre de données reçues concernant cette espèce, les observations de reproduction sont « squelettiques » : accouplements le 11/04 à Goudon (FBa), nourrissage au nid tardif le 16/06 à Anglet, premiers jeunes volants le 24/05 à Commensacq (STi). Observation à l'étage subalpin à 1850 m le 18/05 en haute vallée d'Ossau, posé sur une falaise d'un *viridis*, confirmant l'absence de *sharpei* dans ce secteur (JIG).

Pic de Sharpe *Picus (viridis) sharpei* (d=15)

L'espèce est observée dans des secteurs déjà connus : Sainte-Engrâce, Arette (STi), Lourdiès-Ichère (SDu), Osse-en-Aspe (MGU), Cam-

pan, Asque (JIG, HLa), Esparros (FBa). Construction de cavités les 26/03 à Campan (JIG, HLa) et 30/03 à Osse-en-Aspe (JIG).

Pic noir *Dryocopus martius* (d=240)

Les manifestations vocales (cris, chant) sont régulières durant l'hiver, correspondant à la consolidation territoriale, les tambourinements débutant mi-février à Ibos (ANa). En période de reproduction, construction de cavités le 9/04 à Campan (JIG, HLa), juvéniles au nid le 31/05 à Messanges (STi), envol de 2 juvéniles le 24/05 à Bernadets (JpP) et jeunes récemment envolés le 17/06 à Bagnères-de-Bigorre (DRa). Dans le cadre de l'expansion de l'espèce en plaine, de nouvelles localités sont notées : Arjuzanx (PUT), Larrivière (STi), Saint-Gein (CIC), Tilh (SLe), Audignon (A. Guyot), Meillon (SDu).

Pic épeiche *Dendrocopos major* (d=815)

Tambourinements à partir de fin décembre, devenant réguliers en février (divers obs.), parades avec vol en parachute à Tarsacq le 29/03 (JIG), nourrissages au nid du 9/05 au 8/06 (divers obs.), premiers juvéniles volants le 22/05 à Lüe (STi). Reprise timide des tambourinements en octobre, correspondant à une ré-affirmation territoriale (divers obs.).

Pic mar *Dendrocopos medius* (d=50)

Parades et chants à partir de fin janvier (FBa, JIG, DRa), creusement de cavité le 6/04 à Bénéjacq (JIG), nourrissages au nid les 12/05 à Saucède (JBo) et 23/05 à Ouzous (PMi). L'espèce est présente à Soulom en période de nidification jusqu'à 950 m d'altitude (CHo). Nouvelles localités de présence : Escalans (P. Moreau), Amou (FCa), Tercis-les-Bains (SHo), Larrau (SDu), Susmiou (SDu), Louvie-Juzon (PhL), Banios (HLa), Lespouey (FBa).

Pic de Lilford *Dendrocopos (leucotos) lilfordi* (d=26)

En période de reproduction, début de construction de cavités (n=3) du 15 au 26/03, envol les 20-22/05 (JIG). Deux contacts (cris lointains et tambourinement) le 25/04 dans les Hautes-Barronnies se rapportent certainement à cette espèce (JIG, HLa). Une mention à seulement 650 m d'altitude le 7/02 à Sarrance (SDu, LCa).

Pic épeichette *Dendrocopos minor* (d=152)
Chant et tambourinement dès le 10/12 à Saubusse (FCa). Altitude maximum en période de nidification de 900 m à Saint-Pé-de-Bigorre (CHo) et à 800 m à Laruns (SDu). Aucune donnée de reproduction significative pour cette espèce. Reprise des tambourinements en octobre, comme chez beaucoup de pics (divers obs.).

ORIOLIDAE

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* (d=155)
En migration pré-nuptiale, premiers les 31/03 à Montardon (JpP), 15/04 à Grenade-sur-Adour, 17/04 à Mazerolles-40 (CIC) et 24/04 à Montaner (FBa). Donnée remarquable d'altitude avec 2 au col du Pourtalet (1800 m) au printemps 2012 (info. PNP). Dernier migrateur certain à Sare le 24/05 (JIG, ANe). En période de reproduction (fin mai à mi-juillet), l'espèce est rapportée de 53 communes (divers obs.). Dernier le 29/08 à Montaner (FBa).

LANIIDAE

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* (d=112)
Premières observations printanières à des dates classiques : arrivées simultanées le 1/05 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, Mendive (AAn) et Lées-Athas (NeA). En période de reproduction, 2 couples à 1750 m et 1670 m à Gavarnie (CHo), un couple à 1620 m au Somport et un mâle à 1870 m le 24/07 au col du Pourtalet (JIG). Jusqu'à 7 mâles et 2 couples dans les barthes de Saubusse le 4/06 (SDu, SHo). Premiers juvéniles volants observés début juillet (divers obs.) ; encore des nourrissages à Orioux le 12/08 (FBa). Dernières observations les 16/09 à Ger et 18/09 au lac du Gabas (JIG).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* (d=2)
Une seule donnée d'hivernage pour cette espèce : à Oloron-Sainte-Marie du 20/11 au 15/03 (SHo) et une observation ponctuelle à Lucbardez-et-Bargues le 11/11 (CIC).

Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* (d=5)
Toujours aussi peu de données hivernales : plateau du Bénou à Bilhères-en-Ossau de novem-

bre à janvier (PhL), site autrefois très fréquenté par l'espèce, Retjons le 25/11 (STi) et Ger de novembre à janvier (JIG, ANa).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* (d=26)
Plusieurs données printanières, contrairement à l'année précédente, s'étalant du 29/04 au Huchet (STi) et à Bénéjacq (CGr) au 11/06 à Gavarnie (*vide* CHo). Toujours pas de données de reproduction (seul indice possible : 4 juvéniles à Escout le 31/08 ; RSm), avec retour de l'espèce le 29/07 à Ger (JIG), derniers les 2/09 à Escout (RSm) et Gurs (SHo) et 4/09 à Cieutat (FBa).

CORVIDAE

Chocard à bec jaune *Pyrhacorax graculus* (d=49)
Rassemblement de 120 à Izeste le 3/01 (PhL). Un accouplement est observé le 29/05 au col du Pourtalet (JIG). Trois individus semblent visiter des cavités au Pic du Jer (Jarret, 800 m) le 28/05 (FBa) et un nid contenant des jeunes est signalé en face Sud de la Brèche de Roland (Gavarnie, 2900 m) le 29/07 (JjH).

Crave à bec rouge *Pyrhacorax pyrrhacorax* (d=86)
Regroupements de 82 à Ayros-Arbouix le 23/02 (PMi), 148 à Aste-Béon le 11/04 après une chute de neige (SDu), 86 au Somport le 16/08 (JIG), 100 à Laruns le 9/09 (PhL) et 110 (en 3 groupes) à Accous le 23/10 (NeA). En limite de l'aire de répartition, l'espèce est notée au Baïgura (Ossès) le 16/11, à Itxassou le 23/05 (ANe) et en plaine à Buzy le 25/01 (SDu). Les premiers jeunes volants sont signalés le 2/07 à Osse-en-Aspe (MGU).

Pie bavarde *Pica pica* (d=430)
En hiver, des dortoirs regroupent 82 individus à Mendionde (GoL), 60 à Pau (PhL), 35 à Bénéjacq (JIG) et 80 à Lanne-65 (DRa, FBa, JmF). Un nid est rechargé dès le 22/01 à Bénéjacq, les premiers jeunes volants étant observés le 15/05 sur ce site (JIG). En montagne, présence à 1100 m à Payolle (JIG), 1200 m à Arbéost avec un nid visible (SDu), 1470 m au col de Soulor (JIG, CGu, ANa),

Les populations françaises et européennes de **Pie bavarde** ont fortement décliné mais il apparaît que les pies « citadines » furent moins impactées et qu'elles reconstituent aujourd'hui leurs effectifs. Qu'en est-il dans notre région très rurale ? Le suivi de dortoirs hivernaux en zones agricoles et urbaines est à encourager, ceux-ci étant constitués d'oiseaux locaux (photo J. BOUILLERCE).



1620 m au Somport et même 1900 m près du col du Pourtalet (JIG).

Geai des chênes *Garrulus glandarius* (d=510)
La construction de nids est observée à partir du 7/04 à Messanges et Villefranque (STi), des transports de nourriture du 27/04 à Nousse (PUT) au 11/07 à Meilhan (STi), puis des jeunes récemment envolés entre le 13/06 à Solférino et le 15/07 à Sainte-Colombe (STi). Un groupe de 18 individus est noté le 9/09 à Laruns à 1600 m d'altitude (SDu).

Cassenois moucheté *Nucifraga caryocatactes**

Choucas des tours *Corvus monedula* (d=31)
En hivernage, 200 à Ladevèze-Rivière et autant à Saint-Aunix le 8/01, un dortoir de 200 à 300 individus étant découvert le même jour à Marciac (JmF). Egalement 125 en vol vers leur dortoir le 24/01 à Sauveterre-65 (SDu, JpP). La reproduction d'un couple est pour la première fois avérée dans le village de Montgaillard-65 (DRa) ; ailleurs des choucas sont observés en période de reproduction à Montaner avec 35 individus dont des jeunes nourris par les parents le 11/07 (FBa), Ossun (ANa) et sur la décharge

de Saint-Pée-sur-Nivelle le 10/05 (AHG). Des groupes de migrateurs postnuptiaux font halte les 17/10 à Clarac (FBa) et 28/10 à Puydarrieux (VDu).

Corbeau freux *Corvus frugilegus* (d=12)

L'hivernage reste localisé dans le nord-est du bassin de l'Adour, avec des observations à Saint-Cricq-Villeneuve (CIC), Aire-sur-l'Adour (STi), Saint-Aunix-Lengros, Ladevèze-Rivière, Marciac, Lacassagne (JmF), Maubourguet (SPé), Sauveterre-65 (DRa, FBa *et al.*) et Chelle-Debat (JpP, JIG).

Corneille noire *Corvus corone* (d=896)

En période internuptiale, jusqu'à 150 en dortoir le 8/01 à Marciac, 130 le 10/01 à Lacassagne, 120 le 8/03 à Villecomtal-sur-Arros (JmF) et 130 le 4/10 au lac de l'Arrêt-Darré (DRa). Un individu leucique est observé le 26/09 à Montaner (FBa). La couvaison est constatée à partir du 26/03 à Salles-Adour (DRa), les premiers juvéniles hors des nids étant observés le 26/05 à Castel-Sarrazin (PLé).

Corneille mantelée *Corvus cornix* (d=1)

Un individu peu farouche est observé le 10/11 sur le parking de l'hôpital de Bayonne (J.B).

Etchebarne *fade* SDu) ; malheureusement en l'absence de photographie ou d'une description détaillée, il est difficile de valider pleinement cette donnée (possibilité d'un hybride avec la Corneille noire). L'espèce n'avait plus été signalée dans le bassin de l'Adour depuis le début du XX^e siècle (1 individu naturalisé prélevé en 1909 à Saint-Sever existe au Musée Dubalen de Mont-de-Marsan).

Grand Corbeau *Corvus corax* (d=221)

Dans les Landes, l'espèce est signalée à Tercisles-Bains, Saubusse, Saint-Laurent-de-Gosse, Sainte-Marie-de-Gosse, Saint-Martin-de-Seignanx, Tarnos (FCa), Saint-Etienne-d'Orthe (JIG, ANe), Messanges, Moliets-et-Maa (STi), Sorde-l'Abbaye, Saint-André-de-Seignanx, Seignosse et Léon (PLe / RNNCH), mais sans preuve de reproduction cette année. Confection du nid dès le 14/02 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (GoL) ; des nids sont signalés sur un viaduc ferroviaire à Lespouey (FBa) et dans une carrière à Salles-Argeles (PMi). Les plus gros rassemblements sont de 60 individus sur la décharge de Saint-Pée-sur-Nivelle le 21/01 (FCa, STi) ou le 21/08 (GoL) et 57 sur celle de Loubajac le 30/01 (JIG) ; également 30 le 12/03 aux Aldudes (GoL).

REGULIDAE

Roitelet huppé *Regulus regulus* (d=39)

Premiers chants notés le 1/03 à Bielle (GoL). Chants également à Ascain le 28/05 (GoL), donnée la plus à l'ouest en période de reproduction : l'ensemble de la chaîne est occupée par l'espèce, localement dès 300 m d'altitude. Un jeune récemment envolé le 22/07 à Beyrède-Jumet (DRa). Une mention en période de reproduction dans le massif landais, le 22/05 à Escource (STi). En plaine, premier contact précoce le 2/09 à Lons (MCh) puis plus classiquement sur la côte les 23, 25 et 28/10 (FCa, EDU, STi, PhL). En montagne, des groupes de 10 à 24 oiseaux sont observés le 28/10 à Arette (STi, GoL) ou le 31/10 à Arbéost (PUT), démontrant que le flux migratoire traverse aussi les Pyrénées sur un large front.

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* (d=569)

D'instinct grégaire principalement en automne-hiver, les groupes contactés ne rassemblant que rarement plus de 10 individus. Ainsi, des groupes de 30 comme le 14/01 à Linxe (STi) constituent une exception. Premiers chants les 20/02 à Anglet (FCa), 24/02 à Saint-Gein (STi) et 27/02 à Arudy (PhL). Les premiers nourrissages ne sont constatés que le 6/05 à Taller (STi) et le 15/05 au Huchet (PLe / RNNCH). Derniers envols assez tardifs pouvant faire penser à des deuxièmes pontes le 25/07 à Lалуque (STi) et le 1/08 à Lescun (DHa).

REMIZIDAE

Rémiz penduline *Remiz pendulinus* (d=47)

L'espèce s'est attardée jusqu'à mi-décembre sur la côte landaise (STi) puis il a fallu attendre le 16/03 pour le premier contact printanier à Abos (PhL), dernier le 4/05 à Orx (PLe).

Pas d'indice de reproduction, l'espèce réapparaissant le 23/08 à Orx (JfG) avec un afflux courant octobre concentré sur la côte landaise de Léon à Tarnos (divers obs.). Des maxima de 60 le 24/10 sont atteints au marais de Moïsan à Messanges (STi).

PARIDAE

Remarque générale : les données de biologie de reproduction sont très peu rapportées pour cette famille (sites de nid, apports de matériaux de nid, dates de ponte, d'envol). Pour les nourrissages, il est nécessaire d'indiquer s'il s'agit d'apports à des juvéniles au nid ou volants (remarque valable pour tous les passereaux). D'autre part, la forte pluviométrie de début avril a eu une influence certaine sur la phénologie de reproduction de ces espèces en 2012.

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* (d=679)

Premiers chants dès le 16/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) puis visites de sites de nid les 26/02 à Ustaritz et 15/03 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL), accouplements le 12/03 à Pau (PhL) ; premiers nourrissages au nid le 27/04 à Ustaritz (GoL), juvéniles volants observés à partir des 9/05 à Rion-des-Landes (STi) et 12/05 à Ustaritz

(GoL) jusqu'au 1/08 à Momas (PhL). L'espèce est contactée en novembre à 1485 m à Arette (GoL) et en février à 1548 m à Bielle (PhL).

Mésange charbonnière *Parus major* (d=811)
Chants à partir de décembre puis très réguliers à mi-février (divers obs.). Visite de cavités le 22/03 à Mées (FCa), construction de nid le 14/04 à Bihères-en-Ossau (FDA), juvéniles volants le 24/04 à Trébons (DRa) et derniers envols le 30/07 à Lescun (DHa), reflétant bien la phénologie de l'espèce avec deux pontes régulières. Reproductions en altitude avérées à Urdos à 1620 m (JIG) et à Gourette à 1670 m (FDA).

Mésange huppée *Lophophanes cristatus* (d=612)

Malgré le grand nombre de données, aucune ne rapporte d'indices de reproduction dignes d'intérêt, hormis ces juvéniles volants observés au Huchet le 15/05 (PLe, RNCH) et à Laruns (Peyreget, 1750 m) le 14/06 (SDu). Du point de vue géographique, la forte présence de l'espèce dans les Landes est confirmée (divers obs.), les données de plaine en Béarn et Bigorre demeurant rares alors que l'espèce y est régulière.

Mésange noire *Periparus ater* (d=281)

Chants réguliers à partir de janvier (divers obs.). En période de reproduction, bien présente sur la côte landaise (divers obs.) avec juvéniles volants le 3/06 à Moliets-et-Maa (PLe) et à l'intérieur du département. Des observations à Pau mi-avril et fin juin (PhL) font soupçonner une reproduction possible. Ailleurs en plaine, l'espèce est contactée à Urrugne (GoL), Saint-Jean-de-Luz (FCa), Oloron-Sainte-Marie (SHo) et Orleix (SPé) mi-juin. Nourrissage au nid le 4/06 à Barèges (CHo) et à Laruns le 14/06 dans une cavité de Pin à crochet (SDu). Retour des hivernants en plaine fin octobre à Orioux (FBa), Azereix (GDu) et Bénéjacq (JIG).

Mésange nonnette *Poecile palustris* (d=112)
Premiers chants dès les 10/12 à Saubusse (FCa) et 6/01 à Villefranque (PhL). Nourrissage de juvéniles au nid le 15/05 à Pouzac (ALe) et volants le 31/05 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), seules observations se rapportant à la

reproduction dignes d'être mentionnées ! En montagne, l'espèce est contactée à Osse-en-Aspe à 1533 m le 28/11 (SDu, STi, GoL), à 1548 m à Bielle le 25/02 et à 1412 m à Laruns le 23/06 (STi, PhL).

TIMALIIDAE

Léiothrix jaune *Leiothrix lutea* (d=57)

L'expansion se poursuit, avec une présence reportée sur 37 communes, dont Vieux-Boucaules-Bains (coll. GOPA), Amou (FCa), Arthez-de-Béarn (FCa, PLe), Orx, Saint-Pé-de-Léren (PLe), Léren (SHo), Etchébar, Arette, Sarrance et Borca à 1600 m d'altitude (SDu), Accous (S. Augras *vide* MGU), Juillan (*vide* VRe), Montaner, Laslades, Clarac, Peyraube, Peyrigure (FBa) et Puydarrieux (VDu).

PANURIDAE

Panure à moustaches *Panurus biarmicus**

ALAUDIDAE

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla**

Cochevis huppé *Galerida cristata* (d=50)

Deux zones de présence pour l'espèce dans la région, une littorale avec des oiseaux présents tout au long de l'année jusqu'à Anglet au Sud, et l'autre peut-être plus saisonnière (été-automne) sur le Val d'Adour en Bigorre. Des indices de nidification sont ainsi relevés à Tarnos (FCa), Vielle-Saint-Girons (STi), Ibos, Ossun (CHo) et Maubourguet (SPé, JmF). L'absence de cochevis constatée plus en aval dans la vallée de l'Adour peut être due à une sous-prospection !

Alouette lulu *Lullula arborea* (d=96)

La migration se prolonge en novembre, 2 à Messanges le 12/11 (STi) et 1 à Malabat le 29/11 (JmF). Au cours de l'hiver, des groupes de 18 à Clarac le 8/01 et de 20 à Montaner le 14/02 (FBa). Le passage pré-nuptial est détecté à partir du 27/02 à Saint-Etienne-d'Orthe avec 5 individus (FCa). En période de nidification, seules les Landes apportent des indices probables ou certains, 14 communes étant concernées

(STi, PhL, CIC, PUT) ; ailleurs, des oiseaux sont signalés à Lohitzun-Oyhercq et Larribar-Sorhapuru les 23 et 24/06 (FCa, STi, PhL). Le flux postnuptial débute fin septembre et prend sa vraie mesure en octobre, 5 le 1/10 à Messanges (STi), 1 le 10/10 à Béost (SDu), 7 le 15/10 à Bénéjacq (JIG) et des max. à Messanges les 18 et 24/10 avec respectivement 25 et 35 « lulus » (STi).

Alouette des champs *Alauda arvensis* (d=120)
Des migratrices sont encore notées au cours du mois de novembre, 126 le 5/11 à Capbreton (FCa) et des troupes d'hivernantes se forment à partir de cette période : 120 à Lacassagne le 10/01 (JmF), 300 à Poey-de-Lescar le 30/01 (PhL), des groupes plus modestes étant observés çà et là dans les secteurs de plaine de la région. La migration pré-nuptiale est décelée entre le 20/02 avec 15 ind. à Anglet (FCa) et le 13/03 à Ustaritz (GoL) et Léon (PLe) ; une donnée tardive d'oiseaux en halte le 1/04 à Aren (SDu). La nidification est révélée sur une vingtaine de communes, quelques unes en plaine mais la majorité sur le piémont et en montagne (divers obs.). La migration postnuptiale débute les 29/09 à Messanges (STi) et 1/10 à Puydarrieux (VDu), s'amplifiant au cours du mois suivant, par exemple 200 en mer à Tarnos le 18/10 (EDu) ; le front migratoire est large avec une concentration plus forte dans la zone littorale.

Alouette haussecol *Eremophila alpestris**

HIRUNDINIDAE

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (d=129)
Une précoce au Huchet le 29/02 puis une plus classiquement sur ce site le 12/03 (PLe / RNNCH) et 2 à Saint-Martin-de-Seignanx le 14/03 (FCa) ; à l'intérieur des terres, la première est notée le 21/03 à Bours (SPé), des migrateurs se montrant jusqu'au 7/05 à Messanges (STi). La reproduction est avérée à Lahontan (70 trous, PLe) et Chis (76 trous, SPé) et possible à Castétis (PLe) et Cazères-sur-l'Adour (CIC). La migration postnuptiale débute dès le 1/08 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL), culmine courant septembre, 300 à Orx le 13/09 (FCa) puis

devient très clairsemée au mois d'octobre ; dernières le 22/10 à Bours (DRa).

Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris* (d=61)

L'espèce hiverne dans plusieurs sites du piémont : 20 à Saint-Jean-Pied-de-Port le 15/12 (LGo), 30 à Pau le 22/12 (JIG) ou 30 à Agos-Vidalos le 22/01 (DRa). La nidification est constatée sur au moins une vingtaine de sites de montagne, en sites naturels ou sur des édifices. Les premiers indices sont notés à partir du 17/03 à Urepel (GoL). Des nourrissages sont observés à Estérençuby le 25/06 (GoL) et Arbéost le 24/07 (ANa). Quelques rassemblements post-nuptiaux : 30 à Arbéost le 27/08 (FCa), 10 à Lescun le 9/09 (CIC).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* (d=671)

Encore des migratrices les 6/11 à Capbreton (coll. GOPA) et 11/11 à Messanges (STi). Au cours de l'hiver, une donnée remarquable d'un oiseau volant vers le nord le 17/01 à Agos-Vidalos (DRa), hivernant ou migrateur très précoce ? Les toutes premières hirondelles du printemps apparaissent les 5/03 à Puydarrieux (VDu) et 6/03 à Saint-Gein (CIC) et Léon (PLe / RNNCH). La migration culmine vers la mi-avril, avec des rassemblements importants, surtout les jours pluvieux : 500 sur le lac de l'Ayguelongue le 14/04 (PhL), 300 à Artix le 15/04 (STi, PhL) ou 293 à Bours le même jour (SPé). Un couple suivi à Morcenx se cantonne le 29/04, pond 4 œufs du 12 au 16/05, la première éclosion se produit le 1/06 et l'envol du premier jeune le 20/06 (PUT). Des concentrations estivales au lac de l'Ayguelongue à partir du 1/08, puis la migration est constatée quasiment tous les jours de l'automne avec des pointes entre le 10 et le 20/09 ; à noter 2500 posées sur le marnage asséché au lac du Gabas le 18/09 (JIG). Dernières les 30/10 à Hendaye (PhL) et au Huchet et 31/10 à Montgaillard-40 (CIC).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (d=193)

Première le 11/03 à Messanges (GoL, STi), puis les 30/03 à Saubusse (FCa) et 4/04 à Saint-Gein (CIC) ; la migration court jusqu'en mai avec des



La **Mésange noire** est avant tout une montagnarde avec quelques nicheurs en plaine mais les données récentes indiquent également une présence régulière et continue sur le littoral landais (photo P. NAVARRE).

pics constatés en avril, notamment 300 le 14/04 sur le lac de l'Ayguelongue (PhL, STi). La reproduction est constatée sur des bâtiments mais également sur parois naturelles jusqu'à l'altitude de 2250 m au Pic d'Ansabère (SDu). Les mouvements postnuptiaux débutent vers la mi-août : des groupes sont notés à Aydius le 15/08 (MCh), 100 perchées au sommet d'un peuplier le 23/08 à Montaner (FBa), 100 à Bilhères le 28/08 (PhL). La présence de l'espèce s'étiole à partir de mi-octobre, les dernières étant notées le 22/10 : 2 à Bénéjacq (JiG) et 10 à Bours (DRa).

Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*

CETTIDAE

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (d=413)

Présente cette année sur 74 communes, elle ne semble pas avoir souffert de la vague de froid de février-mars 2012. Premiers jeunes le 31/05 au

Huchet (PLe / RNNCH) et le 1/06 à Lahontan (PLe) ; derniers nourrissages tardivement le 14/08 à Messanges (STi). Des concentrations de 10 oiseaux le 19/09 à Orx (FCa) ou les 6 et 18/10 à Messanges (STi). Observation inhabituelle d'un oiseau chanteur à Etsaut au printemps 2012 (J. Bauwin, PNP, *vide* JiG).

AEGITHALIDAE

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (d=)

En hiver, troupes de 20 à Anglet le 10/12 (FCa) ou de 35 à Villefranque le 6/01 (PhL) et présence à Gourette à 1470 m le 1/01 (FDA). En période de reproduction, construction des nids du 21/02 à Ondres (JfG) jusqu'au 6/04 (divers obs.), premiers envols le 29/04 à Préchac (PMi) puis régulièrement en mai (divers obs.). Maximum de 36 individus le 15/07 à Cazères-sur-l'Adour (CIC) et de 30 le 12/10 à Orx (FCa).

PHYLLOSCOPIDAE

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus** (d=6)

Comme les années précédentes, l'espèce est contactée en octobre sur la côte. Le premier est vu le 10/10 au Huchet (PLe / RNNCH), puis au minimum 3 oiseaux différents transitent ensuite par Messanges : 2 sont bagués les 23 et 24/10 et un autre est observé le 26/10 (STi). Enfin, une observation également à Biarritz le 24/10 (FCa).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (d=46)
Premiers retours printaniers aux mêmes dates que l'an passé les 2/04 à Bours (SPé) et 6/04 à Mont-de-Marsan (CIC). Dans le département des Landes, Lencouacq, Luxey, Pissos, Labrit, Arjuzanx, Messanges, Sabres (STi), Morcenx et Capbreton (PUT) accueillent l'espèce, des jeunes étant notés le 26/06 à Pissos, le 30/06 à Labrit et le 1/07 à Lencouacq (STi). Observé également en période de reproduction à Boû-Silhen (PMi, CHo), Clarac et Montaner (FBa). Remarquables données d'altitude les 1/06 à Sarance (1650 m), 14/06 à Laruns (1785 m) (SDu, LCa) et 15/06 à Gavarnie (1500 m) (PMi).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (d=6)
Très peu de contacts. Jusqu'à 5 chanteurs sont notés à Soulom le 6/05 (L. Wheatland *vide* CHo) et encore 1 le 08/05 (CHo). Un mâle chanteur est entendu à Osse-en-Aspe (1270 m) le 13/05 (SDu) et un autre à Aydius (1553 m) le 14/05 (SHo). Une étonnante donnée de plaine le 9/06 à Carresse-Cassaber (PLe) signale peut-être un attardé. Premier retour automnal dès le 29/07 à Esquiule (SHo).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (d=1213)

Premier chant le 23/02 à Tostat (SPé) et Tarsacq (JIG), puis le 25/02 à Ustaritz (GoL). Les effectifs augmentent courant mars au moment du passage prénuptial : 15 à Messanges le 9/03 puis 20 le 10/03 (STi), maximum de 200 à Biarritz le 20/03 (ANe). Un oiseau construit son nid le 7/04 à Montaner (FBa). Premiers nourrissages constatés les 17/05 à Messanges et 24/05 à Commenacq, derniers le 1/08 à Lencouacq (STi). Des adultes sont en mue le 23/08 à Onesse-et-Laha-

rie (PUT). La migration d'automne devient plus significative à partir du 15/09 avec notamment 15 à Messanges puis 25 le 23/09 et 80 le 29/09 (STi, FCa). Le passage reste intense en octobre avec par exemple 50 à Messanges les 15 et 24/10 (STi, GoL). Des oiseaux de passage sont contactés en altitude mais les concentrations au travers du massif demeurent moindres qu'en plaine, démontrant peut-être une stratégie de contournement par l'ouest de la chaîne lors des baisses des températures. Quatre oiseaux de type *abietinus* ou *tristis* ont été contactés les 13/11 à Messanges (STi), 24/12 à Biarritz (FCa) et 11/02 à Capbreton (STi). La détermination des sous-espèces nordiques demeure toutefois difficile, même en main, et il convient de rester prudent en l'état de nos connaissances.

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* (d=19)
De retour le 2/04 à Ascain où près de 8 individus sont entendus au cours de la saison (FCa, GoL, STi). Contacté également à Sare, Saint-Etienne-de-Baïgorry, Urrugne, Ustaritz et Saint-Just-Ibarre (FCa, GoL, STi). Hors de son aire de répartition habituelle, il est noté à Osse-en-Aspe le 7/05 (JIG), à Aramits le 25/05 (SHo) et à Bagnères-de-Bigorre le 2/06 (DRa)

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (d=229)
Premiers retours les 14/03 à Hendaye (JFe) et 15/03 à Puydarrieux (FBa). Les derniers de la vague de printemps sont notés le 4/05 à Narrosse et Bidart (PhL). Retours automnaux le 2/08 à Bénéjacq (JIG) et à Lescun (DHa). Le gros du passage se situe entre mi-août et mi-septembre (divers obs.) ; le dernier très tardif est noté le 31/10 à Villefranque (PhL, FCa).

SYLVIDAE

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (862)
Présente toute l'année. Les premiers chants apparaissent le 10/03 à Ibos (ANa) et Aureilhan (DRa), où 4 couples sont cantonnés dès le 18/03 (DRa). Des plaques incubatrices indiquent des femelles qui couvent le 22/04 à Messanges (STi). Des nourrissages sont notés à Onesse-et-Laharie et un nid est occupé à Lesperon le 5/05 (STi) ; des jeunes fraîchement envolés sont encore notés le 23/07 à Laluque (STi). La

migration d'automne se déroule principalement en septembre-octobre et des rassemblements sont notés régulièrement : 20 le 16/09, 50 le 29/09, 30 le 6/09 et 40 le 15/10 à Messanges (STi, FCa, GoL).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* (d=89)

Premiers retours à Messanges à partir du 22/04 avec 1 individu puis 15 le 27/04 (STi). Les chants se font entendre en mai-juin et les premiers nourrissages sont observés les 15/07 à Coudures (STi) et 17/07 à Bénéjacq (CGr). La migration est déjà perceptible à la mi-août et s'achève le 12/10 avec un dernier oiseau à Messanges (STi).

Fauvette épervière *Sylvia nisoria***

Fauvette babillarde *Sylvia curruca**

Fauvette orphée *Sylvia hortensis (d=1)**

Capture exceptionnelle pour la région d'un individu le 3/04 à Messanges (STi). Les précédentes observations de cette espèce sont les suivantes : 26/04/1962 au Pays-Basque (*Oiseaux de France*, N. 13), 19 et 21/08/1965 à Capbreton (J.M. Thiollay), 10/04/1981 à Hendaye (J. Fourquet) et 10/05/1998 à Mendive (J.Y. Frémont, M. Duquet, A. Larousse).

Fauvette grisette *Sylvia communis* (d=179)

Premiers retours les 1/04 à Anglet (ANe), 2/04 à Denguin (JIG) et 5/04 à Marsac (SPé). Les premiers chants retentissent dès le 9/04 à Messanges (STi). Un pic de passage survient entre le 27 et le 29/04 avec des effectifs cumulés atteignant 186 contacts à Messanges (STi). La reproduction démarre en mai avec des plaques incubatrices observées le 18/05 à Messanges (STi) et des comportements d'alerte et d'alarme le 23/05 à Ger (ANa). Des nids avec œufs ou poussins sont trouvés à Messanges les 16 et 17/06 (STi), des jeunes à peine volants signalés à Villenave-près-Marsac le 1/07 (SPé) et Escourle le 12/07 (STi). La migration automnale reprend à partir du 10/08 (JIG) et devient plus marquée fin août et courant septembre. La dernière de l'année est vue à Sare tardivement le 29/10 (ANe).

Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata**

Fauvette pitchou *Sylvia undata* (151)

La forêt landaise constitue le bastion de l'espèce dans la région avec des densités localement importantes. Dans le sud-ouest du Pays basque, la distribution se précise : une population est installée sur les communes d'Urrugne, Biriadou, Sare, Ascain, Irissarry et Saint-Martin-d'Arrossa (divers obs.). Une mention enfin le 11/05 sur la lande de Ger (PhL), site où la reproduction n'est plus avérée depuis deux décennies. Si les chants hivernaux sont fréquents, les comportements nuptiaux sont notés à partir du 2/04 à Ascain (FCa) et des matériaux de construction sont transportés le 9/04 à Messanges (STi). Les premiers transports de nourritures sont notés le 12/05 à Onesse-et-Laharie (PUT), les premiers jeunes sortis du nid sont remarqués les 1 et 2/06 à Messanges (STi) et le 4/06 à Onesse-et-Laharie (PUT). Hors période de reproduction, observée lors du passage automnal les 28/10 à Ossun (CHo) et 10/11 à Puydarrieux (VDu).

Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* (d=1)

Un mâle chante le 8/05 à Jarret, sans suite (FBa).

Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* (d=44)

Concernant la population des Hautes-Pyrénées, un couple demeure à Boê-Silhen mais les contacts sont irréguliers (DRa, CHo) et une femelle 2A est capturée à Lau-Balagnas le 10/05 (PFO) indiquant une possible dispersion d'un oiseau né non loin l'année précédente. Dans les Landes, présente classiquement à Capbreton, Tarnos et Ondres (divers obs.). La population de la côte basque se développe peu à peu avec des contacts toute l'année d'Hendaye à Anglet (FCa, ANe, PhL). Hors du bassin de l'Adour, signalons une observation le 4/06 à Lamarque-33 (ANe).

LOCUSTELLIDAE

Locustelle tachetée *Locustella naevia* (d=52)

Un précurseur dès le 11/03 à Messanges (STi) puis plus classiquement le 26/03 à Onesse-et-Laharie (PUT) ou le 2/04 à Ascain (FCa). Pas d'indice pertinent sur la reproduction cette

année encore. Dernières le 30/09 à Messanges (STi).

Locustelle lusciniöide *Locustella luscinioides* (d=14)

Au passage printanier, l'espèce est contactée à Puydarrieux le 23/04 (VDu) et à Messanges le 29/04 (STi). Dans son bastion de l'étang de Léon, l'espèce est en diminution avec seulement 5 chanteurs contactés sur la rive Ouest (PLe / RNNCH). Le passage migratoire d'automne apporte son lot d'observations à Messanges avec 8 contacts du 11 au 29/08 (STi, PhL, FCa), puis ponctuellement le 29/09 (STi) et tardivement le 27/10 à Moumour à l'occasion d'une halte dans un champ de maïs (SHo).

ACROCEPHALIDAE

Hypolaïs ictérine *Hyppolaïs icterina**

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* (d=386)

Rapportée sur 139 communes. Premier retour le 23/04 à Puydarrieux (VDu). Un mâle reproducteur est capturé le 13/05 à Onesse-et-Laharie (PUT) et une femelle avec plaque incubatrice le 17/05 à Messanges (STi) signalant le début de la reproduction. Un mâle chanteur est observé à Sarrance à 1500 m dans des genévriers le 1/06 (SDu, LCa). Nourrissages à partir du 5/06 à

Luxey (STi) jusqu'au 24/07 à Onesse-et-Laharie et 1/08 à Lencouacq (STi) alors que les premiers migrateurs s'annoncent déjà : le 17/07 à 1850 m d'altitude à Laruns (JIG). Dernière donnée le 23/09 à Messanges (STi).

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* (d=18)

3 données hors baguage dont une en halte au passage prénuptial (peu fréquent) le 27/04 à Messanges (STi), les deux autres lors du passage automnal le 8/08 au Huchet (PLe / RNNCH) et le 13/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (EDu). Les autres données sont issues des activités de baguage à Messanges, en deux phases du 11/08 au 01/09 puis du 21/09 au 30/09, et quelques attardés ponctuellement jusqu'au 23/10 (STi, PhL, FCa).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* (d=66)

Retours les 4/04 à Saint-Vincent-de-Paul (FCa), 7/04 à Villefranque (STi) et 9/04 (à Orx (SDu). Un oiseau capturé le 29/04 à Messanges avec 28 autres était porteur d'une bague britannique (STi). Un mâle reste au moins jusqu'au 22/06 à Saint-Gein (CIC), seul site possible de reproduction. Les premiers migrateurs automnaux sont notés le 25/07 au lac de l'Ayguelongue (PhL) puis tous les jours du 8/08 au 5/09 (divers obs.).

Trois observations visuelles de **Phragmite aquatique** rapportées cette année: outre la rareté de l'espèce, son comportement et les milieux fréquentés rendent sa détection aléatoire (photo S. DUCHATEAU).



Des retardataires les 12 et 15/10 à Messanges (GoL, STi).

Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola***

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris (d=1)**

Un oiseau capturé le 1/09 à Messanges (STi), donnée exceptionnelle dans le sud-ouest de la France puisqu'il s'agit seulement de la 3^{ème} observation après celles du 24/05/2007 à Pontonx-sur-Adour (F. Ibañez) et du 31/05/2009 à Adast-65 (O. Grosselet).

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* (d=136)

Des attardées très tardives les 1/11 et 8/11 au lac de l'Ayguelongue (PhL) mais surtout le 11/12 à Messanges (STi). Puis retour printanier à partir du 4/04 à Saint-Vincent-de-Paul (FCa). La reproduction est avérée à Messanges par des plaques incubatrices le 7/05 (STi) et au Huchet par des nourrissages le 21/06 (PLe / RNNCH). La migration devient marquée courant août avec 30 oiseaux à Messanges le 17/08, 40 le 20/08, 105 le 22/08 et encore 50 le 1/09 (STi, PhL). Elle demeure importante jusqu'à fin septembre : 50 oiseaux capturés à Messanges le 29/09 (STi, FCa). Dernier contact le 28/10 sur ce site (STi, FCa, PhL).

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* (d=3)

Une à Plaiaundi le 13/08 (FCa), puis les 19/08 et le 6/09 à Messanges (PhL, STi).

CISTICOLIDAE

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* (d=204)

Répartie sur les trois départements mais les données rassemblant plus de 4 individus se situent sur Messanges ou Villefranque où la reproduction est avérée jusqu'au 17/09, avec une plaque incubatrice très vascularisée (STi). Des nourrissages à Saint-Laurent-de-Gosse le 20/07 (FCa). Les zones humides du sud-ouest des Landes présentent des effectifs importants ; la Chalosse accueille également une population dispersée et la Bigorre n'est pas en reste avec des contacts réguliers toute l'année (divers obs.).

BOMBYCILLIDAE

Jaseur boréal *Bombycilla garrulus**

TICHODROMADIDAE

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* (d=19)

En hivernage, l'espèce est observée sur les sites suivants : Saint-Etienne-de-Baïgorry (AAn), Lourdios-Ichère (SDu), Arudy à 630 m (PhL), Pibeste (DRa) et Luz-Saint-Sauveur (CHo). En période de reproduction, présence à des altitudes comprises entre 1700 et 2830 m. (divers obs.). Un couple dont la reproduction a été suivie à la Brèche de Roland (Gavarnie) a vu les juvéniles prendre leur envol le 26/07 ; voici ce qu'a observé H. Lapeyre ce jour là : « *Le nourrissage continue pour les derniers occupants du nid car pour 2 autres, les plus hardis, j'ai pu assister à leur projection dans le grand inconnu. Effectivement les plus hardis restaient à l'entrée du nid et accaparaient toutes les becquées. Les parents comme s'ils s'étaient concertés se sont coup sur coup agrippés à leurs 2 progénitures et les ont basculées dans le vide. J'ai vu ensuite ces 2 jeunes sautiller et remonter l'éboulis pour venir se cacher à l'ombre d'un rocher où les parents sont venus les ravitailler. Au nid pendant ce temps le nourrissage s'est poursuivi mais cette fois les parents pénètrent dans la fissure, preuve que les jeunes restants sont moins alertes que leurs aînés. Je suis resté 7h35 à comptabiliser toutes les fréquences de nourrissage* ».

SITTIDAE

Sittelle torchepot *Sitta europaea* (d=451)

Premiers chants fin janvier (FCa), visites de cavités et construction du nid du 22/03 au 22/04, nourrissage de juvéniles volants du 3/05 au 28/05 (divers obs.). Deux cas d'utilisation de loges de Pic noir dont la Sittelle rétrécit l'entrée, comportement assez régulier en montagne. À cette période, espèce présente jusqu'à 1550 m d'altitude aux Eaux-Bonnes (SDu) et 1500 m à Etsaut (CLC). Premiers jeunes volants notés le 3/05 (GoL), puis communément de la dernière décade de mai à mi-juillet (divers obs.).

CERTHIDAE

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* (d=23)
Premiers chants le 7/02 à Sarrance (SDu, LCa) ; construction d'un nid sous l'écorce d'un sapin le 25/04 à Asque (JIG, HLa), seules données reçues pour la période de reproduction. Nouvelle localité de piémont : le bois de Gouloume à Aramits à 420 m d'altitude (SDu).

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (d=456)

Premiers chants dès le 15/01 à Dax (SLe), devenant réguliers fin février (divers obs.), construction de nid le 29/03 à Bénéjacq (JIG), premiers juvéniles volants le 16/05 à Garrosse (STi). Données d'altitude à Etsaut à 1500 m et à Urdos à 1459 m le 8/09 (CIC).

TROGLODYTIDAE

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (d=809)

Premier chant signalé le 6/02 à Bours (DRa), puis régulièrement à partir du 24/02 à Ustaritz (GoL *et al.*). Des nids sont occupés à partir du 15/04 à Grenade-sur-l'Adour (CIC) et du 29/04 au Huchet avec 4 oeufs (STi) ; premiers jeunes volants le 6/05 à Gourbera et dernier tardivement le 14/08 à Messanges (STi).

STURNIDAE

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (d=435)

En hivernage, groupe le plus important estimé à 6000 individus le 1/12 à Morcenx (PUT). Premiers chants courant février, visite de cavités dès le 2/03 à Aureilhan (DRa), construction de nid les 4/04 à Dax (FCa) et 26/04 à Denguin (JIG), nourrissages les 27/04 à Bordères, 30/04 à Bénéjacq (JIG) et 4/05 à Bidart (PhL). Envol le 15/05 à Tostat pour un nid sous un toit (SPé) puis les 11/05 à Morcenx (PUT) et 13/05 à Trébons (DRa). Rassemblement automnal de 4000 individus le 25/10 à Géronce (SHo). Un individu non identifié spécifiquement, en provenance d'Espagne, est observé au col du Pourtalet le 25/05 (JIG).

Étourneau unicolore *Sturnus unicolor**

Étourneau roselin *Pastor roseus**

CINCLIDAE

Cincle plongeur *Cinclus cinclus* (d=54)

Huit individus sont dénombrés le 14/01 au Lac des Gaves à Préchac (PMi). En plaine, signalé à Meillon (JIG), Ibos (ANa), Aureilhan (DRa), Clarac et Cabanac (FBa). Premiers chants dès le 1/01 à Aramits (PhL) ; des jeunes volants sont observés le 27/05 à Banca (GoL, STi). L'espèce est présente au lac d'Artouste (1943 m) le 8/09 et aux lacs d'Ayous (2082 m) le 9/09 (PhL).

MUSCICAPIDAE

TURDINAE

Merle à plastron *Turdus torquatus* (d=56)

L'espèce est contactée jusqu'au 26/11 dans le massif du Jaout (Louvie-Juzon) (STi, PhL). Premiers retours printaniers les 17/03 au col de Soulor (ANa), 18/03 à Gavarnie (PMi) et 23/03 à Bagnères-de-Bigorre (VDu, FBa). Maximum de 20 au col de Soulor le 24/03 (ANa) et de 24 (les deux taxons présents) à Larrau le 31/03 (SDu). Plusieurs observations dans les Landes à cette période : Onesse-et-Laharie (PUT), Léon et Saint-Geours-de-Maremne (PLe). Premiers chants le 9/04 à Beyrède-Jumet (JIG, HLa). En période de reproduction, l'espèce est notée de 1400 à 1850 m d'altitude, dans des habitats où les résineux (Sapin, Pin sylvestre, Pin à crochets) sont présents. Dès fin août, une montée en altitude, bien au-dessus de la limite des forêts, est perceptible (divers obs.). Premiers migrants postnuptiaux le 1/10 à Messanges où l'espèce est contactée à plusieurs reprises jusqu'à la fin de ce mois (STi) ; dernière mention le 31/10 d'un individu de la forme nominale (SDu).

Merle noir *Turdus merula* (d=903)

Premiers chants les 11/01 à Tostat (SPé) et 22/01 à Aureilhan (DRa). Pour les premières pontes, construction de nid observée du 16/03 à Tostat (SPé) au 27/04 à Aureilhan (DRa), envols du 21/04 à Garinden au 4/06 à Heugas (SDu). Pour les secondes pontes, encore des oeufs non éclos le 20/06 à Lacassagne (SPé) et juvéniles




Figure 3 – Indice kilométrique d'abondance (IKA) de la Grive musicienne au passage postnuptial 2012 sur la commune de Montaner (Hautes-Pyrénées) (FBa)




Figure 4 – Indice kilométrique d'abondance (IKA) du Rougegorge familier au passage postnuptial 2012 sur la commune de Montaner (Hautes-Pyrénées) (FBa)




Figure 5 – Indice kilométrique d'abondance (IKA) du Gobemouche noir au passage postnuptial 2012 sur la commune de Montaner (Hautes-Pyrénées) (FBa)

juste volants le 22/07 à Bihères-en-Ossau (FDA).

Grive litorne *Turdus pilaris* (d=45)

Lors de l'hiver 2011-2012, l'espèce est notée sur 21 communes seulement avec un petit maximum de 17 individus à Arbéost le 26/01 (JIG). Derniers hivernants les 9/03 à Vic-en-Bigorre

(JmF, DRa) et 18/03 à Uzein (PhL) et au lac de l'Ayguelongue (ANa). Une observation exceptionnelle de par la date est effectuée le 24/06 sur la commune de Beaucens, en dessous du lac d'Isaby, au sortir de la forêt, avec 2 individus contactés (DRa) : y-a-t-il eu tentative de reproduction en ce lieu ? Une recherche pour le printemps 2013 est envisagée. Retours automnaux les 14/10 à Aubarède (FBa) et 24/10 à Messanges (STi) pour un total de 60 individus sur ce même site le lendemain (STi).

Grive musicienne *Turdus philomelos* (d=475)
Suite à la vague de froid de début février, rassemblement de 40 à Ustaritz le 12/02 (GoL). Derniers migrateurs le 9/03 à Vic-en-Bigorre (JmF, DRa). Premiers chants en décembre (JIG) puis plus réguliers en janvier avec interruption durant les intempéries de début février et reprise en fin de mois (divers obs.). Très peu de données de reproduction reçues : nourrissages le 4/05 à Narrosse (PhL), juvéniles volants le 10/05 à Montaner (FBa). L'espèce est notée à 1800 m le 3/05 à la Pierre-Saint-Martin (NeA). Premiers mouvements migratoires automnaux les 7/10 à Lanne-en-Batérous (SDu) et 10/10 au Huchet (PLe / RNNCH). Un IKA réalisé à Montaner montre un pic migratoire au 24/10 (Figure 3 ; FBa).

Grive mauvis *Turdus iliacus* (d=182)

Migration active jusqu'à début décembre avec de faibles effectifs (divers obs.) puis l'espèce est contactée en petit nombre sur 42 communes avec un maximum de 68 oiseaux le 12/02 à Oloron-Sainte-Marie (SHo). Derniers hivernants les 19/03 à Ayros-Arbouix (PMi) et Bézingrand (JIG) et 8/04 à Messanges (STi). Retours automnaux le 11/10 à Messanges (STi) avec des maxima de 30 individus en divers sites (divers obs.).

Grive draine *Turdus viscivorus* (d=312)

Premiers chants le 14/12 à Clarac (VDu) puis réguliers en janvier (divers obs.). Seule donnée de reproduction digne d'intérêt : transport de nourriture le 14/06 à Laruns à 1740 m d'altitude (SDu) pour des envols à partir du 28/05 (STi). En dispersion postnuptiale, 52 en deux groupes au col de Soulor le 23/10 (JIG) et 50 le 25/10 à Messanges (STi).

MUSCICAPINAE

Gobemouche gris *Muscicapa striata* (d=302)

Premiers, avec déjà 20 individus, le 27/04 à Messanges (STi) puis les 29/04 à Ustaritz (GoL) et 30/04 à Salles-Argelès (PMi) et à Biarritz (FCa). En période de reproduction, un couple cantonné en hêtraie à Osse-en-Aspe le 10/05 à 900 m d'altitude (SDu) et construction d'un nid le 26/05 à Momuy (SLe). Premiers migrateurs postnuptiaux le 12/08 à Bénéjacq (JIG), derniers les 6/10 à Puydarrieux (VDu) et 13/10 à Messanges (STi).

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* (d=1002)

En migration postnuptiale et début d'hivernage, jusqu'à 70 individus le long de la rive nord du lac Mouriscot-Biarritz (FCa) le 1/11 ; 11 oiseaux sur 1 km à Iparla le 29/11 (ANe). Début des chants le 23/01 à Aureilhan-65 (DRa) qui deviennent régulier à mi-février (divers obs.). Treize chanteurs sur 1 km le 13/03 à La Rhune (ANe). Un oisillon est trouvé mort le 25/04 à Ustaritz (GoL), nourrissage à Bidart le 4/05 (PhL) et le 2/06 à Saint-Jean-de-Luz (FCa), juvéniles fraîchement envolés le 4/05 à Ustaritz (GoL) et le 28/06 à Lescun à 1400 m d'altitude

(SDu). En migration postnuptiale, passage sensible dès mi-septembre (FCa) puis évident les 29 et 30/09 à Orx avec 20 individus et Messanges avec 50 individus (FCa, STi), atteignant un maximum fin octobre avec jusqu'à 80 oiseaux comptés à Anglet le 23/10 (FCa). Un itinéraire échantillon (Figure 4) réalisé à Montaner l'automne 2012 montre bien l'arrivée progressive des hivernants, avec un pic au 25/10 (FBa).

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (d=252)

Arrivées relativement tardives : 4/04 à Bénéjacq (CGr), 7/04 à Messanges et Villefranque (STi) ; dernier migrateur certain le 27/04 à Bilhères-en-Ossau (FDA). En période de reproduction, l'espèce est contactée sur 48 communes avec une seule donnée d'intérêt : des juvéniles juste volants le 4/06 à Garrosse (PUT). Premiers migrateurs postnuptiaux le 22/08 au lac du Gabas (JIG), derniers les 29/09 à Messanges (STi, FCa) et 30/09 à Ger (JIG). Donnée de montagne le 3/09 à Payolle (Campan, 1100 m), témoignant du passage de cette espèce très peu notée dans les vallées pyrénéennes (JIG).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (d=49)

Seulement 4 observations pré-nuptiales les 13/03 à Hendaye (AHG), 9/04 à Tarnos et 27/04 à Messanges (STi). En passage postnuptial, nombreuses données grâce au baguage, qui vont du 10/08 au 12/10 à Messanges (STi). Les sous-espèces *namnetum* et *cyanecula* (toutes deux à miroir blanc) ont été contactées, le passage de *namnetum* semblant plus précoce (STi, divers obs.). Une seule donnée provient de l'intérieur des terres, sur le lac de l'Ayguelongue le 10/08 (PhL). Voir l'article de Neto & Correia (*Ardeola*, 59 (2), 2012 : 309-315) qui révisé les paramètres biométriques permettant une identification automnale des taxons *namnetum* et *cyanecula* plus exacte qu'indiquée par la littérature existante.

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (d=272)

En migration pré-nuptiale, les observations vont du 21/04 à Aureilhan-65 (DRa) au 12/05 à Andrest (SPé). Aucune donnée en période de reproduction en 2012 pour cette espèce. Pre-



La réoccupation des territoires de montagne par le **Faucon crécerelle** est fortement dépendante des conditions météorologiques : des jeunes issus de pontes normales s'envoleront en août, tandis qu'en plaine des jeunes pourront s'envoler dans la première quinzaine de mai (photo J. BOUILLERCE).

Le stationnement prolongé d'un **Eider à duvet** dans la baie de Txingudi, du 29/07/2011 au 14/03/2012 aura permis d'observer, dans des conditions exceptionnelles pour notre région, l'évolution du plumage jusqu'à la livrée nuptiale arborée ici, à comparer à la photo du même individu publiée dans notre précédent volume (photo J. FERRÉ).





Coucou geai : lac du Gabas, du 27 au 30/08 (photo E. DUMAIN) ; **Sterne élégante** : embouchure du Courant d'Huchet, le 26/09 (photo J. FERRÉ) ; **Mouette atricille** : Capbreton, le 25/08 (photo S. TILLO).


L'installation au début des années 2000 d'un couple de **Faucon pèlerin** en basse vallée du gave d'Oloron peut constituer les prémices d'une colonisation de nouveaux territoires en zone de plaine : une attention particulière doit être accordée aux observations répétées d'adultes en période de reproduction (photo J. BOUILLERCE).





Huppe fasciée : les observations tardives et précoces ne sont pas rares mais l'hivernage n'est pas encore d'actualité dans notre région (photo P. NAVARRE).

Commune en montagne, la **Bergeronnette des ruisseaux** est plus localisée en plaine où elle développe une relative anthropophilie, occupant les canaux des villages, des moulins, lavoirs... (photo P. NAVARRE).



La dispersion juvénile précoce chez le **Martin-Pêcheur d'Europe** fait apparaître tôt en saison l'espèce dans des secteurs où elle ne niche pas, donnant la fausse impression d'une abondance élevée en période de reproduction (photo J. BOUILLERCE).

La **Pie-grièche écorcheur** est encore commune en montagne mais a fortement régressé dans les zones agricoles de plaine (photo S. HOMMEAU).





Le genre *Phylloscopus* est très bien représenté dans le bassin de l'Adour, tant en période de reproduction avec les Pouillots de Bonelli, siffleur, véloce et ibérique, qu'en période de migration avec les Pouillots à grands sourcils, les véloces nordiques ou orientaux (d'appartenance subsppécifique souvent incertaine - *collybita*, *abietinus*, *tristis* et leurs intermédiaires) et le fitis.

De gauche à droite et de haut en bas : **Pouillots de Bonelli**, **véloce** et **fitis** (photos S. TILLO), à **grands sourcils** (photo F. CAZABAN), **véloce** « type *tristis* » et **ibérique** (photos S. TILLO).



miers retours postnuptiaux les 30/07 à Aureilhan-65 (DRa) et 5/08 à Sère-Rustaing (FBa), avec des effectifs assez importants à partir de fin août (divers obs.) pour un maximum de 30 individus le 6/09 à Saint-Cricq-du-Gave sur quelques hectares (FCa). Un IKA réallisé à Montaner montre un fort passage du 31/08 au 10/09 avec un pic au 7/09 (FBa ; Figure 5). Derniers les 22/10 à Orx et 23/10 à Anglet (FCa). Observations automnales d'altitude sur les communes de Lescun à 1850 m (SDu) et de Laruns à 1863 m et 1920 m (PhL).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (d=328)

Premiers chants le 2/03 à Tostat (SPé) avec installation des nicheurs durant le mois de mars, en parallèle à des passages migratoires, tel ce groupe de 21 individus le 20/03 à Ossun (DRa). Construction de nids les 4/04 à Ogeu-les-Bains (JAs) et 9/04 à Lesperon (PUT) et col de Soulor (ANa), envols du 6/05 à Ustaritz (GoL) au 7/08 à Laruns à 1900 m d'altitude (DHa), montrant l'étalement de la reproduction de l'espèce avec deux pontes régulières et un décalage des envols selon l'altitude (divers obs.). À noter, 4 juvéniles le 21/08 au Pic d'Aule à 2338 m d'altitude (CIC). Les passages migratoires sont détectés courant octobre avec un maximum de 30 individus le 27/10 à Osse-en-Aspe (NeA).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (d=154)

En migration prénuptiale, premiers les 26/03 à Villefranque (GoL), 29/03 à Montaner (FBa) et 31/03 à Ger (JIG) pour un maximum de 6 individus le 27/04 à Messanges (STi) ; dernier le 18/05 à Trébons (DRa). En période de nidification, noté uniquement dans le département des Landes sur 9 communes (divers obs.) et dans les Baronnie (HLa). Nourrissage au Huchet le 12/06 (PLe / RNNCH). Premier migrateur postnuptial le 31/07 à Lescun (DHa) avec une observation à 1700 m à Gavarnie le 25/09 (CHo) ; derniers les 23/10 à Messanges (STi) et 25/10 à Oloron-Sainte-Marie (SHo).

Monticole de roche *Monticola saxatilis* (d=26)

L'espèce est notée en période de nidification de 600 à 2276 m d'altitude (divers obs.). Dans le cadre d'une étude de la biologie de reproduction de l'espèce, 8-9 couples ont été suivis en 2012 avec les résultats suivants : envols entre les 15/06 et 2/07 pour les premières pontes et le 31/07 pour une seconde ponte avec une moyenne de 3,5 juvéniles/couple (JIG, MGU, D. Boyer, PNa). Une nichée de 5 jeunes à l'envol, très peu fréquente, a été mise en évidence pour la seconde année consécutive (JIG). Dernier contact de l'année le 6/09 au col de Soulor (JIG, PNa, SDu).

Monticole bleu *Monticola solitarius* (d=16)

Premier contact avec l'espèce le 24/03 à Sare (ANe) avec nidification probable ainsi qu'à Itxassou et Bidarray (ANe). Présence d'un juvénile du 24 au 31/07 au dessus du col du Pourtalet, à 1900 m d'altitude, certainement en erratisme et provenant d'Espagne (JIG).

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (d=139)

Migrateurs postnuptiaux observés très tardivement les 9/11 à Lescar et 16/11 à Bougarber (PhL). Premiers prénuptiaux eux aussi tardifs les 22/04 à Aurensan (FBa), 27/04 à Messanges (STi) et Marsac (SPé) avec un maximum de 18 individus à Osse-en-Aspe le 29/04 (NeA). Dernier le 27/05 à Caupenne (FCa). Peu de données de reproduction : juvéniles volants les 28/06 à Osse-en-Aspe (MGU) et 7/07 au col de Soulor (SDu). Premiers migrateurs postnuptiaux les 10/08 à Montaner et 11/08 à Moulédous (FBa) pour un maximum de 20 individus à Ger le 22/09 (JIG). Derniers le 28/10 à Idron (EDu), Moumour (SHo) et Ger (JIG).

Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (d=521)

Premiers chants les 18/02 à Messanges (STi) et 23/02 à Clarac (FBa), construction de nid le 8/03 à Beccas (JmF), visite de site de nid le 16/03 à Abos (PhL), juvéniles volants observés à partir du 7/05 (STi) à Lesperon puis régulièrement en juin (divers obs.). Encore des juvéniles juste volants le 19/08 à Charre, issus d'une seconde ponte (SDu). L'espèce est toujours présente en altitude au col de Soulor à 1680 m (CIC, JIG), ainsi qu'au col du Pourtalet

à 1850 m (JIG), “queue” de distribution d'une petite population d'altitude en versant sud (Espagne).

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (d=246)
Des migrateurs postnuptiaux tardifs observés les 10/11 à Ustaritz (EDu) et 14/11 à Biarritz (ANe). Premiers retours printaniers les 24/03 à Tarnos (GoL), 1/04 à Onesse-et-Laharie (PUT) et Seignosse (FCa). Maximum de 50 individus le 27/04 à Tarnos (ANe), dernier le 26/05 à Castelsarrazin (PLe). En période de reproduction, nourrissages au nid le 26/06 au col d'Aubisque (GDu), puis des juvéniles volants observés de début juillet jusqu'au 7/08 (divers obs.). Premiers migrateurs postnuptiaux les 12/08 à Moulédous (FBa) et 19/08 à Ger (JIG) pour un maximum de 20 oiseaux à Uzein le 11/09 (PhL) ; derniers les 30/10 à Coussan (FBa) et 31/10 à Tarnos et Capbreton (JIG, ANe, JfG). Les opérations de baguage à Messanges ont permis de capturer 4 individus de la sous-espèce *leucorrhoea* ou Traquet du Groënland le 29/04 et les 15, 16 et 23/09 (STi *et al.*).

Traquet oreillard *Oenanthe hispanica**

PRUNELLIDAE

Accenteur mouchet *Prunella modularis* (d=406)

Premiers chants les 13/02 au lac de l'Ayguelonque (PhL) et 15/02 à Bénéjacq (JIG), puis juvéniles volants le 13/07 à Lescun à 1580 m d'altitude (SDu), seuls renseignements d'intérêt sur la reproduction de cette espèce, pourtant bien répartie ! Les localités rapportées montrent parfaitement l'amplitude altitudinale de cet accenteur : du niveau de la mer à 2031 m à Laruns (PhL, divers obs.). Un passage migratoire est sensible fin octobre pour un maximum de 30 individus le 29/10 à Moliets-et-Maa (PhL, STi, FCa).

Accenteur alpin *Prunella collaris* (d=50)

En hivernage, l'espèce est notée sur des sites du Pays-Basque où elle ne niche pas : Baïgoura à 750 m d'altitude (ANe), Béhorléguy à 1000 m (LGo), Iparla (AAn), Saint-Etienne-de-Baïgorry en 3 sites différents de 359 à 800 m d'altitude

(AAn, GoL). Un maximum de 30 individus est observé à Castet (Jaout, 1574 m) le 18/11 (PhL). En période de reproduction, premiers chants le 10/05 au col du Pourtalet (JIG), juvéniles volants les 31/07 à Estrémère (Laruns) (JIG) avec encore des nourrissages de juvéniles volants le 26/08 au lac de la Glère (Gavarnie) à 2700 m d'altitude (PMi), issus d'une seconde ponte selon toute vraisemblance.

PASSERIDAE

Moineau domestique *Passer domesticus* (d=501)

En hiver, 54 individus (33 mâles pour 21 femelles) capturés pour baguage à un dortoir à Morcenx le 18/11 (PUT) puis des groupes de 50 le 24/11 à Ustaritz (GoL) et de 55 à Aureilhan le 13/01, prenant un bain de poussière (DRa). En période de reproduction, premiers accouplements et construction de nid le 14/03 à Montaner (FBa) puis le 30/04 à Oloron-Sainte-Marie (NeA), juvéniles volants notés du 1 au 18/06 (PUT & divers obs.).

Moineau friquet *Passer montanus* (d=86)

Rassemblements hivernaux de 50 individus à Ustaritz le 18/02 (GoL) et de 20 à Labastide-Cézeracq le 16/03 (PhL). En période de reproduction, premiers chants le 13/04 à Morcenx (PUT), juvéniles volants du 8/06 au 5/08 (PUT, GoL). De début avril à fin juin, l'espèce a été notée sur 29 communes (divers obs.), montrant la forte diminution de ce moineau dans notre région.

Moineau soulcie *Petronia petronia* (d=10)

L'espèce est reportée des Hautes-Pyrénées, sur les communes de Lacassagne (FBa), Fréchou-Fréchet (FBa, CHo), Saint-Martin avec un maximum de 27 individus le 6/03 (JmF, DRa), Vielle-Adour (FBa) et du Gers à Miélan (FBa). Une observation au col du Pourtalet à 1800 m le 29//05 (JIG), peut-être indice d'une survivance de la petite population nicheuse des années 80-90 sur ce secteur.

Niverolle alpine *Montifringilla nivalis* (d=12)

En période de reproduction, construction de nid le 26/03 au Tourmalet (CHo) et confirmation de

la nidification de l'espèce à Larrau à (Orhy, 1817 m), point le plus occidental de la chaîne (FCa). Le comportement de remontée en altitude post-reproduction est également confirmé avec des observations de fin juillet et août à 2800 et 3000 m (P. Moreau, PMi).

MOTACILLIDAE

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (d=167)

Hivernage exceptionnel constaté à Plaiaundi avec un individu les 15/12 et 3/01 (ANe, JFe). Puis prémices du retour printanier à Orx le 10/02 (JFe), puis à Saint-Gein le 6/03 et à Hontanx le 10/03 (CIC). Le front de migration est plus large cette année avec des données régulières jusqu'en Bigorre comme à Clarac le 31/03 (VDu, FBa). Dernier contact d'un migrateur printanier le 2/06 (STi) et premiers retours automnaux les 13, 14 et 16/08 (FCa, STi, PhL). La sous-espèce *thumbergi* est contactée à Chelle-Debat le 3/05 (FBa), Messanges le 4/05 (STi), Saint-Martin-de-Seignanx le 17/09 (FCa) et Lescurry le 29/09 (FBa). La sous-espèce *iberiae* est rencontrée à Denguin le 15/04 (PhL, STi) et à Saint-Martin-de-Seignanx le 18/09 (FCa). Enfin, *flavissima* est notée le 29/04 à Biarritz (GoL), le 7/05 à Messanges (STi) puis les 17, 18 et 19/09 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (d=252)

Très commune sur les rivières du massif pyrénéen, plus dispersée et discrète sur les cours d'eau du massif landais ; les premiers jeunes volants sont observés dès le 28/04 à Arette (SDu) puis le 5/05 à Lesperon (STi). Une 2^{ème} ponte est signalée à Salles-Arzelès le 5/07 (PMi). En montagne, des individus sont vus au lac d'Arrémoulit (2250 m) et au lac du Lurien (2246 m) le 8/09 (PhL).

Bergeronnette grise *Motacilla alba* (d=840)

Des dortoirs de 200 et 322 oiseaux s'établissent le 27/11 à Biarritz (FCa) et le 22/12 à Anglet (PLe). Un pré-dortoir de 100 individus est également remarqué à Orleix le 27/12 (DRa), soulignant la tendance aux rassemblements nocturnes hivernaux en milieu urbain. D'autres

dortoirs sont remarqués à Ustaritz (GoL) ou Toulouze (PUT). La migration de printemps reprend en mars alors que les premiers chants sont signalés dès le 28/02 à Pau (PhL). Des transports de nourriture sont observés à partir du 29/04 à Moliets-et-Maa (STi) et du 30/04 à Bénéjacq (JIG) puis se généralisent jusqu'à la mi-juillet (divers obs.). 200 individus se rassemblent à Capbreton au passage postnuptial le 12/10 (FCa).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* (d=37)

Présente en hivernage du 1/11 au 13/03 sur 13 communes des Landes et du Pays basque avec de très faibles effectifs. Le seul rassemblement d'importance a été remarqué à Saint-Pée-sur-Nivelle le 11/01 avec 15 individus (PhL). Premier retour le 9/10 à Morcenx (PUT) puis le 15/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

Pipit de Richard *Anthus richardi* (d=29)

Contacté au passage automnal le 12/11 à Messanges (STi) et plus à l'intérieur à Saint-Sever le même jour (CIC). 3 à 6 individus hivernent ensuite sur l'aéroport de Biarritz du 14/11 au 3/03 au moins (ANe, FCa *et al.*). Une paire est observée à Itxassou le 25/01 puis 3 le 28/03 au même endroit, nouveau site d'hivernage probable (ANe). Des prospections en milieu favorable n'ont rien donné à Saubusse et à Rivières-Saas-et-Gourby (FCa). Les premiers retours automnaux ont lieu les 1/10 à Messanges (STi) et 13/10 à Pontonx-sur-l'Adour (CIC). Une halte signalée également à Montaner le 26/10 (FBa) : les oiseaux pourraient donc longer le piémont pyrénéen pour arriver ensuite sur les sites d'hivernage côtiers, où déjà 4 oiseaux sont observés à Biarritz le 31/10 (FCa).

Pipit rousseline *Anthus campestris* (d=49)

Retour à partir du 9/04 à Messanges (STi) ; dernier mouvement noté le 12/05 à Garrosse (PUT). Des comportements reproducteurs sont observés uniquement dans les Landes et pas seulement sur la dune : ainsi, noté à Escource, Lesperon, Luglon, Messanges, Moliets-et-Maa, Sabres, Solférino, Taller, Tarnos, Trensacq, Vert et Vielle-Saint-Girons (STi, PhL *et al.*). La

reproduction aboutit par exemple au Huchet avec 3 couples et des nourrissages le 26/06 (PLe / RNNCH), également à Solférino le 27/07, à Taller le 24/07 et Lesperon les 7/08 (STi) et 16/08 (PhL). La migration postnuptiale s'étend du 18/08 au 1/10 à Messanges (STi, PhL).

Pipit des arbres *Anthus trivialis* (d=478)

De retour à partir des 26/03 au Huchet (PLe / RNNCH) et 30/03 à Orist, Saint-Martin-de-Hinx et Garrosse (FCa, PUT). Migration et cantonnements se superposent, mais la reproduction commence réellement début mai : plaques incubatrices et protubérances cloacales sont notées à Messanges le 1/05 (STi) ; des transports de matériaux remarqués également à Bagnères-de-Bigorre (800 m) le même jour (VDu, FBa). Les premiers nourrissages apparaissent le 16/05 à Rion-des-Landes et les derniers sont notés le 24/07 à Taller (STi). Premiers mouvements postnuptiaux à Lescun (2421m) le 9/08 (SDu) ; la migration bat son plein courant août et septembre sur un large front (divers obs.). Dernier contact avec l'espèce le 24/10 à Messanges (STi).

Pipit farlouse *Anthus pratensis* (d=485)

La migration automnale dure jusqu'au 21/11 à Tarnos (FCa). Les hivernants sont plutôt disséminés et vus en faible nombre ; quelques regroupements apparaissent parfois : 50 sur l'aéroport de Biarritz le 10/12 (FCa), 25 à Ustaritz le 1/01 (GoL) ou 28 en dortoir à Magescq le 14/01 dans une lande à ajoncs et fougères (STi). La migration de printemps est décelée du 2/03 à Saint-Pierre-d'Irube au 29/04 à Ustaritz (GoL). Premier retour postnuptial le 14/09 à Moliets-et-Maa (STi). Le passage s'intensifie en octobre avec jusqu'à 150 à Tarnos le 8/10 (FCa) et à Messanges le 11/10 (STi), 200 à Anglet le 17/10 (FCa) et encore 120 le 18/10 à Messanges (STi).

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus**

Pipit maritime *Anthus petrosus* (d=8)

Présence d'un individu à la Barre d'Anglet du 21/12 au 9/01 au moins (GoL, STi). Un individu y sera revu le 21/09 (EDu) puis 2 le 19/10 (GoL).

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (d=212)

En hivernage, assez commun puisque contacté sur 48 communes du piémont ou de la plaine. Jusqu'à 70 sont décomptés sur les barthes de Saubusse le 10/12 (FCa), ou 130 au total sur les différentes Barthes de l'Adour de Tercis-les-Bains, Rivières-Saas-et-Gourby et Saubusse le 24/02 (FCa). Des hivernages sont constatés en altitude, par exemple à Gourette (1350 m), Izeste (1368 m) ou Laruns (1834 m) (PhL). En mars, la transhumance et les premiers chants d'altitude se font remarquer : 49 oiseaux en vol vers le Sud à Moulédous le 23/03 (FBa), un chanteur à Estérençuby le 25/03 (GoL). Premiers transports de matériaux le 26/04 à Sare (CIC) mais premiers nourrissages plus tardivement le 22/06 à Arette (STi) ou le 23/06 à Larrau (FCa). Le dernier jeune non encore émancipé est noté le 10/08 à Billères-en-Ossau (SDu). Retours en plaine à partir du 28/09 à Messanges (STi). Enfin, 17 sont observés établissant un dortoir à Clarac dans une lande à fougères le 25/10 (FBa), comme l'an passé.

FRINGILLIDAE

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* (d=1763)

En période postnuptiale, flux migratoire d'environ 2000 oiseaux/heure le 9/11 à Sare (ANe). Egalement 3000 ind. en migration active le 11/11 à Soustons ; derniers mouvements le 13/11 à Messanges (STi). La plus grosse troupe hivernale rassemble 700 oiseaux le 12/12 à Bassussarry (GoL). Premiers chants les 19/02 à Clarac (VDu), 20/02 à Montaner (FBa) et 21/02 à Saint-Pée-sur-Nivelle (GoL). La migration pré-nuptiale est détectée du 3/03 à Ustaritz (GoL) jusqu'au 1/04 à Seignosse (FCa). Concernant les preuves de reproduction certaine, elles s'étalent du 5/05 à Lesperon (transport de nourriture) (STi) au 1/09 à Villeneuve-de Marsan où 3 juv. à peine volants sont observés (CIC). Les premiers départs automnaux sont repérés le 13/10 à Sare (ANe). Forte migration le 17/10 à Anglet avec 22000 oiseaux dénombrés en 1h30 d'observation (FCa) !

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* (d=48)

Dernier migrateur certain le 13/11 à Messanges (STi). Contrairement à l'an passé, très peu d'observations hivernales, le plus souvent à l'unité. Derniers contacts les 18/02 à Saint-Martin-65 (DRa) et Messanges (STi). Retour automnal les 7/10 à Puydarrieux (VDu) et Lanne-en-Barétous (SDu), 10/10 à Moulédous (FBa) et 11/10 à Messanges (STi). Les 250 oiseaux observés le 26/10 à Osse-en-Aspe (NeA) et 200 à Moulédous le 30/10 (FBa) pourraient laisser présager un hivernage 2012/2013 plus conséquent.

Verdier d'Europe *Chloris chloris* (d=456)

Troupes modestes de 20 oiseaux les 24/11 à Ustaritz (GoL) et 25/11 à Ogeu-les-Bains (PhL). Premiers chants les 6/02 à Bours (SPé) et 14/02 à Bagnères-de Bigorre (ALe), jusqu'à une altitude comprise entre 1140 et 1450m sur la commune d'Accous (NeA). Gros rassemblement de 200 ind. le 29/10 à Moliets-et-Maa (PhL).

Serin cini *Carduelis serinus* (d=172)

25 oiseaux migrent encore à Messanges le 12/11 (STi). Premiers chants les 25/02 à Anglet (GoL), 1/03 à Sarniguet (SPé) et 2/03 à Laroin (JIG). La reproduction est avérée sur 7 communes. Elle débute le 7/05 avec un transport de nourriture à Bayonne (GoL), l'apparition des 1^{ers} juv. étant, quant à elle, notée le 10/05 à Morcenx (PUT). Rassemblement de 30 oiseaux le 17/10 à Messanges (STi).

Venturon montagnard *Carduelis citrinella* (d=27)

Des indices de reproduction certaine sont notés à Gavarnie avec des jeunes volants le 20/06 (CHo), Arette (1733 m) le 22/06 (STi) et Laruns (1834 m) le 30/06 (PhL). Observations atypiques en plaine les 12/11 et 7/07 à Messanges, impliquant à chaque fois 2 oiseaux en déplacement vers le Sud (STi, FCa). Dernier contact le 22/09 aux Eaux-Bonnes (SDu). Remarque taxinomique : Nguembock *et al.* (*Mol. Phylog. Evol.*, 51, 2009 : 169-181) proposent la création du nouveau genre *Chloroptila* pour les Venturons, au vu de leur originalité par rapport aux autres *Carduelis*.

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (d=432)

Derniers migrateurs le 20/11 à Vieux-Boucaules-Bains (coll. GOPA) Troupes hivernales de 100 oiseaux le 15/02 à Sanous (FBa), 61 le 14/01 à Bassillon-Vauzé (DRa, C. Afonso), etc. Chant hivernal le 21/12 à Morcenx (PUT), puis plus classiquement à partir du 23/02 à Ustaritz (GoL). Derniers migrateurs printaniers le 27/03 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL). Concernant la reproduction, un nid est fréquenté le 29/04 à Ustaritz (GoL). Les 1^{ers} jeunes sont observés les 26/05 à Labastide-Chalosse (SLe) et Bassercles (PLe). Rassemblement postnuptial de 310 oiseaux le 25/08 à Cazères-sur-Adour (CIC) et mouvements migratoires dès le 1/09 à Arbéost (MCh).

Tarin des aulnes *Spinus spinus* (d=251)

Derniers migrateurs le 16/11 à Capbreton (FBa, SPé). Maxima hivernaux n'excédant pas les 60 ind. les 15/01 à Soustons et 23/01 à Bégaar (STi). Un individu attardé vole vers le sud le 1/05 à Messanges (STi), puis des observations estivales les 25/06 à Puydarrieux (VDu) et 1/09 à Arette à 1200m (SDu). Le 30/06 à Labrit, un mâle très bruyant effectue deux allers-retours entre son lieu de nourrissage et le point précis d'une haie en bordure de ruisseau, dont un déplacement avec un bec bien garni en proies ! Cette observation, bien que non suivie ultérieurement, constitue la première preuve de reproduction de l'espèce pour le bassin de l'Adour (STi). Arrivées massives en automne : 200 oiseaux le 6/10 puis 3000 le 17/10 à Messanges (STi). Une femelle bagueée lors de l'hiver 2010-2011 à Morcenx est contrôlée le 23/01 sur cette même commune (PUT).

Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (d=257)

Dernières migratrices le 13/11 à Messanges (STi). En hiver, jusqu'à 110 le 5/03 à Rabastens-de-Bigorre (JmF). La migration printanière est détectée du 7/03 à Saubusse (FCa) au 7/05 à Messanges (STi). Premiers chants le 31/03 à Ger (JIG). L'espèce se reproduit avec certitude sur les communes de Ger (transport de nourriture le 11/05), Bielle (PhL), Vert, Solférino,

Pissos, Sabres, Morcenx (STi), Guéthary, Arbéost (FCa), Ascain (GoL) et Laruns à 2000m d'altitude (DHa). Un couple cantonné est contacté le 21/07 sur cette même commune à 2338 m (CIC). La migration postnuptiale débute le 16/09 à Messanges, où défilent environ 600 oiseaux le 17/10 (STi)

Linotte à bec jaune *Linaria flavirostris***

Sizerin flammé *Acanthis flammea / cabaret**

Un individu entendu le 31/10 à Anglet et un autre le lendemain à Villefranque (PhL, FCa) ; espèce très rarement contactée dans le bassin de l'Adour. Les précédentes observations sont d'octobre 2007 au col de Lizarietta (6 individus), de janvier 1989 près de Pau avec 10 oiseaux et de mars 1965 à Saint-Geours-de-Maremne. La méconnaissance des cris de vol de l'espèce explique la rareté des données d'observation pour ce sizerin qui doit être d'occurrence régulière à l'automne dans notre région, en compagnie de Fringillidés plus communs.

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* (d=49)

Une seule mention hivernale de 10 oiseaux le 13/12 à Osse-en-Aspe (SDu). Nourrissage de jeunes volants le 14/06 à Laruns à 1800 m (SDu). Des chants sont entendus le 7/08 à Ville-neuve-de-Marsan (CIC). 20 oiseaux les 1^{er} et 17/10 à Messanges (STi). L'espèce est contactée jusqu'à 2191 m d'altitude à Laruns le 30/06 (PhL).

Roselin cramoisi *Carpodacus erythrinus***

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (d=106)

Derniers migrants postnuptiaux le 13/11 à Messanges (STi). Jusqu'à 16 ind. le 28/11 à Osse-en-Aspe à 1400 m (SDu, GoL, STi). Chants les 1/03 à Castet et 7/03 à Ustaritz (GoL) et le 2/04 à Ascain (FCa). Des preuves de reproduction sont rapportées des communes suivantes : Onesse-et-Laharie, Commensacq, Sare, Luxey, Pissos et Labrit (STi), Cambo-les-Bains (GoL) et Lescun (DHa).

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (d=67)

40 oiseaux migrent le 11/11 à Soustons (STi). Comportements nuptiaux le 8/05 à Lévignacq (STi), nicheur probable le 12/05 à Osse-en-Aspe à 1270m (SDu) et une observation le 30/05 à Moliets-et-Maa (PLe / RNNCH). Premiers mouvements migratoires le 4/10 à Clarac avec 18 ind. (FBa) ; rassemblement de 50 oiseaux les 17 et 24/10 à Messanges (STi).

EMBERIZIDAE

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis*

Bruant lapon *Calcarius lapponicus**

Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos***

Bruant jaune *Emberiza citrinella* (d=151)

En hiver, 17 le 10/01 à Lacassagne et 20 le 17/01 à Saint-Justin (JmF). 1^{ers} chants les 7/03 à Bilhères-en-Ossau (SDu) et Lanne (JmF, DRa, FBa) et 16/03 à Retjons (STi). La première preuve de reproduction est notée le 22/06 à Arette puis ultérieurement à Lencouacq (STi), Alçay-Alçabéhéty-Sunharette (FCa), Arbéost à 1150m (SDu), Laruns (CIC), Ger (ANa) et enfin Lescun (DHa). Un couple est observé à l'altitude de 1880m à Laruns le 27/06 (SDu, LCa), l'espèce atteignant sur cette même commune 1920m le 9/09 (PhL).

Bruant zizi *Emberiza cirrus* (d=257)

Un groupe de 19 le 11/11 à Soustons (STi). Des chants automnaux et hivernaux sont régulièrement entendus à Aureilhan-65 du 15/11 au 16/02 (DRa), plus aléatoirement en quelques localités des Landes et des Pyrénées-Atlantiques (divers obs.). Des indices certains de reproduction sont relevés sur un total de 18 communes, du 15/05 à Solférino (STi) au 10/08 à Momas (PhL). Un couple cantonné à une altitude de 1049 m le 26/05 à Mendive (STi).

Bruant fou *Emberiza cia* (d=40)

Quelques communes de plaine accueillent l'espèce en hiver : Puydarrieux, Ogeu-les-Bains, Montaner, Bours, Clarac et Bénéjacq (divers obs.). L'espèce atteint l'altitude de 2000m le 13/11 aux Eaux-Bonnes (SDu, PNa). Chants le

23/05 à Arbéost (JIG), le 28/05 à Jarret (FBa) et le 7/06 à Louvie-Soubiron (SDu, JmT).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* (d=5)

En période de reproduction, toujours présent aux environs du col du Pourtalet (JIG, PhL, JpP, W. Raitière) avec 6 chanteurs le 16/06 et des nourrissages de juv. volants le 31/07 (JIG). En migration postnuptiale, contacté à Messanges à 7 reprises à partir du 26/08 (PhL, STi *et al.*), à Arbéost le 27/08 (FCa) et Cieutat le 29/08 (FBa). Derniers les 18/10 à Messanges (STi) et Peyrehorade (PLe).

Bruant nain *Emberiza pusilla***

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (d=238)

Des oiseaux en migration active sont observés jusqu'au 20/11 à Vieux-Boucau-les-Bains (SDu). En hiver, rassemblement de 120 ind. à Rabastens-de-Bigorre (FBa, DRa) et 130 à Bas-sillon-Vauzé (DRa, C. Afonso). Des chants et/ou des couples cantonnés sont notés à Pey (JIG, ANe), Saint-Etienne-d'Orthe (FCa), Messanges (STi) et Ustaritz (GoL). Contingents automnaux de 300 ind. le 17/10 à Messanges (STi), 200 le 28/10 dans les barthes de Soorts-Hossegor (FCa, STi, PhL) et autant le 29/10 à Moliets-et-Maa (STi, PhL)

Bruant proyer *Emberiza calandra* (d=110)

Troupe hivernale de 19 oiseaux le 3/12 à Campuzan (VDu). 1^{ers} chants les 19 et 20/03 à Lanne-65 (DRa, SPé) puis le 15/04 à Lagos (STi). La lande de Ger rassemble à elle seule un total de 20 chanteurs (coll. GOPA). Des transports de nourriture sont notés sur ce site les 29 et 30/07 (ANa).

Especies échappées de captivité (catégorie E de la *Liste officielle des Oiseaux de France*)

ANATIDAE

Cygne noir *Cygnus atratus* (d=25)

Des mentions uniquement à Saint-Sever (stationnement permanent d'1 individu, CIC), Montgaillard (1 les 21 et 31/08, CIC) et Orx (stationnement de 2 individus, divers obs.) ; aucune reproduction n'est constatée cette année.

Oie à tête barrée *Anser indicus* (d=2)

À l'unité les 9/05 et 22/05 au Huchet (PLe / RNNCH).

Canard des Bahamas *Anas bahamensis* (d=4)

De 1 à 3 individus sont signalés sur le lac de l'Ayguelongue, les 22/02, 6/04, 10/04 et 23/09 (PhL, JIG).

PSITTACIDAE

Perruche ondulée *Melopsittacus undulatus* (d=1)

1 le 9/09 à Messanges (GoL).