

Notes d'Ornithologie Pyrénéenne n° XIX Novembre 2012 à octobre 2013

Jean-Louis GRANGÉ, François BALLEREAU, Stéphane DUCHATEAU, Jean-Jacques HOURCQ,
Sébastien PÉRÈS, DOMINIQUE RAGUET & Patrice URBINA-TOBIAS
Rédacteurs pour le GOPA

La période considérée a été marquée par un hiver long et rude (enneigement exceptionnel en montagne) et un printemps exécrable (froid et pluie jusqu'à début juin) entraînant un retard de végétation de près de 3 semaines. Les conséquences ont été lourdes pour de nombreuses espèces qui ont eu des succès de reproduction bas, voire nuls, dont le Vautour percnoptère *Neophron percnopterus*, l'Aigle royal *Aquila chrysaetos*, la Caille des blés *Coturnix coturnix* ainsi que de nombreux passereaux sédentaires dont les premières pontes ont souvent échoué.

Parmi les espèces communes, certains faits méritent d'être relevés : hivernage record de 6524 Sarcelles d'hiver *Anas crecca* à Orx, effectif record de Milans noirs *Milvus migrans* migrateurs au col de Soulor, avec 54 753 individus comptés, jusqu'à 623 Spatules blanches *Platalea leucorodia* en stationnement à Orx début octobre, présence de la Perdrix rouge *Alectoris rufa* à l'étage alpin sur deux sites éloignés (individus en provenance d'Espagne selon toute vraisemblance) et reproduction du Crabier chevelu *Ardeola ralloides* dans les barthes de l'Adour.

Concernant les espèces occasionnelles, l'année 2013 a été relativement fructueuse avec les observations de Cygne chanteur *Cygnus cygnus*, Harelde boréale *Clangula hyemalis*, Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* (afflux automnal de 20-25 oiseaux), Vautour moine *Aegypius monachus* (4 individus différents), Aigle pomarin *Aquila pomarina*, Faucon sacre *Falco cherrug* (sous réserve d'homologation par le CHN), Chevalier stagnatille *Tringa stagnatilis*, Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*, Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus*, Coucou geai *Clamator glandarius*, Faucon crécerellette *Falco naumanni*, Faucon d'Eléonore *Falco eleonorae* (4 individus différents), Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*, Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* (5 individus différents), Fauvette orphée *Sylvia hortensis* (la 7^{ème} donnée depuis 1960 pour le bassin de l'Adour), Fauvette passerinette *Sylvia inornata* (2 chanteurs), Jaseur boréal *Bombycilla garrulus* (2 individus constituant les 8^{ème} et 9^{ème} données pour le bassin de l'Adour), Sizerin « flammé » *Acanthis flammea / cabaret* et Bruant lapon *Calcarius lapponicus*.

Deux espèces nouvelles pour le bassin de l'Adour et ses environs sont rapportées : le Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla* observé le 15 septembre à Mimizan (d'ores et déjà homologué par le CHN) et le Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni* noté le 28 septembre à Lécumberry (sous réserve d'homologation par le CHN).

Remarques taxinomiques : un changement important dans la position taxinomique des Falconidés est intervenu et leur nouveau placement se situe dorénavant après les Piciformes, les Accipitridés et les Falconidés ne constituant pas un groupe monophylétique. La Grue demoiselle est rattachée au genre *Grus* et devient donc *Grus virgo*. L'arrangement des Fringillidés est également modifié suite à des changements de genre de plusieurs espèces (Roselin cramoiisi, Serin cini, Tarin des aulnes) (références des articles originaux dans SANGSTER *et al.*, 2013. Taxonomic recommendations for Western Palearctic birds: ninth report. *Ibis*, 155 (4) : 898-907).

Suite à des changements taxinomiques récents dus à des erreurs d'identification des types ayant servi à la description de ces taxons, la Fauvette passerinette de l'ouest européen, se reproduisant en Afrique du Nord, Péninsule ibérique, S.E. de la France et extrême N.O. de l'Italie doit être nommée *Sylvia inornata* (*cantillans* étant réservé aux individus de l'Europe orientale, Sicile et Italie du sud et *moltoni* aux oiseaux des Baléares, Corse, Sardaigne et Italie du nord) (SVENSSON L., 2013. Subalpine Warbler variation and taxonomy. *British Birds*, 106 : 651-668).


Les noms des espèces soumises à homologation régionale en Aquitaine sont suivis d'un astérisque (*) ; ceux des espèces soumises à homologation nationale de deux astérisques (**).

Nous avons utilisé les appellations suivantes pour nommer les principaux sites ornithologiques : lac de l'Arrêt-Darré (commune de Laslades), Ger (« lande de Ger » sur les communes d'Ossun, Azereix, Ger et Ibos), lac du Gabas (Luquet, Gardères, Lourenties et Eslourenties-Daban), lac de l'Ayguelongue (Momas et Mazerolles, comprenant le plan d'eau amont creusé en 2011), Artix (« lac d'Artix » à Pardies et Artix), Biron (« Saligue aux Oiseaux » à Castétis et Biron), Huchet (Réserve Naturelle Nationale du Courant d'Huchet et ses alentours, sur les communes de Léon, Moliets-et-Maa et Vielle-Saint-Girons), Vieux-Boucau (lac marin de Port-d'Albret, sur les communes de Vieux-Boucau-les-Bains et Soustons), Étang Blanc (Seignosse, Soustons), Hossegor (lac marin d'Hossegor, sur les communes de Soorts-Hossegor et Seignosse), Orx (Réserve Naturelle Nationale des Marais d'Orx, sur les communes de Labenne, Orx et Saint-André-de-Seignanx), Plaiaundi (commune d'Irún) et baie de Txingudi (communes d'Hendaye, Irún et Fontarrabie).

Nous remercions tous les contributeurs à ces NOP, sans qui cette synthèse annuelle ne serait pas et espérons que vous continuerez à alimenter notre base de données par l'envoi régulier de vos observations.

Liste des observateurs

Aurélien ANDRÉ (AAn), Xavier BAILHES (XBa), François BALLEREAU (FBa), Antoine BILLERACH (ABi), Jacques BOUILLERCE (JBo), Stéphane BOUROVALI-ZADE (SBZ), Frédéric CAZABAN (FCa), Michel CHALVET (MCh), Claude CHARRON (CIC), Sébastien DUBOZ (SéD), Valérie DUCASSE (VDu), Stéphane DUCHATEAU (SDu), Emmanuel DUMAIN (EDu), Geoffrey DUPONT (GDu), Jacques FERRÉ (JFe), Jean-Marc FOURCADE (JmF), Jean-François GLEYZE (JfG), Luc GONZALES (LGo), Laurence GOYENECHÉ (GoL), Claude GRANGÉ (CGr), Jean-Louis GRANGÉ (JIG), Christian GUINCHAN (CGu), Alfredo HERRERO GORROTXATEGI (AHG), Stéphane & Rachel HOMMEAU (SHo), Charles HOPPER (CHo), Jean-Jacques HOURCQ (JjH), Didier LABAN (DLa), Guy LAFFERRÈRE (GLa), Geneviève LAULHÉ (GeL), Martin LE BOURGEOIS / Organbidexka Col Libre (MLB / OCL), Sophie LEBLANC (SLe), Paul LESCLAUX (PLe), Philippe MILCENT (PMi), Pierre NAVARRE (PNa), Alain NAVES (ANa), Alain NEAU (NeA), André NERRIÈRE (ANe), Alain PAGOAGA (APa), Sébastien PÉRÈS (SPé), Jean-Paul PIOUS (JpP), Dominique & Claudine RAGUET (DRa), Véronique RENAUDIN (VRe), Réserve Naturelle du Courant d'Huchet (RNNCH), Robert SMITH (RSm), Jean-Michel TISNÉ (JmT), Patrice URBINA-TOBIAS (PUT).



ANATIDAE

Cygne tuberculé *Cygnus olor* (d=118)

En hivernage, un maximum de 19 oiseaux à Bésingrand le 06/01 (ANA), 21 communes accueillant l'espèce. La reproduction est avérée cette année seulement à Artix (JIG, SDu, GDu) et Biron (JBo, SHo). Les premiers rassemblements postnuptiaux surviennent à Denguin dès le 17/07 avec 9 individus et à Artix tout proche le 31/07 avec 11 oiseaux (JIG).

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus**

Cygne chanteur *Cygnus cygnus (d=2)**

Deux contacts du même oiseau à Latrille et à Miramont-Sensacq le 11/01 (JIG, JpP).

Oie des moissons *Anser fabalis*

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus***

Oie rieuse *Anser albifrons* (d=6)

La halte migratoire automnale d'un seul individu est notée du 24/11 au 09/12 à Benquet (CIC) ; de même à Puydarrieux du 16 au 18/12 (DRa). Six oiseaux sont par la suite recensés à Orx du 03 au 17/01 (EDu, FCa).

Oie cendrée *Anser anser* (d=165)

Les effectifs automnaux sont irréguliers en rapport aux arrivées et départs des oiseaux sans dépasser la centaine d'individus par site (divers obs.). Les haltes sont surtout remarquées sur les sites côtiers de Saint-Martin-de-Seignanx, Orx ou Léon (divers obs. et RNNCH). L'hivernage prend place à partir du 14/12 avec par exemple 550 oies à Orx (FCa), 207 à Puydarrieux le 18/12 (DRa). Enfin, jusqu'à 1002 dénombrées le 17/01 à Orx (FCa). Les premiers mouvements printaniers sont observés à Biarritz le 06/02 (EDu), ainsi qu'à Rivières-Saas-et-Gourby, Saint-Martin-de-Seignanx, Tarnos, et Labatut jusqu'au 09/02 (FCa, PUT). 1752 oies sont comptées en halte migratoire à l'Étang Blanc le 09/02 (PLe, S. Darblade). Encore un vol de 160 le 12/03 à Léon (PLe / RNNCH). La reproduction est certaine à Artix (SDu), sur le lac de l'Ayguelongue (ANa), à Pontonx-sur-l'Adour (JFe) et Denguin (JIG). Premiers retours autom-

naux le 26/09 à Puydarrieux (VDu), et déjà 300 individus le 04/10 à Orx (JFe).

Bernache du Canada *Branta canadensis* (d=4)
Observée sur des étangs de Chalosse et du Tursan, à Benquet (CIC) et à Maurrin (FCa).

Bernache nonnette *Branta leucopsis* (d=1)

1 le 14/08 à Bayonne (ABi), certainement issue de captivité.

Bernache cravant *Branta bernicla* (d=20)

Observée seule ou par paire du 04/11 au 19/02 à Hendaye, Anglet, Tarnos et Soorts-Hossegor (divers obs.).

Bernache à cou roux *Branta ruficollis***

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca*

Tadorne casarca *Tadorna ferruginea*

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna* (d=18)

Un premier oiseau vu à Labenne le 14/12 (FCa), puis 4 à Puydarrieux 16/12 (DRa). Les Barthes de l'Adour accueillent en hivernage jusqu'à 6 individus à Pey et à Tercis-les-Bains, 5 à Rivière-Saas-et-Gourby (FCa). Quelques oiseaux hivernent également à Orx (divers obs.). La migration de printemps reprend le 15/02 avec un oiseau à Bassussarry (GoL), un autre à Tarnos le 23/02 (ANA). Remarquable observation de 4 individus en vol à Ger le 18/05 (ANA). Premier retour automnal décelé le 13/10 à Pontonx-sur-l'Adour (CIC).

Canard mandarin *Aix galericulata* (d=5)

Des observations en trois sites : à Ustaritz avec jusqu'à 16 oiseaux le 6/01 (GoL), sur le lac de l'Ayguelongue avec un mâle le 20/04 (ANa) et sur le lac de Léon avec 8 individus le 12/01 (O. Favreau / RNNCH). Contrairement à l'année passée, aucune preuve de reproduction n'a été rapportée dans ce dernier secteur.

Canard carolin *Aix sponsa*

Canard siffleur *Anas penelope* (d=102)

Les maxima hivernaux atteignent 150 oiseaux à Saint-Martin-de-Seignanx et Rivière-Saas-et-Gourby (FCa, GoL), 100 à Orx et 60 à Saubusse

(FCa). Les 4 derniers sont vus à Saint-Martin-de-Seignanx le 8/04 (FCa). Retour postnuptial le 13/09 à Plaiaundi (AHG), le 14/09 à Orx (JFe) et le 23/09 à Puydarrieux (VDu).

Canard à front blanc *Anas americana***

Canard chipeau *Anas strepera* (d=143)

En hiver, gros effectif de 894 oiseaux le 17/01 à Orx (FCa & RNN Orx). Ailleurs, 120 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 66 à Bours (SPé) et 61 à Artix (JIG) à la mi-janvier. Les premiers afflux printaniers sont détectés le 5/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Côté reproduction, notons un couple apparié le 25/04 à Plaiaundi (JFe), où l'espèce a niché, ainsi qu'un autre le 3/05 sur le lac de l'Arrêt-Darré (FBa) ; 2 individus notés le 2/07 à Ustaritz (LGo) n'étaient que de passage. Mouvements automnaux dès le 9/09 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* (d=166)

Concentration de 6524 oiseaux le 17/01 à Orx (FCa & RNN Orx), 1200 le 10/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 561 à Benquet le 9/12 (CIC), 363 le 12/01 sur le lac du Gabas (SPé, CGu, A. Torregrosa *et al.*), 302 le 13/01 à Lussagnet (CIC), 286 le 27/12 à Duhort-Bachen (PLe), etc. Un couple apparié est observé le 11/04 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG). Derniers contacts les 12/04 à Artix (SDu) et 16/04 à Pontonx-sur-l'Adour (JFe). Retour post-nuptial les 8/07 à Puydarrieux (VDu), 8/08 à Pontonx-sur-l'Adour et 11/08 à Artix (FCa). Un individu peu farouche le 24/09 à 2300 m d'altitude sur un laquet de la commune de Béost (SDu).

Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis***

Canard colvert *Anas platyrhynchos* (d=345)

Par rapport à l'an passé, effectifs hivernaux réduits de moitié sur la plupart des sites : 506 à Orx le 17/01 (FCa & RNN Orx), 200 à Saint-Martin-de-Seignanx le 13/11 (GoL), 181 à Léon le 15/01 (PLe / RNNCH), 150 sur le lac du Gabas le 22/11 (JIG) ainsi qu'à Renung le 11/11 (CIC), 187 à Bassillon le 12/01 (DRa), etc. Neuf communes apportent des preuves de reproduction : entre autres, Bours avec un accouplement le 26/01 (DRa), Biarritz avec deux nichées de 11

et 7 jeunes le 16/03 sur le lac de Mouriscot (FCa) ou Bayonne le 22/03 (GoL).

Canard pilet *Anas acuta* (d=60)

Présence hivernale de 472 oiseaux le 17/01 à Orx (FCa & RNN Orx), 100 le 20/02 puis 210 le 27/02 à Saint-Martin-de-Seignanx, signant là, l'arrivée probable de migrateurs printaniers (FCa). À l'unité ailleurs (divers obs.). L'espèce est présente jusqu'au 23/03 à Orx (FCa) et 24/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL). Retour postnuptial les 21/09 à Orx et 24/09 à Tarnos avec un oiseau en migration active sur l'océan (FCa). Le 19/10 à Saint-Jean-de Luz, 25 individus migrent au large (FCa).

Sarcelle d'été *Anas querquedula* (d=11)

Apparition printanière le 14/03 à Pontonx-sur-l'Adour (JFe), le 4/03 sur l'Etang Blanc (PLe), le 1/04 à Puydarrieux (VDu) et jusqu'au 24/04 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG). Retour postnuptial le 26/08 à Plaiaundi (AHG). Dernier contact le 20/10 à Puydarrieux (VDu).

Sarcelle à ailes bleues *Anas discors***

Canard souchet *Anas clypeata* (d=160)

En hiver, jusqu'à 935 à Orx le 17/01 (FCa & RNN Orx), 100 à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL), 71 à Cazères-sur-l'Adour (CIC), etc. Arrivées pré-nuptiales le 20/02 avec 200 oiseaux à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) ; encore 250 le 23/03 à Orx (GoL). Des observations sont effectuées en mai et juin sur le lac de l'Ayguelongue (ANa, JIG), à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et Saint-Etienne-d'Orthe (coll. GOPA), n'apportant cependant pas de preuve de nidification. Seule une observation de 4 jeunes volants accompagnés d'une femelle le 27/08 à Artagnan peut laisser augurer d'une reproduction sur ce site (FBa). Les effectifs augmentent à partir du 21/09 à Orx avec 200 oiseaux, puis 415 le 29/09 (FCa).

Nette rousse *Netta rufina* (d=15)

Observation hivernale d'un individu le 9/12 à Cazères-sur-l'Adour (CIC), puis 2 le 10/03 sur le lac du Gabas (GDU) et un possible mâle féral vu entre mars et mai à Artix (JIG). 7 oiseaux à Plaiaundi le 23/06 (AHG), puis de nouveau 1 à

Artix du 31/08 au 29/10, probablement le même qu'au printemps (ANa).

Fuligule milouin *Aythya ferina* (d=117)

Hivernage conséquent sur certains étangs et gravières des Landes : notamment 690 oiseaux le 27/12 à Cazères-sur-l'Adour et 398 le 12/01 à Labatut (FCa, PLe), 245 à Montgaillard-40 le 13/01 (CIC). Ailleurs, 170 à Artix le 27/12 (FCa, PLe), 98 à Benquet le 10/11 (CIC), 98 à Miramont-Sensacq le 11/01 (JIG, JpP) et 68 sur le lac de l'Ayguelongue le 3/01 (JIG). Des observations souvent à l'unité sont faites en mai et juin à Plaiaundi (AHG), sur les lacs de l'Ayguelongue (ANa, JIG), Vielleségure et Domezain-Berraute (FCa), et *a contrario* de l'an passé, sans reproduction avérée !

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris**

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Aucune observation de l'espèce sur la période considérée, celle-ci s'étant targuée l'an passé d'une dizaine de contacts !

Fuligule morillon *Aythya fuligula* (d=70)

En hivernage, 65 à Bours le 29/12, record pour le site (SPé), 60 à Artix le 9/02 (ANa) et 33 à Montgaillard-40 le 13/01 (CIC). Dernier le 9/04 à Artix (JIG). Retour postnuptial les 8/06 à Lahontan (PLe), 23/07 à Bours (DRa) et 31/07 à Artix (JIG).

Fuligule milouinan *Aythya marila*

Fuligule à tête noire *Aythya affinis***

Eider à duvet *Somateria mollissima* (d=1)

15 individus sont observés remontant vers le nord le 06/11 à Capbreton (RSm).

Harelde boréale *Clangula hyemalis (d=7)**

Un mâle de deuxième année hiverne du 15/01 au 26/03 sur la réserve du Courant d'Huchet (PLe & XBa, RNNCH).

Macreuse noire *Melanitta nigra* (d=61)

Mouvements automnaux d'importance le 06/11, avec 48 individus à Tarnos (EDu) et 100 à Capbreton (RSm) ; également 80 à Fontarrabie le 30/11 (AHG). L'espèce est très régulièrement

contactée en décembre-janvier puis s'absente en février et mars. Le passage printanier est marqué le 21/04 au large du Courant d'Huchet avec près de 40 oiseaux (coll. GOPA). Une attardée signalée le 29/05 à Capbreton (FCa). 15 oiseaux à Fontarrabie le 28/10 marquent ensuite les premiers retours automnaux (AHG).

Macreuse brune *Melanitta fusca* (d=2)

Deux seules observations : une le 24/11 à Anglet avec une trentaine de macreuses noires (ANa) et 2 le 04/12 à Capbreton en vol dans des directions opposées (SDu, STi, G. Blake).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

Harle piette *Mergellus albellus* (d=3)

Pour la 3^{ème} année consécutive, un individu est observé le 13/01 à Montgaillard-40 (CIC). Une femelle est notée à Cazères-sur-l'Adour le 09/12 (CIC) et une autre le 12/01 à Labatut (FCa, PLe).

Harle huppé *Mergus serrator* (d=15)

Les premiers sont vus à des dates classiques : 3 à Tarnos et 1 à Plaiaundi le 24/11 (ANa). Trois individus stationnent du 15/12 au 29/12 sur le lac d'Hossegor, puis 2 y demeurent jusqu'au 22/01 (divers obs.). Un individu est également observé les 12/12 et 20/01 à Anglet (FCa, J.C. Vignes). Les deux derniers apparaissent à Hendaye le 28/01 (EDu).

Harle bièvre *Mergus merganser* (d=5)

Données intéressantes montrant des mouvements proches entre lacs voisins : 3 hivernent du 02/01 au 03/02, d'abord sur le lac du Gabas puis sur celui du Louet (divers obs.).

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*

ODONTOPHORIDAE

Colin de Virginie *Colinus virginianus*

PHASIANIDAE

Caille des blés *Coturnix coturnix* (d=5)

L'année 2013 est réellement catastrophique pour cette espèce, avec seulement 5 mentions d'individus isolés du 09/06 au 29/09, provenant toutes de la lande de Ger (JIG, ANa, SPé). Les



La baie d'Hendaye est un excellent site pour l'observation des plongeurs, toutes les espèces pouvant y être vues, notamment l'**Imbrin**, de loin la plus commune (photo S. TILLO).

conditions météorologiques exceptionnellement pluvieuses du printemps en sont la cause probable.

Perdrix rouge *Alectoris rufa* (d=8)

L'espèce n'est signalée en période de reproduction qu'à Précilhon (SDu), Garein (CIC) et Monfaucon (SPé). Sur la commune de Laruns, un couple est observé le 20/05 à 1650 m d'altitude, dans la neige, près du col du Pourtalet (JIG) et une « compagnie » sauvage a également été signalée dans le secteur du Gourzy (*vide* SDu).

Lagopède alpin *Lagopus muta pyrenaica* (d=6)

En hiver, découverte de traces et crottes dans le massif de l'Ardiden (Luz-Saint-Sauveur) le 07/01 à 2500 m (JmT). Les autres mentions, s'étalant de juin à octobre, concernent les communes de Lescun, Etsaut, Laruns et Béost (JmT, SDu), à des altitudes comprises entre 2050 et 2550 m. La seule observation visuelle

correspond à un individu rencontré le 14/09 dans le massif de Sesques (JmT).

Grand Tétrás *Tetrao urogallus aquitanicus* (d=31)

Toujours aussi peu d'informations pour les Hautes-Pyrénées, où l'espèce n'est signalée qu'à Sireix (PMi) et Arrens-Marsous (SDu). Dans les Pyrénées-Atlantiques, 13 communes sont concernées, les données s'étalant de 1350 à 1750 m d'altitude (SDu, PUT, SHo).

Perdrix grise *Perdix perdix hispaniensis* (d=19)

La donnée la plus basse (1200 m) est obtenue le 18/04 à Oloron-Sainte-Marie (SDu) ; la plus élevée (2000 m) le 07/03 à Grust (PMi). Les autres communes de montagne d'où proviennent les observations sont Sireix, Salles (PMi), Arbéost (JIG), Laruns (SDu, CIC), Etsaut (SDu, PNa), Bedous, Aydius, Lescun et Sainte-Engrâce (SDu). Un individu est trouvé mort à Grust

(1750 m) le 7/03 (PMi). Malgré une reproduction très tardive consécutive aux conditions météorologiques adverses, la reproduction semble avoir été bonne (par exemple, 12 individus le 04/09 à Laruns, SDu).

Faisan vénéré *Syrmaticus reevesii*

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* (d=63)

Les premiers chants sont signalés le 4/04 à Sénac (DRa). Aucune nichée n'est observée cette année. Une nouvelle mention à 700 m d'altitude, le 14/09 à Arrodets-ez-Angles (GDu).

GAVIIDAE

Plongeon catmarin *Gavia stellata* (d=11)

Observé plutôt à l'unité du 02/12 au 21/04 sur différentes localités côtières : Tarnos, Capbreton, Hendaye, Biarritz et Moliets-et-Maa (divers obs.). 3 et 2 oiseaux sont en outre observés en vol le 4/12 à Capbreton (SDu, STi, G. Blake).

Plongeon arctique *Gavia arctica*

Plongeon imbrin *Gavia immer* (d=9)

Hivernage complet du 23/11 au 25/04 de plusieurs individus à Hendaye (divers obs.), avec un maximum de 4 oiseaux observés le 05/01 (APa, FCa).

PROCELLARIDAE

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* (d=1)

Donnée hivernale d'un cadavre dans les laisses de mer le 16/02 à Moliets-et-Maa (FCa).

Puffin cendré *Calonectris diomedea* (d=4)

Toutes les données proviennent de Capbreton, avec 14 individus observés le 01/11 lors du passage d'automne, puis 1 les 25 et 29/05 (FCa).

Puffin majeur *Puffinus gravis* (d=2)

29 individus sont observés lors d'une séance de 6 heures de « seawatching » face à Capbreton le 01/11 (FCa), puis un individu le 03/11 depuis la digue de Tarnos (ANa).

Puffin fuligineux *Puffinus griseus* (d=6)

Une donnée de l'automne 2012, le 01/11 avec 17 individus au large de Capbreton (FCa) ; puis des données d'octobre 2013 lors du pic de migration dans le Golfe de Gascogne, lors des sorties en mer conduites par la LPO les 12 et

Passé la migration d'automne où des défilés de plusieurs centaines d'individus peuvent être observés, il est difficile d'estimer les effectifs de **Fou de Bassan** naviguant le long de nos côtes : les observateurs relèvent généralement quelques dizaines d'oiseaux, avec parfois des pics hivernaux de quelques centaines d'individus (photo F. CAZABAN).





L'essentiel des effectifs de **Puffin des Baléares** évoluant dans le Golfe de Gascogne se répartissent surtout au nord de notre région, mais des groupes de quelques centaines d'individus sont parfois observables à proximité du rivage, depuis le Cap Figuiet notamment ou la digue de Tarnos (photo F. CAZABAN).

19/10 (CIC, GoL, FCa) ou depuis le Cap Figuiet le 28/10 (AHG), pour un cumul de quelques dizaines d'oiseaux.

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* (d=3)

Toujours peu d'observations de ce puffin depuis nos côtes : 3 notés le 01/11 à Capbreton puis 2 l'automne suivant le 19/10 au large de Saint-Jean-de-Luz (FCa).

Puffin Yelkouan *Puffinus yelkouan (d=1)**

Un individu est observé lors d'une sortie en mer le 12/10 au large d'Hendaye (GoL), sous réserve d'homologation car il s'agirait de la première mention de l'espèce au large de nos côtes.

Puffin des Baléares *Puffinus mauretanicus* (d=17)

La migration d'automne court jusqu'à la mi-décembre, un ind. noté à Capbreton le 17/12 (coll. GOPA) ; quelques erratiques notés le printemps suivant (fin mai) sur ce même site (FCa). Les mouvements automnaux reprennent le 07/08 à Moliets-et-Maa et s'intensifient jusqu'en octobre avec, par exemple, 280 oiseaux le 19/10 à Saint-Jean-de-Luz (FCa).

Puffin de Macaronésie *Puffinus baroli***

HYDROBATIDAE

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus* (d=4)

Deux observations printanières les 19 et 25/05 à Tarnos et Capbreton pour quelques individus (FCa), puis deux d'automne à Moliets-et-Maa : 6 le 29/09 et 1 le 05/10 (JFe).

Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa*

SULIDAE

Fou de Bassan *Morus bassanus* (d=51)

C'est l'espèce pélagique la plus observée depuis nos côtes, avec des maxima en automne et en hiver : 300 le 01/11 à Capbreton (FCa) ou 97 le 20/01 à Ciboure (GoL).

PHALACROCORACIDAE

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (d=436)

En début d'hivernage (mi-novembre), des rassemblements importants sont notés : 280 à Saint-Sever, 300 à Benquet (CIC). Les dortoirs comptés à mi-janvier regroupent 332 individus à Orx (FCa), 104 à Léon (RNNCH), 95 à Artix, 121 à Orthez (coll. GOPA), 24 à Baudreix



Reproduction réussie du **Crabier chevelu** dans les barthes de l'Adour à Saint-Etienne-d'Orthe (photo J.-M. FOURCADE).

(CGu), 50 à Hendaye (FCa) et 63 à Ustaritz (GoL). En période de reproduction, premiers accouplements le 23/02 à Hossegor (ANa), déjà 22 nids en construction début mars à Artix (JIG, FCa) pour 86 nids dénombrés le 12/04 (SDu) avec des juvéniles encore au nid le 19/07 (JIG). Deux autres sites de reproduction existent : Orx avec 8 nids le 23/03 (FCa) et Mimizan avec un seul nid dans une héronnière (FCa). Premiers migrateurs postnuptiaux le 21/09 à Capbreton (FCa).

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* (d=19)

L'espèce se reproduit toujours à Hendaye avec au moins 3 nids le 01/05 (AHG). Elle est notée également à Urrugne le 23/11 (GoL), Ciboure (FCa, GoL) et Biarritz le 10/09 (FCa).

ARDEIDAE

Butor étoilé *Botaurus stellaris* (d=6)

Trois individus sont recensés les 11 et 12/01 sur les étangs Blanc et d'Hardy à Seignosse, site d'hivernage régulier (SLe, JfG). Ailleurs, des isolés les 23/12 à Biarritz (FCa), 6/03 à Léon (PLe / RNNCH) et 26/06 à Sainte-Marie-de-

Gosse (SéD), remarquable donnée en période de reproduction.

Blongios nain *Ixobrychus minutus* (d=1)

Deux individus sont observés le 4/09 à Messanges (FCa), site où le Blongios s'est de nouveau reproduit en 2013. Un individu chanteur a également été entendu le 8/07 sur le lac d'Orthez (SHo, JBo).

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* (d=52)

En hivernage, 1 à Saint-Laurent-de-Gosse, 13 à Labatut et 25 à Orthez le 12/01 (FCa, PLe, JBo, SDu). On compte au moins 5 nids à Mimizan, 40 à Souprosse, 1 à Heugas, 32 à Saint-Etienne-d'Orthe (FCa), 22 à Urt tardivement occupés (GoL, FCa) et au moins 16 à Artix où le dénombrement est incomplet (SDu). Une nouvelle colonie s'installe sur le lac d'Orthez/Biron (héronnière mixte), avec 36 nids le 28/06 (PLe).

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* (d=21)

Un couple s'est reproduit en 2013 au sein de la héronnière de Saint-Etienne-d'Orthe, produisant au moins un jeune (FCa). Ailleurs, 1 à 2 individus sont signalés en divers sites entre le 3/05 à Puydarrieux (VDu) et le 25/08 au lac de l'Ayguelongue (ANa).

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* (d=194)

Forte baisse des effectifs hivernants, conséquence de la vague de froid de février 2012 : de décembre à février, au maximum 558 individus en dortoir à Ustaritz (GoL), 150 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 405 à Orthez (JBo, SDu), 210 à Navarrenx (JBo), 46 à Oloron-Sainte-Marie (SDu), 410 à Baudreix (CGu), 187 à Bours, 103 à Horgues, 100 à Vidou et 7 à Puydarrieux (DRa). Le dortoir d'Artix est totalement déserté ! Les colonies de reproduction comptent au moins 175 nids à Urt, 70 à Saint-Etienne-d'Orthe, 5 à Heugas, 29 à Souprosse, 8 à Mimizan (FCa), 139 au lac d'Orthez, nouveau site (PLe) et 4 à Miélan (DRa).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* (d=398)

Les dortoirs hivernaux (décembre-janvier) regroupent 62 individus à Saint-Martin-de-Seignanx, plus de 50 à Saint-Etienne-d'Orthe (FCa), 28 à Orthez (SDu, JBo), 13 à Artix (JIG,

JjH), 13 à Oloron-Sainte-Marie (SDu), 7 à Bours et 1 à Vidou (DRa). Pas moins de 120 individus rejoignent le dortoir de Saint-Martin-de-Seignanx le 20/02, indiquant probablement l'arrivée de migrateurs (FCa). Comptages aux colonies de reproduction : 12 nids à Urt (GoL), au moins 5 à Saint-Etienne-d'Orthe, 30 à Heugas (FCa) et 5 au lac d'Orthez (nouveau site, PLe). Au passage postnuptial, regroupement de 130 individus le 17/08 à Plaiiaundi (AHG) et départ crépusculaire en migration d'un groupe de 42 individus le 21/09 à Orx (FCa). Un vol de 17 migrateurs postnuptiaux le 30/09 à Anglet (FCa).

Grande Aigrette *Ardea alba* (d=222)

L'espèce a été moins abondante qu'au cours de la période précédente, avec une présence rapportée sur 70 communes du bassin de l'Adour. Les dortoirs de Saint-Martin-de-Seignanx (jusqu'à 9 individus le 31/01, FCa), Orthez (9 le 12/01, SDu, JBo) et Artix (22 le 17/01, JjH, JIG) rassemblent les plus gros effectifs. Le passage pré-nuptial est décelé par la présence de 12 individus le 16/02 au dortoir d'Ustaritz, qui n'en comptait qu'1 à 4 au cours de l'hiver (GoL). Pas d'indice de reproduction, si l'on excepte la présence printanière de quelques individus en plumage nuptial à Orx, Saint-Martin-de-Seignanx et Rivière-Saas-et-Gourby (FCa) ; seulement 9 mentions ont été obtenues du 15/04 au 29/06.

Héron cendré *Ardea cinerea* (d=408)

Déjà 12 nids sont occupés le 24/12 à Ayros-Arbouix (GDu) et 5 le 12/01 au lac d'Orthez, avec couvain (SDu, JBo). Comptages aux colonies : au moins 5 nids à Mimizan (FCa), 10 à Léon (PLe, RNNH), 41 à Orx, 43 à Saint-Martin-de-Seignanx, 3 à Sainte-Marie-de-Gosse, 23 à Saint-Etienne-d'Orthe, 8 à Orist, 42 à Heugas, 34 à Souprosse, 10 à Bordères-et-Lamensans (FCa), 9 à Labatut (PLe), 61 à Artix (SDu), 2 au lac de l'Ayguelongue (nouveau site), 5 à Rontignon (JIG) et 34 à Ayros-Arbouix (GDu). Des individus en migration postnuptiale sont signalés les 16/08 et 6/10 (de nuit) à Anglet (FCa).

Héron pourpré *Ardea purpurea* (d=44)

Les premiers individus sont observés les 30/03 au lac de l'Arrêt-Darré (FBa) et 11/04 à Momas (JIG) ; au passage postnuptial les dernières mentions sont du 26/09 à Pontonx-sur-l'Adour (JFe) et du 29/09 avec 6 individus à Messanges (FCa). Aucune reproduction n'a pu être observée cette année, malgré une présence en juin sur certains sites adéquats : Orx, Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), Saint-Etienne-d'Orthe (coll. GOPA), Bours et Miélan (DRa).

CICONIIDAE

Cigogne noire *Ciconia nigra* (d=41)

Premières mentions précoces les 16/02 à Peyrehorade (PLe) et 28/02 à Hasparren (ABi), puis le 3/03 à Ustaritz (GoL). Pas moins de 174 migrateurs (dont un groupe de 62) sont dénombrés le 4/03 à Briscous (SéD) ! Le passage pré-nuptial s'achève par les observations du 6/05 à Bénéjacq (CGr) et du 27/05 à Bernadets-Dessus (FBa). Deux individus sont observés à Sainte-Marie-de-Gosse les 16, 25 et 26/06, laissant planer le doute sur une éventuelle tentative d'installation d'un couple (SéD & coll. GOPA). Premiers migrateurs postnuptiaux les 4/08 au col de Soulor (SDu, MLB) et 6/08 à Aureilhan-65 (DRa) ; dernier le 24/10 à Peyrehorade (PLe).

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (d=255)

En hivernage (15/11 au 15/01), l'espèce est signalée sur 12 communes (principalement : marais d'Orx, barthes de l'Adour et décharge de Saint-Pée-sur-Nivelle), en groupes avoisinant les 50 individus sur plusieurs sites (divers obs.). Des individus en migration pré-nuptiale sont observés du 28/01 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) au 14/04 (seulement) à Ger (coll. GOPA), avec des groupes de 100 le 16/02 à Ustaritz et le 1/03 à Guiche (GoL). On dénombre au moins 1 nid à Orx, 16 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 2 à Urt (GoL), 5 à Guiche, 2 à Sames (ANa), 15 à Saubusse (JFe), 12 à Heugas (FCa), 2 à Pontonx-sur-l'Adour (JFe), 1 à Bordères-et-Lamensans (FCa) et 1 à Artix (JIG). Premiers migrateurs postnuptiaux le 16/07 à Hibarette (CHo). La décharge de Saint-Pée-sur-Nivelle, site de stationnement majeur, accueille jusqu'à 300 individus le 6/08 et 130 le 12/09 (AHG). De

grands groupes en migration ou en stationnement sont également signalés à Ahetze (255 le 23/08, FCa), Ger (40 le 25/08, ANa) ou Morcenx (37 se posent pour la nuit le 3/09, PUT).

THRESKIORNITHIDAE

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* (d=18)

Un individu fréquente les barthes de Saint-Martin-de-Seignanx du 29/11 au 12/03 (ABi, FCa *et al.*). Un petit afflux se produit à l'automne, avec 16 juvéniles sur le lac de l'Ayguelongue le 26/09 et 1 le 30/09 (JIG), 6 le 2/10 à Oloron-Sainte-Marie (SHo), 2 le 2/10 et 1 le 3/10 sur le lac du Gabas (PNa, JIG) et 9 individus à partir du 17/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus*

Deux individus en « migration » sont observés le 31/08 col de Soulor (MLB / OCL).

Spatule blanche *Platalea leucorodia* (d=124)

Un individu est observé tardivement le 24/11 à Benquet (CIC). L'hivernage concerne surtout le marais d'Orx (maximum de 31 le 17/01, FCa) et les barthes de l'Adour, notamment à Saint-Martin-de-Seignanx (jusqu'à 30 individus le 30/11, JFe), Saint-Etienne-d'Orthe (2 le 9/01, FCa) et Rivière-Saas-et-Gourby (25 le 5/02, FCa). La migration prénuptiale, sensible dès le 22/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), s'étale jusqu'au 25/04 à Plaiaundi (JFe). La reproduction concerne au moins 3 couples à Orx, 5 à Saint-Martin-de-Seignanx et 1 à Heugas (FCa), avec une suspicion à Saint-Etienne-d'Orthe où une spatule rejoint la héronnière le 15/04 (coll. GOPA). Du passage postnuptial, nous retiendrons surtout les effectifs record ayant stationné à Orx en raison de niveaux d'eau favorables : 450 les 21 et 29/09 (FCa) et jusqu'à 623 le 3/10 (PLe) ! Deux mentions bien à l'intérieur des terres, les 3/10 sur le lac du Gabas (JIG) et 6/10 avec 3 individus à Artix (ANA).

PHOENICOPTERIDAE

Flamant rose *Phoenicopterus roseus*

PODICIPEDIDAE

Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis* (d=155)

En hiver, Bours demeure le bastion de l'espèce, avec 118 oiseaux le 29/12, maximum jamais atteint jusqu'à ce jour (SPé). Ailleurs, 50 à Artix le 27/12 (PLe, FCa), 25 à Plaiaundi le 29/11 (FCa, L. Goutaudier), 25 à Cazères-sur-l'Adour le 11/11 et 28 à Montgaillard-40 le 9/12 (CIC). Un accouplement est noté le 23/03 à Orx et 4 nids sont trouvés le 2/04 à Thétiou (FCa). Des jeunes non volants sont repérés les 2/08 au lac d'Estaing (1200 m) (DRa), 5/08 à Losse (FCa), 18/08 à Castet alors qu'un oiseau couve (SDu) et 9/09 sur le lac de Soum à Arbéost (1500m) (JIG).

Grèbe huppé *Podiceps cristatus* (d=220)

Maxima hivernaux de 71 oiseaux le 29/12 sur le lac du Gabas (GDu), 52 sur celui de l'Ayguelongue le 3/01 (JIG), 41 à Sère-Rustaing le 2/12, 44 sur le lac d'Orthez le 12/01 (SDu, JBo), 40 à Bours le 2/02 (SPé), etc. Concernant la reproduction, premières parades à Bours le 14/02 (SPé) et construction d'un nid le 5/03 à Artix (JIG). L'espèce est également nicheuse à Orx (JFe), Vielleségure, Castetner (FCa), Biron (SHo, JBo), sur le lac de l'Ayguelongue (ANA, JIG, SDu) et sur celui du Gabas (JIG). Les premiers jeunes sont vus le 10/06 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG). 80 à Orx le 21/09 (FCa).

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* (d=22)

Présent en hiver à Cazères-sur-l'Adour avec 9 oiseaux le 9/12 (CIC), à Montgaillard-40 (CIC), en baie de Txingudi (GoL, JFe) et sur le lac de Mouriscot à Biarritz (FCa). L'hivernage se poursuit jusqu'au 20/03 à Cazères-sur-l'Adour avec encore 6 ind. (FCa). Retour le 23/07 à Puydarrieux (VDu) et le 11/08 à Cazères-sur-l'Adour (CIC).

ACCIPITRIDAE

Bondrée apivore *Pernis apivorus* (d=91)

Les premières bondrées sont observées les 15/04 à Pey (coll. GOPA), 1/05 à Ger, 4/05 à



Effectif exceptionnel de 54753 **Milans noirs** en migration au col du Soulor, avec notamment 9577 individus pour la seule journée du 04 août 2013 (photo P. NAVARRE).

Bénéjacq (JIG) et Vic-en-Bigorre (FBa). Les données de migration pré-nuptiale s'étalent jusqu'au 24/05 à Bénéjacq (JIG). Des parades sont observées du 20/05 à Antist (DRa) au 15/08 à Osse-en-Aspe (GeL, SBZ). Premiers migrants postnuptiaux les 22/07 au col d'Organbidexka (GDu) et 4/08 au col de Soulor (SDu & OCL) ; dernière mention le 7/10 sur ce site (JIG), franchi par 540 individus le 30/08 pour un total de 6592 individus jusqu'au 8/09, date de fin du suivi (coll. OCL & GOPA).

Élanion blanc *Elanus caeruleus* (d=201)

Sa présence est rapportée cette saison sur 95 communes du bassin de l'Adour. Un dortoir de 20-25 élanions est découvert le 6/12 à Gensac et un autre de 13 individus le 29/01 à Ansost (DRa). Pour ce qui est de la reproduction, la couvaison est observée dès le 11/03 à Labastide-Monréjeau (JIG) et un jeune récemment envolé est encore noté le 9/08 à Hastingues (SéD). La

compilation de l'ensemble des données disponibles donne un effectif minimal de 106 couples cantonnés dans le bassin de l'Adour en 2013 (F. Delage, comm. pers.).

Milan noir *Milvus migrans* (d=424)

Un seul individu est signalé au cœur de l'hiver, le 27/12 au lac du Gabas (EDu). Des migrants pré-nuptiaux précoces survolent déjà Pau les 18 et 23/01 (JjH), Arcangues le 20/01 (LGo), Mouguerre le 24/01 (ABi) et Biarrotte le 28/01 (FCa) ; les derniers (très tardifs) le 3/06 à Laruns (JIG), avec au maximum 507 individus de passage le 6/03 à Bénéjacq (JIG).

Un individu réoccupe son site de reproduction dès le 27/02 à Bordères-sur-Echez, un couple transporte des matériaux pour le nid le 2/03 à Lanne (DRa) ; des accouplements sont signalés entre le 16/03 à Sarniguet (SPé) et le 7/04 à Tournay (FBa). Une ponte de 2 œufs est notée dès le 25/03 à Salles (PMi). De grands rassem-

blements en fin de période de reproduction sur les décharges : 200 à Saint-Pée-sur-Nivelle les 24/06 (FCa) et 12/07 (LGo), 400 à Saint-Martin le 25/06 (DRa).

La migration postnuptiale débute dès le 25/06 au col du Pourtalet (JIG) ; elle se termine le 7/10 à Accous (SDu) comme au col de Soulor (JIG). Sur ce site, un suivi effectué par l'association OCL en collaboration avec le GOPA (période du 15/07 au 8/09) a permis de dénombrer un effectif « historique » de 54753 migrateurs postnuptiaux, avec un maximum de 9577 le 4/08 (MLB / OCL *et al.*). Un groupe de 430 individus survole le pic de Madamète (Luz-Saint-Sauveur, alt. 2600 m) le 9/08 (FBa).

Milan royal *Milvus milvus* (d=449)

Des migrateurs postnuptiaux sont signalés jusqu'au 11/11 à Cazères-sur-l'Adour (CIC). Dortoirs de 25 hivernants à Argelès-Gazost le 8/12 (PMi) et 21 à Barbazan-Dessus le 8/01 (DRa) ; à noter un individu leucique le 14/02 à Montaner (FBa). Les premiers milans en migration sont signalés le 3/02 à Larressore (GoL) puis le 20/02 à Bénéjacq (JIG), le passage se poursuivant jusqu'au 15/04 à Saint-Martin-de-Hinx (SDu).

Pour ce qui est de la reproduction, des parades sont observées dès les 1/03 à Viger (DRa) et 2/03 à Ibos (ANa), puis la couvaison est constatée les 18/04 à Ayros-Arbouix et 23/04 à Ouzous (PMi). Pour 15 couples recensés sur une zone échantillon de 90 km² autour de Saint-Jean-Pied-de-Port, seulement 6 jeunes ont été élevés en 2013 (AAn / Saiak). En migration postnuptiale, premiers très précoces le 2/08 au col de Soulor (SDu, MLB / OCL), avec un maximum remarquable de 438 individus le 7/10 sur ce site (JIG).

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla**

Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* (d=45)

En 2013, pour 8 couples cantonnés dans les Pyrénées-Atlantiques on constate 7 pontes et l'envol de 5 jeunes ; dans les Hautes-Pyrénées, les 13 couples présents déposent 13 pontes ne produisant que 6 jeunes à l'envol (source : *Cir-*

culaire du Réseau Casseur d'os, n°64). Le transport de laine pour la construction du nid est observé du 1/11 à Arbéost au 8/01 à Sainte-Engrâce (SDu, JmT).

Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* (d=81)

Premières apparitions le 10/03 à Agos-Vidalos (DRa) et Bénéjacq (JIG). En piémont, pas moins de 35 observations à Bénéjacq du 10/03 au 6/09, concernant au moins 4 individus différents dont un subadulte du 9 au 26/05 (JIG, CGr). Des observations également à Puydarrieux (VDu), Cieutat, Pouzac, Trébons (DRa, FBa), Ger (coll. GOPA), Labatmale (JIG), Poey-d'Oloron (SLe) et Esquiule (FCa). En 2013, 57 couples sont recensés dans les Pyrénées occidentales (12 dans les Hautes-Pyrénées, 26 en Béarn et 19 en Pays Basque), produisant seulement 24 jeunes à l'envol (source : E. Kobierzycki / LPO Mission Rapaces). Encore un juvénile à Urrugne le 31/10 (MLe / OCL).

Vautour fauve *Gyps fulvus* (d=246)

50 mentions en plaine et piémont (divers obs.), dont certaines dans les Landes : une vingtaine à Saint-Laurent et Sainte-Marie-de-Gosse le 23/04 (FCa, JIG, SDu) et un juvénile qui se pose sur un toit du village d'Arengosse le 5/10 (PUT). Accouplement, construction de nids et couvaison le 17/02 sur la colonie du Pibeste (DRa) ; un jeune est encore non volant le 14/09 près du col de Soulor (ANa). Le suivi d'une colonie sur le secteur d'Iparla a permis de mesurer un succès reproducteur de 0,44 jeune par ponte déposée (AAn / Saiak). Un individu observé le 10/07 à Laruns avait été marqué le 4/10/2011 à Zanduetta en Navarre (SDu).

Vautour moine *Aegypius monachus (d=4)**

Un individu est observé le 10/05 à Arreau (J.C. Alberny), un est photographié le 18/05 sur la commune d'Accous (D. Melet /PNP), un fin mai / début juin à Hasparren (I. Elosegui fide LGo) et un juvénile observé du 20 au 22/08 au col de Soulor (MLB / OCL & JIG).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* (d=89)

Les premiers individus sont observés les 5/03 à Asté (DRa), 9/03 à Cauneille (PLe) et 19/03 à Vic-en-Bigorre (FBa) et Léon (PLe), un migrateur prénuptial étant encore signalé le 16/04 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL). Un individu poursuit longuement un congénère le 15/04 à Saint-Martin-de-Hinx (FCa, SDu). Bien qu'aucune reproduction n'ait été suivie cette année, on peut supposer que les conditions météorologiques du printemps ont eu un fort impact négatif sur cette espèce. Les premiers migrateurs postnuptiaux sont observés précocement le 27/07 au col de Soulor (SDu, MLB) puis le 15/08 à Bénéjacq (JIG). Dernières mentions les 13/10 au col de Soulor (DRa) et 16/10 à Bénéjacq (JIG).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (d=137)

Un migrateur postnuptial tardif le 27/11 à Bénéjacq (JIG). Comme les années précédentes, l'hivernage est constaté sur le lac de Léon (PLe / RNNCH), les étangs Blanc et d'Hardy (SLe), le marais d'Orx et les barthes de l'Adour (divers obs.), ainsi qu'à nouveau sur la lande de Ger où un individu stationne au moins jusqu'en janvier (divers obs.). La migration prénuptiale est très étalée dans le temps, débutant dès les 13/02 à Anglet (FCa) et 4/03 à Briscous (SéD) et se terminant le 26/05 à Ustaritz (GoL). Trois mentions plus tardives concernent probablement des oiseaux non nicheurs, les 16/06 à Saint-Etienne-d'Orthe (coll. GOPA), 4/07 et 16/07 à Saint-Pée-sur-Nivelle (LGo, AHG). En migration postnuptiale, premiers les 3/08 à Momas (ANa) et 9/08 à Orx (SéD), avec un total de 20 migrateurs le 28/08 au col de Soulor (JIG).

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (d=141)

Encore un migrateur postnuptial le 1/11 à Capbreton (FCa). Un comptage collectif permet de recenser 20 individus en dortoir le 15/12 sur la lande de Ger, séparés en deux groupes (coll. GOPA). Des migrateurs prénuptiaux sont observés entre le 4/03 à Briscous (SéD) et le 15/04 à Saint-Martin-de-Hinx (SDu). Aucune donnée sur la reproduction. Au passage postnuptial, quelques migrateurs sont notés au col de Soulor entre le 9/08 et le 31/10 (JIG, DRa, CGu).

Busard pâle *Circus macrourus***

Un individu est observé le 27/08 au col de Soulor (MLB / OCL).

Busard cendré *Circus pygargus* (d=15)

Première mention printanière le 14/04 à Onesse-et-Laharie (PUT) et dernier migrateur prénuptial le 10/05 à Bénéjacq (JIG). Un mâle observé le 12/06 à Onesse-et-Laharie (PUT) constitue la seule mention en période de reproduction. Un migrateur postnuptial est signalé dès le 22/07 au col d'Organbidexka (GDU), puis un autre le 16/08 au col de Soulor (SDu & OCL). Dernières observations de la saison le 3/09 à Montaner (FBa) et au col de Soulor (JIG).

Autour des palombes *Accipiter gentilis* (d=29)

Des parades aériennes sont observées entre le 19/02 à Moliets-et-Maa (PLe / RNNCH) et le 13/04 à Lourdios-Ichère (JIG), avec des observations en période de reproduction également à Léon, Peyrehorade, Cauneille (PLe), Saint-Just-Ibarre (AAn), Laruns (SDu), Nay, Bénéjacq, Ger (JIG), Lourdes (GDU), Lanne (DRa) et Clarac (FBa). Passage de migrateurs isolés les 9 et 25/09 au col de Soulor (DRa, JIG, JpP).

Épervier d'Europe *Accipiter nisus* (d=104)

Bien peu de données d'intérêt reçues ! Prédation sur une Tourterelle turque le 20/12 à Bénéjacq (JIG). Un migrateur prénuptial le 1/03 à Morcenx (PUT). Parades nuptiales le 29/03 à Bénéjacq (JIG). Un migrateur postnuptial dès le 4/08 au col de Soulor (SDu, MLB / OCL), avec 19 individus dénombrés sur ce site le 22/09 et 10 le 13/10 (DRa, JIG, CGu) ; le passage se poursuit toujours le 27/10 à Messanges (FCa).

Buse variable *Buteo buteo* (d=504)

Encore un migrateur postnuptial le 7/11 à Saint-Martin-de-Seignaux (FCa). Un individu totalement blanc (à l'exception de quelques tectrices et rémiges secondaires brunes) est signalé le 2/12 à Trouley-Labarthe (FBa). Rassemblement de 8 individus se nourrissant de vers de terre le 14/12 à Ayros-Arbouix (PMi) ; une buse capture une couleuvre le 16/03 à Boumourt (ANa). Pour ce qui est de la reproduction, les premières parades nuptiales sont signalées le 22/02 à Bénac (DRa) et Garrosse (PUT), la construction

d'un nid le 19/03 à Anhaux (AAn), des accouplements les 21/03 à Salles (PMi) et Saint-Martin (DRa) et 4/04 à Montaner (FBa), le premier jeune volant le 26/06 à Ustaritz (GoL). Des migrateurs postnuptiaux franchissent le col de Soulor les 22/09 et 13/10 (DRa, JIG, CGu), ainsi que le col de Lizarieta le 23/10 (GoL).

Buse pattue *Buteo lagopus**

Aigle criard *Aquila clanga* (d=35)**

L'oiseau adulte fidèle aux barthes de Saint-Martin-de-Seignanx y est signalé du 17/11 au 11/03 (FCa *et al.*) ; il est rejoint par un immature (probablement de 2^{ème} année) qui stationne du 13/12 au 21/03 (divers obs.). Un individu (sans doute l'un de ceux-ci) est également signalé à Orx les 23/11 et 15/02 (JFe) et un autre à Pontonx le 31/10 (GLa).

Aigle pomarin *Aquila pomarina* (d=1)**

Un individu (peut-être hybride) est bien observé le 29/03 à Briscous, en migration active (SéD).

Aigle botté *Aquila pennata* (d=166)

Deux observations hivernales : un individu de phase sombre le 28/11 à Orx (PLE) et un autre de phase claire le 9/01 à Bayonne (EDu). Les premiers retours pré-nuptiaux sont signalés les 5/03 à Arras-en-Lavedan (PMi) et 8/03 à Ustaritz (GoL) ; deux couples sont cantonnés dès le 25/03 à Saint-Martin-de-Hinx (coll. GOPA) et des parades signalées à partir du 1/04 à Briscous (SéD). Premier jeune volant signalé le 23/07 à Rivière-Saas-et-Gourby (FCa). Un individu au comportement « local » est observé le 29/06 à 2200 m d'altitude à Lescun (SDu). Premiers migrateurs postnuptiaux signalés le 9/09 au col de Soulor ; dernières mentions les 4/10 à Bénéjacq (JIG) et 23/10 à Bayonne (LGo).

Aigle royal *Aquila chrysaetos* (d=54)

Pour un couple suivi à Laruns, la couvaison est constatée le 21/03 et l'aiglon est encore au nid le 23/07 (coll. GOPA). La saison 2013 s'est de nouveau avérée catastrophique pour la reproduction de l'Aigle royal dans les Pyrénées-Atlantiques, avec seulement 3 jeunes à l'envol pour 20 couples correctement suivis (données PNP, Saiak & GOPA). Observation remarqua-

ble de 2 immatures de 2^{ème} année le 23/04 à Jatxou (ABi).

Aigle de Bonelli *Aquila fasciata**

Aigle ibérique *Aquila adalberti***

PANDIONIDAE

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* (d=104)

Des recherches spécifiques ont permis de recenser au moins 11 individus dans le bassin de l'Adour au cours de l'hiver 2012/2013, essentiellement cantonnés au marais d'Orx et aux vallées de l'Adour, des gaves de Pau et d'Oloron (PLE, JBo et divers obs.). Un individu a passé l'hiver sur le Saison, entre Mauléon-Licharre et Tardets-Sorholus (SDu, JBo) et un autre est signalé le 10/01 à Puydarrieux (VDu). La migration pré-nuptiale débute les 6/03 à Léon (PLE / RNNCH) et 16/03 à Momas (ANa), pour s'achever le 11/05 au lac de l'Ayguelongue (ANa). Un individu est noté à Plaiaundi le 23/06, puis en stationnement à partir du 13/07 (AHG, GDu) ; ailleurs il faut attendre le 9/08 pour qu'un migrateur postnuptial soit signalé à Sainte-Marie-de-Gosse (SéD). Jusqu'à 5 individus le 9/09 à Puydarrieux (VDu) ; un balbusard pêche en mer le 12/09 à Tarnos (SHo, SDu).

RALLIDAE

Râle d'eau *Rallus aquaticus* (d=49)

Forte baisse du nombre de données reçues. En période internuptiale (novembre à mars), l'espèce est signalée à Léon avec 9 individus le 15/11, Seignosse (PLE / RNNCH), Soustons (SLe), Orx (divers obs.), Saint-Martin-de-Seignanx, Plaiaundi, Biarritz, Anglet, Bassussarry, Ustaritz, Villefranque, Urt (GoL, FCa), Hontanx (CIC), Orthez (SDu, JBo), Bésingrand, Meillon (JIG) et Moulédous (M. Barbé *vide* FBa). Seulement deux mentions en période possible de reproduction, les 19/04 à Plaiaundi (GoL, SDu) et 11/07 à Tercis-les-Bains (FCa). Au passage postnuptial, jusqu'à 6 individus les 28 et 29/09 à Messanges (FCa).

Marouette ponctuée *Porzana porzana* (d=2)

Une le 4/09 et 2 le 28/09 à Messanges (FCa) sont les seules données reçues.

Marouette poussin *Porzana parva**

Marouette de Baillon *Porzana pusilla***

Rôle des genêts *Crex crex* (d=2)

Un chanteur (en halte migratoire dans une parcelle de céréales) le 2/05 à Denguin (JIG) et 2 individus observés par un chasseur à Saint-Martin-de-Seignanx durant la première quinzaine du mois d'octobre (*vide* JfG).

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* (d=151)

Au maximum 48 le 12/12 à Bours (SPé), 30 le 30/01 à Plaiaundi (JFe) et 20 le 3/03 à Bésin-grand (FCa). Les premiers poussins sont observés dès le 2/04 à Téthieu (FCa), les derniers le 26/07 à Monfaucon (SPé). Un nid contient 3 œufs le 7/07 à Rabastens-de-Bigorre (SPé).

Foulque macroule *Fulica atra* (d=232)

En période hivernale (novembre-mars), on dénombre au maximum 716 individus à l'Étang Blanc (SLe), 200 à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL), 183 à Labatut (PLe, FCa), 155 à Bésin-grand (JIG), 825 sur deux sites à Montgaillard, 140 à Cazères-sur-l'Adour (CIC) et 172 à Bours (SPé). Des poussins sont éclos dès le 3/04 à Plaiaundi (JFe, GDu), les derniers étant signalés le 25/07 à Momas (ANa). La reproduction n'est avérée qu'à Plaiaundi (JFe), Biarritz au lac de Mouriscot (GoL), Lahontan, Biron (PLe), Abos (SDu), Momas (ANa, JIG), sur le lac du Gabas (JIG) et à Miélan (SPé, DRa).

GRUIDAE

Grue cendrée *Grus grus* (d=183)

Le passage postnuptial 2012 se poursuit tardivement jusqu'en décembre, avec des effectifs importants survolant la région quotidiennement du 28/11 au 12/12 (divers obs.) ; des déplacements vers le Sud sont encore notés le 2/01 à Bidarray (FCa, SLe) et même le 25/01 à Bénéjacq (JIG). L'hivernage concerne jusqu'à 2605 individus le 26/12 à Saint-Martin-de-Seignanx, 281 le 17/01

à Orx (FCa) et 2100 le 11/01 à Puydarrieux (DRa, VDu).

Le passage pré-nuptial est noté du 15/02 à Larrau (SDu) et Seignosse (PLe), au 23/03 à Saubusse (JFe), avec de gros passages les 16/02, 27/02, 3/03 et 4/03 (divers obs.). Les plus forts effectifs signalés sont alors de 3000 le 16/02 à Garrosse, 6000 le 27/02 à Arjuzanx (PUT) et 10000 le 3/03 à Briscous (SéD). Deux mentions tardives, d'un immature le 9/04 à Rivière-Saas-et-Gourby (FCa) et d'un adulte le 6/06 à Saint-Martin-de-Seignanx (ABi).

Au passage postnuptial, premières les 26/09 à Saugnacq-et-Muret (PLe) et 1/10 à Puydarrieux (VDu), puis le passage est très diffus (et partiellement nocturne) tout au long du mois d'octobre, sans pic bien défini.

Grue du Canada *Grus canadensis***

Grue demoiselle *Grus virgo***

OTIDIDAE

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* (d=1)

Un groupe de 14 individus en migration active est observé le 7/09 en début de matinée à Idaux-Mendy (J.L. Iratchet *vide* SDu).

Outarde barbue *Otis tarda***

BURHINIDAE

Édicnème criard *Burhinus oedicephalus* (d=10)

Présence hivernale rare notée uniquement sur le littoral basque avec 8 à Hendaye le 29/11 (FCa, L. Goutaudier) et 1 à Bayonne le 12/12 (FCa). En période pré-nuptiale, 1 à 2 individus sont observés du 23 au 25/02 ainsi que le 15/03 sur une gravière d'Ustaritz (GoL). Le passage post-nuptial se concentre en octobre avec 1 le 03/10 à Tarnos (EDu), 2 le 11/10 à Montaner et 1 le 27/10 à Goudon (FBa).

RECURVIROSTRIDAE

Échasse blanche *Himantopus himantopus* (d=16)

En période de migration pré-nuptiale : 2 à Rivière-Saas-et-Gourby le 22/03 (FCa, B. Ducout),

2 à Plaiaundi le 19/04 (SDu, GoL), 3 à Lit-et-Mixe le 21/04 (coll. GOPA), 3 au lac du Gabas le 9/05 (DLA), 4 à Ustaritz le 10/05 (GoL) et 2 à Maubourguet le 16/05 (FBa). Aucune reproduction rapportée cette année. Premiers mouvements postnuptiaux d'un adulte le 17/06 à Rabastens-de-Bigorre (SPé) et de 8 individus le 24/06 à Abos (SDu), observation d'un groupe de 15 suivant l'Adour à Anglet le 02/08 (FCa) ; le dernier oiseau stationne du 16 au 25/08 sur le lac de l'Ayguelongue (ANa, JIG, CHo).

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* (d=9)
Présence hivernale signalée sur 2 sites : Orx avec un seul oiseau noté du 28/11 au 28/12 (divers obs.), et Plaiaundi avec jusqu'à 6 oiseaux le 30/11 et encore 1 le 19/02 (JFe). En période de migration pré-nuptiale, 6 font halte à Ustaritz le 20/03 (GoL). Unique mention automnale d'un migrateur à Puydarrieux le 04/10 (VDu).

HAEMATOPODIDAE

Huîtrier pie *Haematopus ostralegus* (d=3)
Présence de quelques rares hivernants sur le littoral basque : 3 à Ciboure le 23/11 (GoL) et 3 à Hendaye le 28/01 (EDu). En période de retour pré-nuptial, 2 observés à Hendaye le 13/04 (AHG).

CHARADRIIDAE

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (d=15)
Le passage postnuptial 2012 se prolonge en novembre avec 4 à Momas le 09/11 (CHo). Cet hiver, les effectifs relevés sont plus faibles que l'an passé : au maximum 8 à Montaner (FBa), 18 à Puydarrieux (DRa, VDu), 20 à Bénéjacq et une trentaine en vol à Ger (JIG) ; maximum de 94 enregistré à Saubusse (FCa, PLe). En migration pré-nuptiale, 2 observés le 02/03 à Montaner (FBa). Premier retour postnuptial le 22/08 à Momas d'un oiseau encore présent le 24/08 en compagnie d'un Bécasseau de Temminck (ANa), puis 2 à Saint-Martin-de-Seignanx le 11/09 (JIG, ANe) et 3 à Urrugne le 12/09 (AHG).

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* (d=41)
Espèce exclusivement observée sur le littoral basco-landais au cours de la période considérée.

Le passage postnuptial 2012 se prolonge début novembre avec 1 le 09/11 à Vieux-Boucau (JFe). En hivernage, jusqu'à 50 rassemblés à Plaiaundi (JFe) et 20 à Hossegor (FCa) ; observés ailleurs en petit nombre, notamment à Orx (FCa), Capbreton (ANa) et sur le lac marin de Vieux-Boucau (SDu, STI, JFe). En période pré-nuptiale (fin mars à mai), migrateurs notés à Lit-et-Mixe (coll. GOPA), Moliets-et-Maa (JFe) et Hossegor (JFe, ANa, FCa) ; les derniers passent devant Capbreton le 25/05 (FCa). Retour postnuptial de 6 oiseaux le 24/09 à Moliets-et-Maa (JFe).

Vanneau sociable *Vanellus gregarius***

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (d=195)
L'hiver, les plus gros effectifs sont relevés en janvier avec notamment 3492 oiseaux à Orx (FCa), 2400 à Saubusse (GoL) et 1500 à Bassillon-Vauzé (DRa). Ailleurs, d'autres rassemblements de moindre importance mais non moins remarquables sont mentionnés : 900 à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL), 504 sur le lac du Gabas (EDu) et 352 à Saint-Sever le 09/12 (CIC). Février voit les effectifs se réduire progressivement jusqu'aux derniers départs sensibles durant la première quinzaine de mars, pour exemple : 100 le 05/03 et plus que 5 le 12/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Premiers retours postnuptiaux le 16/06 avec 2 à Saint-Étienne-d'Orthe (coll. GOPA). De petits groupes (moins de 30) sont ensuite observés tout l'été jusqu'à octobre qui voit apparaître les premiers rassemblements importants : 89 le 13/10 à Pontonx-sur-l'Adour (CIC), 163 le 23/10 à Luquet (DRa) et 103 le 31/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

Petit Gravelot *Charadrius dubius* (d=46)
Le suivi assidu de la gravière d'Ustaritz a permis de découvrir une population nicheuse de 4 à 6 oiseaux arrivés dès le 08/03 et de fournir les preuves de la reproduction (GoL). En d'autres lieux, le retour pré-nuptial est observé le 12/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et le 23/03 à Saubusse où le maximum de 15 est noté (JFe). La présence en période de reproduction est signalée sur le lac des Gaves à Préchac (PMi), à



Le **Vanneau huppé** se reproduit occasionnellement dans le bassin de l'Adour, mais des nicheurs peuvent facilement passer inaperçus dans les vastes ensembles de barthes (photo P. NAVARRE).

Plaiiaundi (GDu) et à Lahontan (PLe), sans suite. En période de migration postnuptiale, premier oiseau vu dans un labour à Momas le 29/07 (ANa), puis mentionné à l'unité ou en petits groupes à Cazères-sur-l'Adour (CIC), aux abords des lacs de l'Arrêt-Darré (FBa) et de l'Ayguelongue (JIG, ANa, SDu) où le maximum de 8 est enregistré le 29/08 (JIG) ; derniers les 29/09 à Orx (FCa) et 03/10 sur le lac du Gabas (JIG).

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* (d=66)
Hivernage observé à Hossegor (FCa, JFe, ANa), Ciboure (GoL), maxima enregistrés à Plaiiaundi et en baie de Txingudi avec jusqu'à 27 oiseaux le 23/11 (GoL). Le retour pré-nuptial s'amorce en mars et avril, maximum de 20 à Hossegor le 23/03 (FCa), puis il culmine en mai avec 60 à Hendaye et 10 à Moliets-et-Maa le 08/05 (FCa), 50 à Hossegor le 19/05 (ANa), 40 encore sur ce même site et 16 à Capbreton le 25/05 (FCa) ; derniers le 31/05 à Anglet (GoL). En période

postnuptiale, premier retour noté le 19/08 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG). Comme l'an dernier, un afflux sensible marque la dernière décade de septembre avec les plus gros effectifs relevés, comme à Orx avec 60 le 21/09 et encore 50 le 29/09 (FCa), également 30 à Capbreton le 21/09 et 25 à Plaiiaundi le 01/10 (FCa). Les derniers sont observés sur le lac de l'Ayguelongue le 16/10 (JIG).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* (d=4)

Toutes les données recueillies cette année proviennent exclusivement de la commune de Moliets-et-Maa. En hiver, 5 se nourrissent sur l'estran le 20/12 (JFe). En période de reproduction, 2 couples sont découverts le 21/04 (coll. GOPA) et 8 oiseaux potentiellement nicheurs sont localisés au Courant d'Huchet le 08/05 (JFe), sans suite. En période de migration postnuptiale, 3 y sont observés le 24/09 (JFe).

Pluvier guignard *Charadrius morinellus** (d=2)

Migrateurs isolés contactés au Pic de Sesques (Laruns) le 14/09 à 2550 m d'altitude (JmT) et à Herrère en septembre (SHo).

SCOLOPACIDAE

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* (d=18)

Hivernage observé uniquement à Plaiaundi (FCa, ANa, JFe, GoL.), avec un maximum de 4 le 23/11 (GoL) et dernier noté le 19/02 (JFe). Premiers migrateurs pré-nuptiaux le 21/04 avec 8 à Lit-et-Mixe (coll. GOPA), puis des haltes migratoires notées à Hendaye (FCa, JFe) et Hossegor avec jusqu'à 30 oiseaux le 25/04 (JFe) ; dernier migrateur sur ce même site le 25/05 (FCa). En période de migration postnuptiale, premier oiseau mentionné le 07/07 à Puydarrieux (VDu) puis 2 le 16/07 à Plaiaundi (GDu) ; le passage à l'unité se poursuit en automne le 18/09 à Tarnos (FCa) et le 18/10 à Plaiaundi (JFe).

Courlis cendré *Numenius arquata* (d=115)

En hiver, les sites traditionnels des Barthes de l'Adour concentrent les plus gros effectifs régionaux comme 300 le 07/03 à Rivière-Saas-et-Gourby (FCa), jusqu'à 478 le 17/01 à Orx grâce au niveau d'eau maintenu bas (FCa), et surtout 900 le 07/02 à Saubusse (FCa). Ailleurs, des oiseaux seuls ou en petit groupe sont observés à Tercis-les-Bains (FCa), Hendaye (JFe, FCa *et al.*), Pey (GoL), Pontonx-sur-l'Adour (JFe), Saint-Étienne-d'Orthe (GoL), Saint-Martin-de-Seignanx (FCa *et al.*) et sur le lac du Gabas (EDu, GDu). En période de reproduction, présence le 14/04 à Onesse-et-Laharie, site déjà fréquenté en mai 2011 par 2 chanteurs (PUT). Sur la lande de Ger : 1 présent dès le 09/03 (GDu) ; sur les 5 couples localisés le 14/04 (coll. GOPA), au moins 2 ont probablement entamé une nidification (ANa, SDu) ; dernière observation sur ce site le 27/07 (ANa). Premiers retours postnuptiaux : 1 à Puydarrieux le 15/06 (VDu) et 21 à Plaiaundi le 16/07 (GDu).

Barge à queue noire *Limosa limosa* (d=52)

En hiver, observée à l'unité à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa, GoL) et Montgaillard (CIC). Le

marais d'Orx accueille cette année des effectifs hivernants proches ou dépassant la cinquantaine d'individus (divers obs.), jusqu'au 02/02 où le dernier recensement atteint le chiffre remarquable de 90 oiseaux (FCa). La migration pré-nuptiale est observée en petit nombre du 20/02 au 29/04 (divers obs.) ; maximum de 10 le 28/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (JFe). Le premier retour postnuptial est signalé le 28/06 avec 13 oiseaux à Puydarrieux (VDu). Il faut attendre le mois d'août pour observer de nouveau des migrateurs, comme les 03 et 09/08 sur le lac de l'Ayguelongue (ANa), avant qu'ils ne soient d'observations plus régulières du 19/08 au 18/10 sur la façade atlantique et à l'intérieur des terres (divers obs.). Les maxima sont enregistrés à Orx les 11 et 15/10, avec respectivement 26 et 31 individus (JIG, ANe, SDu).

Barge rousse *Limosa lapponica* (d=21)

Le mouvement postnuptial 2012 se prolonge en novembre avec des migrateurs isolés les 07 et 16/11 à Orx (FCa). Seule mention hivernale : 1 le 17/12 à Vieux-Boucau (coll. GOPA). En période de migration pré-nuptiale, observée à l'unité à Lit-et-Mixe le 21/04 (coll. GOPA) et Hossegor le 29/04 (JFe) ; un groupe de 15 fait halte le 25/05 encore sur ce dernier site (FCa). La migration postnuptiale est observée classiquement en septembre et octobre le long de la côte avec le maximum de 28 noté à Plaiaundi le 01/10 (FCa). Limicole occasionnel à l'intérieur des terres, remarquable donnée d'un migrateur à Puydarrieux le 16/09 (VDu).

Tournepierre à collier *Arenaria interpres* (d=124)

Observé sur les sites côtiers traditionnels pendant toute la période considérée, sauf juillet et août. Des rassemblements parfois importants en hiver : jusqu'à 100 sur la plage de Tarnos le 22/01, 40 à Txingudi le 23/11 et 61 sur le fort de Socoa le même jour (FCa). Le dernier oiseau est contacté le 02/06 à Anglet (GoL). Premiers retours postnuptiaux observés à Plaiaundi le 03/09 (JFe) et à Tarnos le 06/09 (FCa) ; maximum de 20 à Plaiaundi le 01/10 (FCa). Un oiseau estropié se nourrit de « churros » sur l'estacade de Capbreton (ANa) ; d'autres muti-

lés ou les pattes entravées dans des cordages sont également signalés (ANa).

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* (d=18)
Comme l'an dernier, deux seules données d'hivernants : 2 à Plaiaundi le 30/11 (JFe) et 1 à Vieux-Boucau le 04/12 (SDu, STi). La migration printanière, observée uniquement à Hossegor et Capbreton, s'amorce timidement le 29/04 avec 2 oiseaux (JFe) avant de culminer en mai avec notamment 20 le 07/05 (JFe) et 3 le 19/05 (ANa) ; derniers le 25/05 avec, ce même jour, 14 sur le lac marin et 40 en mouvement devant l'estacade de Capbreton (FCa). Excepté un migrateur contacté à Puydarrieux le 04/10 (VDu), le passage postnuptial est observé uniquement le long du littoral atlantique du 03/09 au 05/10 (divers obs.) ; maximum de 10 à Moliets-et-Maa (JFe).

Combattant varié *Calidris pugnax* (d=38)
Hivernants notés en faible nombre sur deux seuls sites : maxima de 11 à Orx (FCa) et de 4 à Puydarrieux (DRa). Le retour pré-nuptial est peu observé : 1 le 19/04 à Plaiaundi (SDu, GoL) et 6 le 21/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). En période postnuptiale, première donnée très remarquable d'un migrateur rencontré le 17/07 au barrage des Gloriettes (commune de Gèdre) à l'altitude de 1668 m (CHo). Les autres mentions, plus classiques de par la date et le lieu, situent le passage de la mi-août à octobre sur divers sites avec un maximum de 20 oiseaux à Orx le 4/10 (JFe).

Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata***

Bécasseau falcinelle *Calidris falcinellus***

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* (d=9)
Uniquement noté au retour postnuptial : premier le 03/08 à Plaiaundi (AHG) qui enregistre également le maximum de 5 oiseaux le 03/09 (JFe), 1 observé sur le lac de l'Ayguelongue le 29/08 (JIG) ; derniers le 29/09 à Orx où 3 à 4 individus semblent avoir stationné depuis le 21/09 (FCa).

Bécasseau de Temminck *Calidris temmincki* (d=6)

Deux migrateurs postnuptiaux font halte sur le lac de l'Ayguelongue du 24 au 28/08 (JIG, ANa) ; un est encore contacté le 07/09 (ANa).

Bécasseau sanderling *Calidris alba* (d=28)
Des hivernants sont notés à Capbreton avec jusqu'à 24 individus le 23/02 (ANa), ainsi qu'en baie de Txingudi (ANa, FCa), à Vieux-Boucau avec 9 le 17/12 (coll. GOPA) et à Moliets-et-Maa (FCa). Le retour pré-nuptial qui s'étale du 21/04 au 02/06 est observé à Hendaye avec 20 oiseaux le 08/05 (FCa), Capbreton avec 12 le 25/05 (FCa), Moliets-et-Maa avec 10 les 08/05 et 02/06 (JFe), et Hossegor et Tarnos avec respectivement 3 et 2 le 19/05 (ANa). Deux données de retour postnuptial : 26 individus le 23/07 à Saint-Girons (CGu) et 2 le 21/09 à Capbreton (FCa). Un individu, observé à Moliets-et-Maa le 25/04 (DLA), avait été bagué au nid en été 2011 au nord-est du Groenland.

Bécasseau variable *Calidris alpina* (d=94)
Comme l'an passé, les hivernants sont régulièrement notés en petit nombre sur les sites côtiers (divers obs.) avec un maximum de 274 oiseaux à Orx le 17/01 (FCa). Le lac de Puydarrieux est le seul site d'hivernage à l'intérieur des terres avec 4 oiseaux le 23/12 (DRa). Une diminution sensible des effectifs vers la fin février traduit le départ des hivernants qui se fond toutefois avec l'arrivée des premiers migrateurs pré-nuptiaux, jusqu'à 100 le 23/03 à Soorts-Hossegor (FCa) ; les derniers mouvements sont notés les 31/05 et 02/06 à Anglet (GoL). Premier migrateur postnuptial observé le 16/08 sur le lac de l'Ayguelongue (ANa) ; le passage culmine en septembre sur la côte comme à l'intérieur (divers obs.) avec un maximum de 100 à Orx le 29/09 (FCa).

Bécasseau violet *Calidris maritima* (d=37)
L'hivernage est noté sur les sites maritimes traditionnels : maxima de 11 le 17/12 à Capbreton (coll. GOPA) et de 8 le 23/02 à Tarnos (ANa) ; derniers hivernants le 02/03 à Ciboure (FCa).

Bécasseau de Baird *Calidris bairdii***

Bécasseau minute *Calidris minuta* (d=25)



La station d'épuration de Capbreton est probablement le meilleur site régional pour observer le **Phalarope à bec large**, souvent dans des conditions idéales (photo S. TILLO).

Un **Bécasseau sanderling** bagué est observé à Moliets-et-Maa : il appartenait à la population groenlandaise et nous rappelle les extraordinaires capacités de vol ininterrompu des petits *Calidris* (photo S. TILLO).



Unique mention hivernale de 2 oiseaux présents le 02/02 à Orx (FCa). Retour printanier précoce d'un oiseau observé les 05 et 12/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Premiers retours postnuptiaux les 22/08 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et sur le lac de l'Ayguelongue (CHo) et 03/09 à Plaiaundi (JFe) ; c'est au marais d'Orx que sont enregistrés le maximum de 11 le 21/09 (FCa) et le dernier migrateur le 04/10 (JFe).

Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis***

Bécasseau rousset *Calidris subruficollis***

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos**

Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla***

Observation de cette rare espèce à proximité du Bassin de l'Adour le 15/09 à Mimizan, la seconde pour l'Aquitaine (www.chn-france.org).

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus**

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* (d=7)

Présence hivernale à Capbreton d'un oiseau seul observé le 17/12 (coll. GOPA), puis de 2 les 5 et 6/01 (GoL, ANa) et un seul présent jusqu'au 23/01 (FCa, EDu). Observation lors du retour postnuptial d'un individu le 21/09 sur le marais d'Orx (FCa).

Chevalier bargette *Xenus cinereus***

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (d=150)

Espèce observée tous les mois de l'année. C'est à l'unité et plus rarement en petit nombre que les hivernants sont mentionnés sur 20 localités différentes (divers obs.) ; maximum de 6 à Ustaritz le 08/02 (GoL). En période de migration pré-nuptiale, maximum (faible) de 5 à Bours le 07/05 (SPé). Pas de reproduction avérée cette année, seules les observations des 31/05 à Aren et Saucède (FCa, SLe), 2/06 à Lahontan (PLe), 24/06 à Meillon (SDu) et 19/08 à Nay (CGu) pouvant concerner des nicheurs locaux. Les premiers retours postnuptiaux sont observés les 11/07 à Ustaritz (GoL), 16/07 à Plaiaundi (GDu)

et 17/07 sur le lac de l'Ayguelongue (JIG) ; maximum de 10 sur ce dernier site les 16 et 22/08 (ANa). La migration nocturne (n=10) est observée de la fin juillet au début d'octobre ; elle se déroule sur la façade atlantique : Moliets-et-Maa et Anglet (FCa) comme à l'intérieur des terres : Oloron-Sainte-Marie et Arette (SDu).

Chevalier grivelé *Actitis macularia***

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* (d=96)

Les mentions hivernales (décembre-janvier) concernent généralement des oiseaux seuls ou plus rarement de petits groupes comptant jusqu'à 4 individus ; elles proviennent de 14 communes. Premier retour printanier le 04/03 à Pey et dernier le 25/04 à Saubusse (FCa) ; maximum de 12 à Ustaritz le 03/04 (GoL). Les premiers migrateurs postnuptiaux sont observés les 20/06 à Léas-Athas (SDu) et 12/07 à Bordes (FBa). Le passage (à l'unité ou en petit nombre) est signalé à travers toute notre région, de la façade maritime jusqu'en montagne avec un migrateur contacté le 18/08 à 1920 m à Laruns (SDu). Maxima enregistrés de 6 le 23/07 à Bours (DRa), 5 le 06/08 à Saint-Laurent-de-Gosse (SéD) et 5 encore le 19/09 à Momas (JIG). Le nombre de données décroît sensiblement dès la première décennie d'octobre, traduisant la fin du mouvement ; dernier noté le 18/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (d=26)

Arrivée des premiers hivernants le 08/11 à Orx avec un maximum de 10 enregistré le 22/12 (JFe *et al.*) ; un hivernant est observé également à Plaiaundi (JFe, ANa). Trois seules données printanières : 7 le 12/03 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 1 le 03/04 à Plaiaundi (JFe) et 1 le 18/04 à Puydarrieux (VDu). Les premiers retours postnuptiaux sont observés le 16/07 à Plaiaundi (GDu) et le 09/08 à Puydarrieux (VDu), le passage se poursuivant jusqu'à mi-octobre (divers obs.) avec un maximum de 8 le 27/09 à Orx (FCa) ; dernier migrateur signalé le 30/10 à Puydarrieux (VDu).

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (d=59)

En hivernage, observé essentiellement sur les sites côtiers basco-landais ; maxima de 12 à

Plaiiaundi le 30/11 et de 6 à Orx le 22/12 (JFe). Les premiers retours printaniers sont notés les 23/03 à Saubusse (JFe) et 31/03 à Hossegor (ANa) ; le passage se poursuit classiquement en avril, avec des maxima de 18 à Momas le 19/04 (JIG), 25 à Saubusse (FCa) et 30 à Plaiiaundi (JFe) le 25/04 ; derniers le 29/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Premiers migrateurs postnuptiaux le 09/08 à Orx (SéD), puis les 14 et 17/08 à Bézingrand (JIG). Si août ne voit que des migrateurs isolés ou groupés par 2 ou 3 (divers obs.), septembre et octobre enregistrent un afflux sensible : jusqu'à 25 le 03/09 à Plaiiaundi (JFe), 10 le 04/10 à Orx (JFe) et encore 30 (derniers) le 18/10 à Plaiiaundi (JFe).

Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes***

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis (d=1)**
Unique mention pour ce migrateur printanier d'occurrence rare : un individu observé le 23/05 sur la réserve du Courant d'Huchet (PLe / RNNCH).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* (d=23)
Aucune donnée d'hivernage pour l'espèce. Deux observations en période de migration printanière : 4 le 21/04 à Lit-et-Mixe (coll. GOPA) et 2 le 25/04 à Saubusse (FCa). Premiers retours postnuptiaux observés à Plaiiaundi les 13/07 et 03/08 (AHG) ; 5 oiseaux stationnent sur le lac de l'Ayguelongue du 16 au 27/08 (ANa) et dernière mention le 15/10 à Orx (SDu). Un oiseau fait une halte sur le lac de Soum (1500 m) à Arbéost le 09/09 (JIG).

Chevalier gambette *Tringa totanus* (d=55)
Un groupe de 30 migrateurs attardés ou premiers hivernants est observé le 16/11 à Plaiiaundi (JFe). En hiver, 2 à Orx le 28/12 (JIG, JpP, CGu), 1 à Hossegor le 25/01 (JFe) et maximum de 15 à Plaiiaundi les 12/12 et 19/02 (JFe). Premiers retours pré-nuptiaux dès le 27/02 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), puis le 23/03 à Saubusse (JFe). Sur les 20 données enregistrées en avril et mai, 10 se rapportent à des groupes d'une quinzaine d'individus ou plus (divers obs.), avec des maxima de 30 le 25/04 à Plaiiaundi (JFe) et encore 25 le 25/05 à Hossegor (FCa). Derniers migrateurs notés début juin : 1 le 02/06

à Anglet et 1 le 10/06 à Ustaritz (GoL). Premiers migrateurs postnuptiaux observés le 16/07 à Plaiiaundi (GDu) et derniers notés le 26/10 à Hossegor (ANa.) ; maxima enregistrés à Plaiiaundi : 35 le 05/09 (JIG, ANe) et 40 le 18/10 (JFe).

Bécassine sourde *Lymnocyptes minutus* (d=2)
Espèce notée à l'unité aux deux passages postnuptiaux : le 6/11/2012 à Saint-Martin-de-Seignanx (SéD) et le 27/10/2013 à Messanges (FCa).

Bécassin sp. *Limnodromus* sp.**

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* (d=25)
L'hivernage est noté sur 15 communes, du niveau de la mer à 1100 m d'altitude (divers obs.). Cette année, la croûle est observée d'avril à juillet sur les communes d'Accous (1600 m), Aydius (1700 m) et Léas-Athas (1500 m) (SDu), les dernières manifestations observées le 22/07 sur cette dernière localité étant tardives (SDu, SHo, PUT). L'espèce est également signalée en période de reproduction à Osse-en-Aspe (900 m) (SDu, SLe) et Sarrance (1350 m) (SDu).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (d=132)

En hiver (décembre à février), maxima de 100 à Orx (EDu, FCa), 56 à Saubusse (FCa, PLe), 31 à Bours (SPé) et 30 à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL) ; partout ailleurs la taille des groupes ne dépasse pas 14 individus (divers obs.). Le passage pré-nuptial en mars et avril est peu sensible (14 mentions) ; derniers migrateurs signalés les 20/04 à Momas (ANa) et 21/04 à Lit-et-Mixe (coll. GOPA). Premiers retours postnuptiaux le 03/08 à Puydarrieux (VDu) et le 06/08 à Saint-Laurent-de-Gosse (SéD) ; les plus gros effectifs sont enregistrés à Orx avec au maximum 100 oiseaux comptés les 27 et 29/10 (FCa) et sur le lac du Gabas avec 29 le 23/10 (DRa). La présence de migrateurs isolés en altitude est rapportée de Bilhères (910 m) le 26/08 et de Laruns (1800 m) le 1/09 (SDu).

Bécassine double *Gallinago media***

GLAREOLIDAE

Glaréole à collier *Glareola pratincola***Courvite isabelle *Cursorius cursor*****STERCORARIIDAE****Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* (d=8)**

Peu d'observations hivernales, toutes réalisées durant le mois de novembre. Des effectifs de 9 oiseaux le 1/11 à Capbreton (FCa) et de 7 oiseaux le 5/11 à Biarritz (EDu). Le retour s'effectue à partir du 18/09 à Tarnos (FCa).

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* (d=6)

Seulement 3 observations durant l'hiver pour cette espèce. À noter cependant un oiseau le 25/05 à Capbreton (FCa), à une date tardive. Retour à partir du 12/09 à Tarnos (SDu, SHo).

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus****Grand Labbe *Stercorarius skua* (d=19)**

L'espèce est vue jusqu'au 21/04 au Courant d'Huchet (coll. GOPA), avec des maxima de 13 oiseaux le 1/11 (FCa), 7 le 4/12 (SDu, STi, G. Blake) et 8 le 21/12 (FCa), ces trois observations ayant été réalisées à Capbreton. Retour à partir du 6/09 à Tarnos (FCa).

ALCIDAE**Macareux moine *Fratercula arctica* (d=1)**

Une seule donnée pour 16 oiseaux en migration depuis l'estacade de Capbreton le 4/12 (SDu, STi, G. Blake).

Pingouin torda *Alca torda* (d=26)

Un petit pic migratoire est décelé à la mi-décembre, 12 le 17/12 à Capbreton (coll. GOPA) et 15 le 21 de ce mois à Biarritz (EDu), puis les observations se font à l'unité au cours de l'hiver et du printemps depuis les sites littoraux. Une seule donnée de l'automne suivant : 12 le 12/10 lors d'une sortie en mer au large d'Hendaye (GoL).

Mergule nain *Alle alle****Guillemot de Troil *Uria aalge* (d=2)**

Année très faible pour l'espèce, avec un individu le 23/02 à Tarnos (ANa) et 5 posés en mer à Moliets-et-Maa le 21/04 (coll. GOPA).

STERNIDAE**Sterne bridée *Onychoprion anaethetus*******Sterne naine *Sternula albifrons* (d=2)**

Un groupe de 10 oiseaux en migration est vu le 25/05 à Capbreton (FCa). Lors du passage post-nuptial, un individu à l'intérieur des terres à Puydarrieux le 13/07 (FBa).

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* (d=1)

Une seule observation pour cette année : un oiseau à Puydarrieux le 5/08 (VDu).

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia***Guifette moustac *Chlidonias hybrida* (d=10)**

Lors de la migration pré-nuptiale, des oiseaux sont vus à l'intérieur des terres : un sur le lac de Lourdes le 6/04 (GDu), un à Puydarrieux le 16/04 (VDu) et sur le lac de l'Ayguelongue le 10/05 (JIG). Un effectif de 14 individus est observé le 16/06 à Saint-Etienne-d'Orthe (coll. GOPA). En période post-nuptiale, présence de l'espèce à Puydarrieux le 14/07 (VDu) et à Orx le 4/09 (FCa).

Guifette noire *Chlidonias niger* (d=27)

Quelques données très tardives, dont un oiseau le 10/11 à Saint-Sever (CIC). À noter une tentative d'hivernage d'un oiseau du 20 au 26/01 à Tarnos (ANa, GoL). Seulement deux observations durant la migration pré-nuptiale : 2 individus au lac de l'Astarac (Aussos-32) et 3 à Castelnau-Magnoac le 1/05 (GDu). Retours à partir du 9/08 sur le lac de l'Ayguelongue où l'espèce est notée jusqu'au 27/08 (ANa) ; un maximum de 9 oiseaux à Orx le 26/08 (FCa).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus (d=1)**

Un oiseau de première année est vu à Orx le 26/08 (FCa).

Sterne élégante *Sterna elegans*****Sterne caugek *Sterna sandvicensis* (d=66)**



Une **Mouette pygmée** est observée en décembre à Bours, très à l'intérieur des terres, stationnement inhabituel pour cette espèce nettement pélagique en hiver (photo S. TILLO).

L'espèce est présente jusqu'au 29/05 avec 10 oiseaux à Capbreton (FCa). Durant cette période, les effectifs les plus importants sont notés le 5/11 au large de Biarritz, avec 40 individus (EDu) ; également 25 à Anglet le 1/04 (FCa) et 20 au Courant d'Huchet le 21/04 (coll GOPA). Retour à partir du 14/07 à Hendaye (LGo), où un jeune quémande de la nourriture à un adulte le 23/08 (FCa).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* (d=11)

Un oiseau est présent à Puydarrieux le 23/03 (VDu). La migration pré-nuptiale est notée du 7/05 au 16/06 sur le littoral, avec un attardé le 17/06 à Puydarrieux (VDu). La migration post-nuptiale débute le 7/08 au Courant d'Huchet (FCa), avec 7 oiseaux au large d'Hendaye le 12/10 (GoL).

Sterne de Dougall *Sterna dougallii**

Sterne arctique *Sterna paradisea*

LARIDAE

Mouette de Sabine *Xema sabini* (d=3)

Deux observations hivernales pour cette espèce : 2 oiseaux le 1/11 et un le 21/12 à Capbreton (FCa). Un oiseau est vu, toujours à Capbreton, le 25/05 à une date inhabituellement tardive (FCa).

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* (d=24)

Au large de Capbreton, jusqu'à 787 oiseaux de passage le 1/11 (FCa). Le 25/05, 14 individus sont encore présents à Capbreton (FCa). Retour à partir du 14/09 à Ustaritz (GoL).

Goéland railleur *Chroicocephalus genei**

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* (d=371)

Durant l'hiver, des groupes importants sont notés : 1800 à Anglet le 3/02 (FCa), 210 à Ciboure le 14/01 (GoL) et 500 à Pey le 21/02 (FCa). L'espèce est observée à l'intérieur des terres : à Bours où 20 oiseaux sont présents le 16/03 (SPé) et Denguin où des accouplements sont vus le 2/05, sans suite (JIG). Apparemment pas de tentative de reproduction à Artix, site qui semble de moins en moins fréquenté par l'espèce en conséquence des crues printanières récurrentes (SDu, JIG). Au moins 3 couples ont niché à Biron, avec encore 2 couveurs le 8/07 (SHo, JBo).

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* (d=76)

L'espèce est vue régulièrement au cours de l'hiver avec un effectif important de 156 oiseaux le 1/11 au large de Capbreton (FCa). Dernières observations le 3/04 à Orx (RSm) et retour dès les 20/09 et 7/10 à Puydarrieux (VDu). À noter qu'un oiseau est présent du 5/12 au 29/12 à Bours, à l'intérieur des terres (SPé).

Mouette atricille *Larus atricilla***

Mouette de Franklin *Larus pipixcan***

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* (d=151)

Présence régulière sur l'ensemble du littoral, avec quelques effectifs importants : 165 individus le 17/12 (coll GOPA) et 350 le 21/12 (FCa) sur le lac d'Hossegor, 200 à Anglet le 11/02 suite à un coup de vent (FCa). Le dernier oiseau est noté le 31/05 à Anglet (GoL) et retour post-nuptial à partir du 13/07 à Plaiaundi avec un groupe de 7 individus (AHG). Aucune observation hors zone littorale.

Goéland d'Audouin *Larus audouini**

Goéland cendré *Larus canus* (d=12)

Des observations régulières d'isolés, du 13/12 au 6/03 où le dernier oiseau est noté à Urcuit (FCa).

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis** (d=1)

L'unique donnée pour cette année est celle d'un adulte à Hendaye le 18/11 (AHG).

Goéland brun *Larus fuscus* (d=197)

Les effectifs les plus importants sont notés le 2/02 à Tarnos et Hossegor avec 310 oiseaux sur chaque site (FCa) et le 11/02 à Anglet avec 1000 individus, suite à un coup de vent (FCa). Un individu bagué en juillet 2012 en Hollande est observé le 3/11 à Bayonne (GoL). Présence jusqu'au 2/06 avec encore 3 oiseaux au Boucau (GoL) ; retour à partir du 19/07 à Rivière-Saas-et-Gourby (FCa). Pas d'observation à l'intérieur des terres cette année.

Goéland argenté *Larus argentatus* (d=17)

L'espèce est présente jusqu'au 2/03. Des groupes de 6 oiseaux le 23/11 (GoL) et 4 le 13/01 (FCa) en baie de Txingudi. Le retour postnuptial s'effectue à partir du 5/09 à Plaiaundi (JIG, ANe).

Goéland leucophée *Larus michahellis* (d=343)

Durant la période hivernale des effectifs très importants sont notés, principalement sur le site d'enfouissement de déchets de Saint-Pée-sur-Nivelle : 3000 oiseaux le 7/11 et le 27/11 (AHG), 3510 le 6/01 (GoL) et 4000 le 11/03 (FCa). Début de la nidification le 19/04 sur la colonie d'Hendaye (SDu, GoL). Présence d'oiseaux en train de couvrir au lac de Léon le 20/04 (SDu, FCa) et un nid sur la gravière d'Abos le 2/05 (JIG) ; un couple est également vu au lac de Puydarrieux en période de reproduction (GDu). À l'intérieur des terres, 5 oiseaux le 1/11 sur le lac du Gabas (GDu) et 20 le 28/10 à Bénéjacq (JIG). Un immature le 15/07 au col du Pourtalet à 1800 m d'altitude, volant en direction du Sud (JIG).

Goéland pontique *Larus cachinnans** (d=2)

Seulement deux observations pour cette année : un oiseau de deuxième année en baie de Txingudi le 13/01 (FCa) et un adulte sur le lac d'Hossegor le 2/02 (FCa).

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides**

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus** (d=1)

Un oiseau de 1^{er} hiver, observé à Hendaye le 19/03 (AHG), constitue la seule donnée pour cette année.

Goéland marin *Larus marinus* (d=110)

Comme tous les ans, l'espèce est présente en période hivernale avec des effectifs réduits. Les maxima sont de 13 oiseaux en baie de Txingudi le 13/01 et de 20 à Anglet le 11/02 suite à un coup de vent (FCa). Quelques observations tardives : le 25/05 au lac d'Hossegor et à Capbreton où quelques oiseaux sont encore présents (FCa) ainsi que le 29/06 à Ciboure (AHG). Retour à partir du 7/08 au Courant d'Huchet (FCa).

COLUMBIDAE

Pigeon biset domestique *Columba livia* (d=130)

La plus grosse concentration relevée est de 400 individus le 2/06 à Boucau (GoL). Un nid contient 2 poussins le 9/05 à Ustaritz, ce couple ayant à nouveau élevé au moins 3 nichées successives (GoL).

Pigeon colombin *Columba oenas* (d=17)

Très peu de données reçues. Des hivernants sont signalés à Nabas (2 le 28/11 et 1 le 12/12, SDu), Benquet (un groupe de 100 le 9/12, CIC) et Artix (1 le 17/01, JIG & JjH). Deux migrateurs prénuptiaux le 25/03 à Saint-Martin-de-Hinx (coll. GOPA). Le passage postnuptial débute précocement par l'observation d'un individu le 28/08 au col de Soulor, avec des groupes de 13 le 22/09 et 49 le 18/10 sur ce site (JIG).

Pigeon ramier *Columba palumbus* (d=289)

Les derniers mouvements postnuptiaux sont observés les 11/11 à Cazères-sur-l'Adour (CIC) et 23/11 à Orx (JFe). Des groupes de 10000 hivernants (dont un individu leucistique) sont signalés le 12/12 à Nabas (SDu), 5000 le 30/12 à Limendous (ANa), 20000 le 11/01 à Goès (RSm) ou 5000 le 3/02 à Luquet : l'hivernage a été inhabituellement abondant en Béarn, à la faveur semble-t-il d'une forte production de glands.

En migration prénuptiale, premiers mouvements le 27/02 à Arjuzanx (PUT). Pour ce qui est de la

reproduction, le premier chant est signalé le 26/02 à Aureilhan (DRa) et la construction du nid notée les 6/03 à Uzein (JIG) et 20/03 à Mendive (AAn). L'espèce atteint à cette période l'altitude de 1800 m à Laruns (JIG, CIC).

Le passage postnuptial débute tardivement, le 18/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), Ustaritz (Gol) et au col de Soulor (JIG), puis se poursuit jusqu'à la fin du mois.

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* (d=226)

À Bénéjacq, accouplement observé le 13/11, récolte de matériaux pour le nid le 23/11, nouvel accouplement le 12/03 et couvaision le 4/04 (JIG). La couvaision est constatée aussi le 22/03 à Morcenx (PUT) et des jeunes à peine volants signalés les 25/04 à Montaner (FBa), 11/05 à Larressorre (GoL), etc. ; d'autres sont encore nourris au nid le 29/06 à Anglet (FCa). Regroupements de 78 individus en pré-dortoir le 22/11 à Saint-Martin-de-Seignanx (GoL) et de 31 le 2/09 à Bénéjacq (JIG). En montagne, une observation à 1540 m le 1/03 au jardin botanique de Barèges (PMi) mérite d'être mentionnée. Un individu leucique est signalé le 2/06 à Anglet (GoL) et un oiseau en migration active le 27/10 à Messanges (FCa).

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (d=65)

Forte diminution du nombre de données par rapport à la période précédente, en raison probable des conditions météorologiques épouvantables du printemps 2013. Les premiers individus sont de retour les 13/04 à Momas (ANa), 15/04 à Ustaritz (GoL) et 18/04 à Siarrouy (FBa). Un chanteur le 9/05 à 1400 m d'altitude à Lées-Athas était certainement en halte migratoire (SDu) ; à noter par contre un chanteur le 18/05 à Lau-Balagnas dans un milieu propice à la nidification (PMi). Aucune donnée sur la reproduction, l'espèce n'étant mentionnée que sur 14 communes à cette période (divers obs.). Quelques individus en migration active sont signalés entre le 24/08 à Bénéjacq (JIG) et le 28/09 à Messanges (FCa), dont un groupe de 5 le 31/08 à Montaner (FBa). Dernière mention le 3/10 à Anglet (FCa).

PSITTACIDAE**Perruche à collier *Psittacula krameri*****CUCULIDAE****Coucou geai *Clamator glandarius***

Un oiseau est observé le 8/09 à Saint-Martin-d'Arbéroue (J.C. Vignes/ Faune-Aquitaine).

Coucou gris *Cuculus canorus* (d=71)

Premiers individus printaniers les 19/03 à Clarac (FBa), 20/03 à Maurrin (FCa), 21/03 à Moliets-et-Maa (JFe) et 22/03 à Gardères (DLA). Présent en altitude en période de reproduction : Aydius le 25/04 à 1550 m (SDu). Dernier individu observé le 25/08 à Itxassou (FCa).

TYTONIDAE**Effraie des clochers *Tyto alba* (d=54)**

Les données de cette année couvrent à nouveau toute l'aire géographique du GOPA. Les seuls indices de reproduction rapportés se trouvent dans des granges au Pays Basque et sont liées à des recherches de pelotes de réjection (GoL). Les autres observations sont liées aux habitudes de chasse de l'espèce à proximité des routes.

STRIGIDAE**Petit-duc scops *Otus scops* (d=6)**

Les premiers de l'année sont entendus à Luz-Saint-Sauveur le 31/03 (M. Derbyshire *vide* CHo), à Sainte-Marie-de-Gosse le 12/04 (T. Deest *vide* PLe) et à Audaux le 23/04 (R. Dufau *vide* PLe). Un chanteur est à nouveau entendu à Sainte-Marie-de-Gosse le 09/06 (SéD), à 1.5 km du premier site. Il pourrait s'agir du même oiseau ou d'un deuxième mâle, la tendance aggrégative de l'espèce ayant déjà été démontrée en Espagne lors du retour de migration printanier. Les deux derniers contacts ont lieu à Saint-Sever le 22/06 (L. Saubesty *vide* PLe) et à Bardos le 09/07 (J.B. Etchebarne). Il est à remarquer que l'ensemble des sites précis où l'espèce est contactée présente des circonstances topographiques communes, en bordure de coteau.

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* (d=10)

Dans les Hautes-Pyrénées, un couple est observé près de Lourdes les 31/01 et 30/10 (DRa). À l'est de ce département, des accouplements sont notés le 05/02 et 2 juvéniles seront ensuite observés le 02/06 (DRa). Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'espèce est vue à Sare les 06/03 et 30/08 (JfG), et sur la commune de Laruns (alt. 1950 m) en début de matinée les 8, 11 et 15/07, avec prédation d'un marmotton (JIG).

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* (d=8)

L'espèce est entendue à Sare (500 m) le 18/02 (AAn). Un individu est recueilli blessé le 17/02 à Narp (*vide* JBo) et un autre observé à Léréen les 30/06 et 12/07 (SDu, JBo) : cette commune est proche de Carresse-Cassaber où plusieurs individus avaient été recensés il y a quelques années. Une mention à Laslades le 02/04 (FBa). Enfin, jusqu'à 3 oiseaux ensemble sont observés les 10 et 15/08 à Louit (FBa), signalant très certainement la présence d'une famille.

Chouette hulotte *Strix aluco* (d=60)

Commune et contactée toute l'année sur l'ensemble du bassin de l'Adour ; jusqu'à 14 individus sont décelés sur un transect de 4 km le 18/02 en forêt de Sare (AAn). Un adulte et deux jeunes sont vus à Cambo-les-Bains le 25/05 (GoL).

Hibou moyen-duc *Asio otus* (d=12)

Un adulte est trouvé mort à Talazac le 24/11 (SPé). Un oiseau posé sur un fil est observé à Clarac le 01/01 (FBa), un autre en chasse le long d'une haie le 13/02 à Rabastens-de-Bigorre et un dernier à Gensac le même jour (DRa, JmF, FBa). Enfin, un oiseau est contacté le 11/04 à Uhart-Cize (AAn).

Hibou des marais *Asio flammeus* (d=3)

Contacts automnaux et hivernaux : le premier le 03/11 sur la dune de Tarnos (GoL), le deuxième le 15/12 à Puydarrieux (VDu) et le dernier le 09/01 à Labenne (EDu).

Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* (d=2)

Petite année, avec un seul contact direct de l'espèce à Accous d'un individu chanteur le 8/05 à 1650 m d'altitude (J. Démoulin / PNP

fide SDu). La deuxième donnée est un indice de présence avec une pelote de réjection récoltée le 7/06 à Arrens-Marsous à 1750m d'altitude (SDu).

CAPRIMULGIDAE

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* (d=18)

2/3 des données sont issues du massif landais. Ailleurs, observé principalement au Pays basque, dès les 06/05 à Villefranque et 17/05 à Ustaritz (GoL) ; également à Sare du 04/07 au 30/08 (SéD, JfG). Dernier le 17/09 à Clarac (FBa).

APODIDAE

Martinet noir *Apus apus* (d=135)

Premiers retours prénuptiaux à des dates relativement précoces : 23/03 à Bénéjacq (JIG) et 30/03 à Bayonne (FCa). Les installations sur les sites de nidification ont lieu à partir du 24/04 (FBa, MCh) alors que les passages de migrants se poursuivent jusqu'à fin mai (JIG, DRa). En période de reproduction, accouplements la première quinzaine de mai (divers obs.). Derniers individus les 25/08 à Itxassou (FCa) et 26/09 à Salles-sur-Adour (DRa).

Martinet pâle *Apus pallidus** (d=1)

Une seule observation : 4 oiseaux le 23/03 à Biarritz (ABi), site traditionnel de reproduction.

Martinet à ventre blanc *Apus melba* (d=4)

L'espèce est surtout observée dans le secteur « traditionnel » du cirque de Lescun : les 23/07 avec 5 individus (SDu, SHo, PUT) et 4/07 avec 3 oiseaux (JpP). Une observation en août au col de Soulor et une autre le 16/10 à Urrugne (MLB / OCL). Deux individus ont été observés pénétrant dans un interstice de l'église de Laruns en mai (M. Moulis *fide* PLe), constituant un indice sérieux de reproduction, mais les oiseaux n'ont pas été revus par la suite.

ALCEDINIDAE

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* (d=131)

En hiver, l'espèce est présente sur 33 communes (divers obs.) avec un maximum de 4 individus le 23/11 à Hendaye (GoL). Une seule donnée de reproduction avec un nid occupé à Clarac le 5/05 (FBa). À noter une observation à l'intérieur de la vallée d'Aspe (vallon de Gey) le 5/10 (SDu).

MEROPIDAE

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* (d=28)

Premiers retours prénuptiaux les 14/04 et 4/05 à Ger (JIG, JpP, GDu) et 5/05 à Clarac (FBa) ; groupes de 17 individus le 12/05 à Bénéjacq (JIG) et de 15 le 13/05 à Montgaillard-65 (DRa). En période de reproduction, micro-colonies à Saint-Jean-de-Marsacq (JfG), Aramits, Lanne-en-Barétous et Oloron avec nourrissage au nid le 5/08 sur ce dernier site (SDu). Le passage postnuptial débute le 22/08 à Montaner (FBa) pour se terminer le 22/09 à Tostat (SPé) et au col de Soulor avec 20 oiseaux sur ce site (JIG, CGu).

CORACIIDAE

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* (d=3)

Après la meilleure année de la décennie en 2012 avec 11 à 13 oiseaux différents, l'année 2013 est l'une des moins productives : un seul individu adulte est observé, avec une présence printanière certainement continue à Bénéjacq du 4/06 au 6/07 (CGr, JIG).

UPUPIDAE

Huppe fasciée *Upupa epops* (d=64)

Premiers retours printaniers les 19/03 à Léon (PLe) et Clarac (FBa), 20/03 à Montaner (FBa) et 22/03 à Tostat (SPé). Les premiers chants se font entendre dès fin mars (divers obs.). Nourrissages au nid les 10/05 à Séméac (DRa) et 18/05 à Tostat (SPé) ; envol de 5 jeunes le 30/06 à Moliets-et-Maa (JFe). L'espèce se reproduit à Argelès-Gazost (CHO). Dernière le 1/09 à Ustaritz (GoL).

PICIDAE

Nous rappelons que dans le cadre d'une étude à long terme, il est demandé de noter les caractéristiques principales des cavités de pics trouvées



Pour la deuxième année consécutive, l'**Aigle botté** est observé en hiver, parallèlement à plusieurs mentions tardives et précoces ces dernières années (photo P. NAVARRE).

Le statut hivernal du **Balbusard pêcheur** évolue également, avec une augmentation des effectifs et des secteurs fréquentés (photo P. NAVARRE).



L'**Autour des palombes** est attiré en hiver par les rassemblements d'oiseaux dans les zones humides aux pourtours boisés, comme Saint-Martin-de-Seignanx ou Puydarrieux (photo F. CAZABAN).





La reproduction de la **Spatule blanche** perdue à Orx, site historique, mais s'étend à d'autres sites des barthes de l'Adour : Saint-Martin-de-Seignanx, Heugas et Saint-Etienne-d'Orthe (photo J. BOUILLERCE).

Après la multiplication des observations postnuptiales et quelques cas d'hivernage, ainsi qu'une suspicion de reproduction, la nidification de l'**Ibis falcinelle** est attendue dans le bassin de l'Adour (photo F. CAZABAN).





En hiver, la **Mouette mélanocéphale** investit la haute mer et dans une moindre mesure le littoral : ici le reposoir traditionnel du lac marin d'Hossegor (photo F. CAZABAN).

Le **Héron pourpré**, en particulier juvénile, est parfois rencontré en automne dans divers milieux, humides ou non comme les prairies ou les champs moissonnés (photo F. CAZABAN).





Le nombre de couples connus d'**Élanion blanc** était inférieur à la dizaine au début des années 2000, il dépasse aujourd'hui la centaine, effectif forcément sous-évalué tant le secteur occupé est désormais vaste, les milieux fréquentés répandus et largement sous-prospectés (photo J. BOUILLERCE).



L'**Accenteur alpin** et le **Bruant fou**, nicheurs montagnards, effectuent tous deux une migration altitudinale pour hiverner, mais d'ampleur différente : l'accenteur ne dépasse pas le piémont, au contraire du bruant qui apparaît en plaine où il forme de petits dortoirs (photos : P. NAVARRE (accenteur) et D. RAGUET (bruant)).

(anciennes ou nouvelles) avec mention de l'espèce concernée, lieu, altitude, type de boisement, essence support du nid, hauteur de l'arbre et de la cavité, diamètre du tronc à 1,30 m et à hauteur de la cavité, condition de l'arbre (mort, étêté...), orientation de la cavité et position de celle-ci sur l'arbre (tronc ou branche). Des fiches à compléter sont disponibles à cet effet sur notre site internet ; une synthèse en sera faite dans notre revue dès que le nombre de données sera significatif (environ 1150 à fin 2013).

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* (d=21)

Premiers retours assez tardifs : 26/03 à Léon (PLe / RNNCH) et 14/04 à Morcenx (PUT). En période de reproduction, pour un couple bien suivi à Morcenx, envol le 9/06 de 3 juvéniles issus d'une première ponte et le 28/07 pour 2 jeunes d'une seconde ponte (PUT). Les premiers migrateurs postnuptiaux sont observés le 18/08 à Ger (JIG) avec des oiseaux contactés en altitude à Gavarnie (CHO) et Laruns (1920 m) (SDu). Derniers individus les 15/09 à Bésin-grand (ANa) et Montaner (FBa).

Pic vert *Picus viridis viridis* (d=279)

Premiers chants en février (divers obs.) puis début de creusement de cavité dans un hêtre le 22/03 à Soulom (JIG, CHO), seules données de reproduction ! Fin août, un jeune *viridis*, observé à Bénéjacq, possédait encore des chevrons bien visibles sur le corps et pas de masque facial (JIG).

Pic de Sharpe *Picus (viridis) sharpei* (d=1)

Une seule donnée pour ce taxon : Gavarnie le 23/09 (CHO). Un article récent (FAURE C., 2013. Etude et comparaison des chants du Pic vert *Picus viridis viridis* dans le Sud-Ouest de la France et du Pic de Sharpe *Picus viridis sharpei* dans le nord de l'Espagne. *Alauda*, 81 (3) : 209-225) souligne la quasi-impossibilité d'identifier au chant les taxons *viridis* et *sharpei* dans le Sud-Ouest. La conclusion de l'auteur est que « si, en moyenne, ces variables montrent une nette individualisation de *sharpei*, elles ne permettent pas... l'identification d'un individu sur le terrain dans la région considérée... » (voir la recension de cette publication dans la

Bibliographie passionnelle de ce volume). Il est donc indispensable d'observer l'oiseau pour lui attribuer une appartenance sub-spécifique, ce, d'autant plus que l'étude en question a été réalisée hors zone de sympatrie.

Pic noir *Dryocopus martius* (d=106)

En hiver, les membres d'un couple bien suivi à Ondres regagnent leurs loges respectives entre 17h25 et 18h05 alors que le 8/05 à Labenne, cela s'est produit à 18h20 (JfG). Premiers chants et tambourinements réguliers à partir de janvier (divers obs.), début de creusement de cavité précoce dans un pin mort, début février à Léon avec accouplement le 7/03 sur ce site (PLe / RNNCH), incubation à Labenne le 21/04 (JfG) et à Lourdios-Ichère le 6/05 (JIG), jeunes encore au nid le 19/05 à Labenne (JfG) et près de l'envol le 26/05 à Léon (PLe / RNNCH). La phénologie de reproduction de l'espèce dans les Landes semble très proche de celle de la population de montagne : envol des juvéniles de fin mai à début juin.

Pic épeiche *Dendrocopos major* (d=200)

Tambourinements à partir de fin décembre, devenant réguliers en février (divers obs.), début de creusement de cavité le 27/03 à Bénéjacq (JIG), début de ponte le 11/04 pour un envol des juvéniles les 21 et 22/05 (JIG), jeunes encore au nid le 31/05 à Noguères et à Monein (FCa) et le 5/06 à Rabastens-de-Bigorre (SPé). En altitude, l'espèce est observée à 1550 m à Beyrède-Jumet le 5/06 et à 1640 m à Arrens-Marsous le 7/06 (SDu).

Pic mar *Dendrocopos medius* (d=48)

Premiers chants les 31/12 à Moulédous (FBa) et 10/01 à Aurensan (SPé). Pour deux couples suivis à Bénéjacq, cavité presque terminée les 5 et 22/04 (JIG), début des nourrissages le 14/05 et envol des jeunes les 3-4 juin (JIG). Nidification certaine à Argelès-Gazost (CHO) ; nouvelles localités : Hosta (AAn), Sénac (DRa), Lagarde et Castelvieilh (FBa). L'espèce a été contactée à Soulom à 1100 m (JIG, CHO) ainsi qu'en hêtraie pure en vallée de Lourdios-Ichère sur deux sites (JIG).

Pic de Lilford *Dendrocopos (leucotos) lilfordi* (d=24)

Parades et tambourinements à Lourdios-Ichère le 3/04 pour un couple qui ne se reproduira pas, et creusement de cavité le 17/04 à Osse-en-Aspe, sans suite (JIG). L'espèce a été observée en marge nord de son aire de répartition le 4/07 sur la montagne du Rey (Louvie-Juzon) (SDu) et près du col du Pourtalet, à l'étage supra-forestier le 3/06 (JIG).

Pic épeichette *Dendrocopos minor* (d=60)

Chants dès le 30/12 à Clarac (FBa) puis premiers tambourinements réguliers à partir de mi-février (divers obs.). Aucune donnée de reproduction pour cette espèce encore très présente dans les Barthes de l'Adour et en bordure des gaves, mais devenant dangereusement rare dans les forêts de plaine béarnaises et bigourdanes.

FALCONIDAE

Faucon crécerellette *Falco naumanni** (d=1)

Un individu a été observé le 18/08 au col de Soulor (MLB / OCL).

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (d=178)

Un couple est déjà cantonné le 30/01 à Sare (AAn) et un autre le 31/03 à 1600 m d'altitude à Accous (SDu, SLe). Accouplement les 22/04 à Trébons (DRa), 16/05 à Salles (PMi) et 5/06 au col du Pourtalet à 1850 m (JIG), jeunes au nid le 1/06 à Charritte-de-Bas (FCa) et 4 jeunes récemment envolés le 16/08 à Anglet, date tardive (GoL). Quelques migrateurs postnuptiaux sont signalés les 22/09 au col de Soulor (DRa, CGu, JIG), 3/10 à Anglet et Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 13/10 de nouveau au col de Soulor (DRa).

Faucon kobez *Falco vespertinus** (d=2)

Une femelle fait halte les 30/04 et 1/05 à Moulédous (FBa) et un juvénile est observé le 25/08 au col de Soulor (MLB / OCL).

Faucon émerillon *Falco columbarius* (d=28)

Les observations hivernales (novembre-février) concernent 15 communes de plaine (divers obs.), avec 12 individus en dortoir le 15/12 sur la lande de Ger (coll. GOPA). Dernière observa-

tion printanière le 6/04 à Peyrehorade (PLe). Le passage postnuptial débute tardivement les 8/10 à Puydarrieux (VDu) et 9/10 à Montaner (FBa). Nouvelle observation d'un individu migrant en pleine mer, le 19/10 au large de Saint-Jean-de-Luz (FCa).

Faucon hobereau *Falco subbuteo* (d=115)

Chute drastique du nombre de données reçues. Premiers retours les 31/03 à Tarnos (SéD), 10/04 à Oloron-Sainte-Marie (RSm) et 11/04 à Larcèveau-Arros-Cibits (GoL), avec des groupes de 13 le 23/04 à Saint-Barthélémy (SDu, JIG) et 10 le 2/05 à Denguin (JIG). En période de reproduction, un couple cantonné dès le 22/04 à Jatxou (GoL), regroupement de 8 individus chassant des insectes le 24/06 à Abos et des jeunes volants très bruyants le 21/08 à Lacq (SDu). Le premier migrateur postnuptial est signalé le 9/08 au col de Soulor (JIG). Dernières observations les 13/10 au col de Soulor et 14/10 à Angos-65 (DRa). Des prédatons (ou tentatives) sont signalées sur des limicoles (AHG), l'Étourneau sansonnet, le Martinet noir (DRa), la Bergeronnette grise (PUT) et l'Hirondelle rustique (JIG).

Faucon d'Éléonore *Falco eleonora** (d=5)

Observations groupées d'individus isolés les 24/08 à Garrosse (PUT), 4/09 à Anglet (FCa), 6/09 à Jatxou (GoL) et 9/09 à Itxassou (FCa), puis très tardivement le 28/10 à la Pierre-Saint-Martin (JIG).

Faucon lanier *Falco biarmicus***

L'observation du 6/10/2012 à Messanges signalée dans les précédentes N.O.P. ayant été refusée par le C.H.N., le Faucon lanier ne peut être admis sur la liste des oiseaux du bassin de l'Adour.

Faucon sacre *Falco cherrug*** (d=1)

Un individu est observé le 14/01 à Montaner, perché sur un pylône électrique puis en vol (FBa) : « gros faucon couleur crécerelle avec tête pâle, longue queue, attaqué par un Pèlerin très petit en comparaison, manteau brun chamois en vol » (sous réserve d'homologation par le CHN).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* (d=111)

Un migrateur tardif le 20/11 à Messanges (GoL). Des hivernants sont rencontrés dans 21 localités de plaine (novembre-février), l'un d'entre eux étant encore présent le 16/04 à Pontonx-sur-l'Adour (JFe). Une tentative de prédation sur un élanion est observée le 29/01 à Ansost, au crépuscule (DRa). Quelques mentions en plaine en période de reproduction (mai), à Sénac (DRa), Bours (SPé) et Bénéjacq (JIG). Accouplements les 30/01 à Boucau (ABi) et 10/03 à Agos-Vidalos (DRa). Des individus cantonnés sont signalés en 17 localités, dont Castagnède où le couple produit au moins 2 jeunes (PLe).

ORIOLIDAE**Loriot d'Europe *Oriolus oriolus*** (d=71)

Premiers retours printaniers les 3/04 à Saint-Martin-de-Seignaux (FCa), 16/04 à Tostat (SPé) et 18/04 à Eysus (SDu). Aucune donnée de reproduction d'intérêt pour cette espèce très discrète à cette époque. Derniers les 11/08 à Ustaritz (GoL), 12/08 à Renung (CIC) et 19/08 à Aurensan (SPé).

LANIIDAE**Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio*** (d=74)

Première précoce le 24/04 à Bidarray (GoL) puis les 1/05 à Ger (JIG), 2/05 à Bénéjacq (CGr) et à Puydarrieux (VDu). En période de reproduction, parades les 5/05 à Ger avec offrande de nourriture (JIG) et 11/05 à Cambo-les-Bains (GoL), juvéniles volants les 4 et 15/07 sur deux sites de Beuste (CGu), 5/08 à Oloron (SDu), 7/08 à Accous et 9/08 à Bedous (GeL, SBZ). En juin-juillet, l'espèce est observée dans le secteur du col du Pourtalet entre 1700 et 1800 m d'altitude (JIG). Derniers migrateurs postnuptiaux les 27/09 à Luquet et 28/09 à Ger (JIG).

Pie-grièche grise *Lanius excubitor* (d=2)

Un individu est observé à Ger le 5/10, sans suite (JIG), et un autre le 5/01 au pic de Béhorléguy (LGo).

Pie-grièche méridionale *Lanius meridionalis* (d=1)

Nid de **Pie bavarde**, sans dôme, sur un pylone électrique à Séméac (photo D. RAGUET).

Une seule donnée ponctuelle d'un individu le 11/02 à Oloron (SDu), où elle aurait été observée tout l'hiver (SHo).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* (d=10)

Première printanière précoce, le 19/04 à Ibos (ANa) puis le 6/05 à Moliets-et-Maa (PLe / RNNCH). Une femelle est observée à Ger, côte-à-côte avec une Pie-grièche écorcheur mâle le 26/05 puis le 4/08 avec 3 juvéniles (possibilité de couple mixte) (JIG). Dernières le 12/09 à Moulédous (FBa) et le 21/09 à Ger (JIG).

CORVIDAE**Chocard à bec jaune *Pyrhocorax graculus*** (d=19)

Très peu de données reçues. Les plus grands groupes signalés rassemblent 250 individus le 13/02 à Bielle (RSm) et 340 le 15/06 à Larrau (AAn). En piémont, un couple est de nouveau signalé le 5/05 sur le Pic du Jer à Lourdes (GDu, VDu, FBa). Des jeunes au nid (dans un gouffre) sont entendus le 6/08 à Laruns à 1930 m (SDu).



La présence d'un couple de **Chocard à bec jaune** au Pic du Jer à Lourdes est étonnante, car il s'agit d'une espèce montagnarde, se reproduisant essentiellement à l'étage subalpin, à l'exception du Pays Basque où les colonies les plus occidentales s'observent à 500-600 m (photo P. NAVARRE).

Crave à bec rouge *Pyrrhonorax pyrrhonorax* (d=67)

Au maximum 50 le 10/11 à Bielle (SDu), 94 le 13/02 à Villelongue, 68 le 4/03 à Lourdes (GDu), 150 le 14/03 à Trois-Villes (SDu), rassemblements favorisés par l'enneigement exceptionnel de l'hiver 2012-2013. La construction des nids est observée à Saint-Etienne-de-Baïgorry (875 m) du 8/03 au 24/04, date où la couvaison est constatée pour 2 couples ; des jeunes volants y sont signalés le 6/07 (AAn). Un nid contient 3 jeunes prêts à l'envol le 24/06 à Estérençuby à 950 m (GoL).

Pie bavarde *Pica pica* (d=316)

Rassemblements de 30 individus à Ger le 17/11 (JIG) et 24 à Ustaritz le 8/02 (GoL). Des transports de branches au nid sont observés en plein hiver, les 14/12 à Saint-Vincent-de-Paul (PUT) et 24/12 et 14/01 à Tarbes (GDu, VRe), puis sur divers sites à partir de la mi-février. Accouplement le 24/04 à Bénéjacq, où 3 jeunes

prennent leur envol le 24/05 (JIG). Un nid occupé est découvert le 4/05 sur un pylône électrique à moyenne tension à Séméac (DRa). En montagne, l'espèce atteint 980 m le 28/12 à Alçay-Alçabéhéty-Sunharette (FCa), 1474 m au col de Soulor (JIG, ANa, CGu) et 1800 m tout l'été au col du Pourtalet (JIG).

Geai des chênes *Garrulus glandarius* (d=329)

Très peu de données d'intérêt reçues. La construction d'un nid dans le chêne d'un jardin est signalée le 23/04 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL). Le transport de nourriture est noté dès le 2/04 à Téthieu (FCa), puis les 2/06 à Bérenx (PLe) et 3/06 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL) ; enfin un jeune récemment envolé est observé le 4/07 à Rabastens-de-Bigorre (SPé). L'espèce atteint l'altitude de 1770 m le 7/06 à Arrens-Marsous (SDu).

Cassenois moucheté *Nucifraga caryocatactes**



Le **Geai des chênes** est très commun dans tous les boisements de la région, même ceux de montagne qu'il fréquente jusqu'à la limite des forêts (photo P. NAVARRE).

Choucas des tours *Corvus monedula* (d=36)

En période hivernale, présence reportée à Bordes-65 (FBa), Clarac (VDu), Ibos, Lourdes avec jusqu'à 68 individus le 22/02 (GDu), Mauvezin avec 31 individus le 3/02, Tostat, Maubourguet (SPé), Ossun (ANa), Montaner (FBa) et Betplan avec 41 individus dans un groupe mixte avec des freux le 12/02 (JmF). Un couple s'est reproduit à Ossun, où des transports de matériaux sont observés les 17/03 et 26/04 et des jeunes volants le 23/06 (ANa) ; des observations en période de nidification sont également effectuées dans les communes voisines d'Ibos (ANa) et Azereix (GDu). Le couple de Montgaillard est de nouveau présent en 2013 (DRa). Un groupe de 18 migrateurs postnuptiaux le 27/10 à Clarac (FBa) et un de 16 individus le lendemain à Puydarrieux (VDu), potentiellement les mêmes.

Corbeau freux *Corvus frugilegus* (d=4)

Très peu de données reçues : 18 le 4/11 à Chelle-Debat (VDu, FBa), 8 le 16/12 à Trie-sur-Baïse

(DRa), 27 le 17/01 à Maubourguet (SPé) et 133 à Betplan le 12/02 (JmF).

Corneille noire *Corvus corone* (d=689)

Quelques rassemblements importants sont signalés : 75 le 11/11 à Lussagnet et autant le 9/12 à Benquet (CIC), 100 en dortoir le 29/12 à Argelès-Gazost (PMi), 50 le 8/01 à Saint-Jean-de-Marsacq (GoL). Un nid est en construction dès le 3/02 à Ustaritz (GoL) et un oiseau est en position de couveur dès le 12/03 à Bénéjacq (JIG) ; les premiers jeunes volants sont observés le 31/05 à Lay-Lamidou (PLe) mais 2 jeunes sont encore au nid le 4/07 à Momères (DRa).

Corneille mantelée *Corvus cornix**

Grand Corbeau *Corvus corax* (d=142)

En plaine, on notera des signalements à Hendaye, Jatxou, Arcangues, Bassussarry, Ustaritz, Saint-Pierre-d'Irube, Villefranque, Anglet, Tarnos, Briscous (GoL), Bidart, Saint-Martin-de-

Seignanx (FCa), Sainte-Marie-de-Gosse, Orist, Labatut, Sus (PLe), Lasseube (SDu), Lucq-de-Béarn (FCa), Lagos avec 10 individus le 9/07 (CGu), Bénéjacq, Ger (JIG), Ossun, Azereix (GDU), Talazac où 2 individus sont posés sur un pylone haute-tension supportant un nid possiblement de cette espèce (JmF), Antist, Aureilhan, Poumarous, Saint-Martin, Trébons, Vidou (DRa), Bernadets-Dessus, Castelvieux, Lespouey (FBa) et Tostat (SPé). La décharge de Saint-Pée-sur-Nivelle regroupe au maximum 22 individus le 6/01 (GoL), seul site de rassemblement signalé cette année. La recharge des nids en matériaux est observée les 8/03 à Saint-Etienne-de-Baïgorry, 17/04 à Alçay-Alçabéhéty-Sunharete et 18/04 à Béhorléguy (AAn) ; un nid contient au moins 2 jeunes le 24/04 à Bidarray (GoL).

REGULIDAE

Roitelet huppé *Regulus regulus* (d=31)

Présent en hivernage en plaine comme en montagne avec des données par exemple à Onesse-et-Laharie (PUT), Bésingrand (ANa) ou Saint-Martin-de-Seignanx (GoL). En altitude, présence hivernale jusqu'à 1574 m à Arrens-Marsous (GDU). La limite basse en période de reproduction est cette année de 452 m à Aramis (FCa).

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* (d=218)

Maximum hivernal de 16 à Anglet le 28/01 (GoL). Les oiseaux sont décelés en période de reproduction à l'unité ou en petits groupes familiaux comme à Monein et à Saucède le 31/05 (FCa, SLe), à Etcharry le 01/06 (FCa) ou à Biarritz le 06/06 (GoL). Les records d'altitude pour des mâles chanteurs atteignent 1450 m à Léas-Athas le 09/05 et 1640 m à Arrens-Marsous le 07/06 (SDu). Des nourrissages très tardifs au sein d'un groupe familial (jeunes bien volants mais encore en plumage juvénile) sont observés le 07/09 à Sarre (JmF). Premier rassemblement automnal de 15 à Messanges le 26/10 (FCa).

REMIZIDAE

Rémiz penduline *Remiz pendulinus* (d=12)

L'espèce a été contactée en plusieurs sites durant le mois de novembre 2012 : Léon avec 7 individus (PLe / RNNCH), Anglet (FCa), Villefranque (FCa, GoL) et Hendaye (GoL), semblant tous correspondre à des migrateurs tardifs. L'observation du 25/01 à Puydarrieux (VDu) est bien plus étonnante (hivernants ?). Au printemps, l'espèce n'est observée qu'à Léon les 8/03 et 15/04 (PLe / RNNCH). Passage postnuptial du 8 au 27/10 (VDu, FCa, PLe).

PARIDAE

Comme indiqué l'année précédente, la famille des Paridés, constituée d'espèces communes, fait l'objet d'un manque flagrant d'intérêt pour ce qui concerne les divers aspects de son comportement reproducteur (phénologie, sites, nombre de juvéniles, etc.).

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* (d=439)

Les chants débutent à mi-février (divers obs.) puis apports de matériau de nid le 27/03 à Bénéjacq, dans une cavité naurelle de merisier (JIG), nourrissage au nid le 13/05 à Montgaillard (DRa) et juvéniles juste volants le même jour à Bénéjacq (JIG) et le 13/06 à Ustaritz (GoL), seules données de reproduction reçues. L'espèce est observée à 1820 m d'altitude le 10/08 sur la commune de Laruns (CIC).

Mésange charbonnière *Parus major* (d=599)

Chants à partir de fin janvier (divers obs.) puis visite de cavité de Pic épeiche le 4/04 à Bénéjacq (JIG), apports de matériau de nid le 6/04 à Pau (JjH), nourrissage au nid début mai, envols à partir de mi-mai (divers obs.).

Mésange huppée *Lophophanes cristatus* (d=91)

Les seules données d'intérêt reçues concernent la construction de nids dans des cavités naturelles les 13/04 à Lourdios-Ichère (JIG) et 21/04 à Moliets-et-Maa (coll. GOPA).

Mésange noire *Periparus ater* (d=48)

Hivernage en plaine se terminant fin mars-début avril (divers obs.). Chants réguliers à partir de mi-février (divers obs.). En période de reproduction, nourrissages au nid les 25/04 à

Luz-Saint-Sauveur (GDu) et 26/05 à Saint-Etienne-de-Baïgorry (FCa).

Mésange nonnette *Poecile palustris* (d=181)
Premiers chants début février (divers obs.), visite de cavité de Pic mar le 27/03 à Bénéjacq (JIG), transport de matériau de nid le 1/05 à Puydarrieux (GDu) et nourrissage au nid le 17/04 à Estérençuby (AAn), seules données d'intérêt reçues pour cette espèce.

TIMALIIDAE

Léiothrix jaune *Leiothrix lutea* (d=39)
Signalé dans 25 communes, dont Sainte-Marie-de-Gosse (coll. GOPA), Rivehaute, Ossas-Suhare, Saint-Jean-Poudge (SDu), Luquet (JIG), Lugagnan, Saint-Créac (GDu), Clarac avec une troupe de 20 individus le 17/08 (FBa) et Puydarrieux (VDu).

PANURIDAE

Panure à moustaches *Panurus biarmicus**

ALAUDIDAE

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla** (d=1)

2 individus observés sur la dune de la Réserve naturelle du Courant d'Huchet le 3/06 (PLe), pouvant signifier une tentative de nidification sur ce site.

Cochevis huppé *Galerida cristata* (d=22)

Des indices de reproduction ne sont relevés que sur les sites dunaires du littoral, Tarnos, Anglet, Moliets-et-Maa (GoL, FCa, EDu, ANa), l'espèce y étant contactée tout au long de l'année. Ailleurs dans la région, seul le secteur de Tarbes apporte des observations : 1 à Sénac le 6/12 sur une ancienne plate-forme pétrolière, 1 à Soues le 3/01 dans une zone industrielle (DRa) et 3 à Ibos le 7/08 dans une zone d'activités commerciales où la nidification est possible (CHo).

Alouette lulu *Lullula arborea* (d=32)

Quelques groupes constitués sont notés en automne et en hiver, surtout dans la zone des coteaux : 10 à Moulédous le 18/11, 19 à Clarac

le 8/12, 20 à Montaner le 17/01 (FBa). La migration pré-nuptiale est détectée essentiellement au mois de février, dont une troupe de 15 à Ustaritz le 15/02 (GoL). La présence avec indice de reproduction est notée en mai à Onesse-et-Laharie (PUT), rien par ailleurs ! La migration d'automne est constatée à partir du 7/10 au col de Soulor (JIG) puis s'étale tout au long de ce mois en de nombreux points du bassin de l'Adour.

Alouette des champs *Alauda arvensis* (d=126)

Encore de la migration résiduelle au début du mois de novembre, puis des troupes d'hivernantes sont notées çà et là dans les plaines, comprenant plusieurs dizaines d'individus, 125 pour la plus importante à Chis le 5/12 (SPé). La migration pré-nuptiale semble être à son maximum dans la deuxième quinzaine de février. Des indices de nidification sont rapportés sur 12 communes de la montagne et du piémont. Au col du Pourtalet (1850 m), des alouettes chanteuses fin mai sont toujours présentes sur leur site de reproduction au début de septembre (SDu). Les mouvements post-nuptiaux débutent dans les derniers jours de septembre sur le littoral pour culminer un mois plus tard autour du 25/10, un max de 1200 à Messanges le 27/10 (FCa).

Alouette haussecol *Eremophila alpestris**

HIRUNDINIDAE

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (d=40)

Les premières apparaissent le 18/03 à Léon (PLe) et Bours (SPé), le passage culminant dans la première décennie d'avril : notamment 150 à Saint-Martin-de-Seignaux le 8/04 (FCa). Des preuves de nidification sont apportées sur des gravières à Biron (PLe) et Abos (JIG) en mai et juin. La migration d'automne débute en août, s'intensifie début septembre avec 300 à Messanges le 2/09 (FCa) ou 20 à Artix le 7/09 (ANa) ; en octobre les données sont sporadiques, la dernière est notée le 24/10 à Bézingrand (JIG).

Hirondelle de rochers *Hirundo rupestris* (d=28)



L'**Hirondelle rustique** se reproduit en montagne dans de nombreux villages jusqu'aux alentours de 1000 m, très ponctuellement au-dessus (photo F. CAZABAN).

L'espèce est présente en hiver sur les sites avoisinant Artix et le Gave de Pau (JIG, ANa, FCa), observée également en fin d'hiver à Nay et Oloron-Sainte-Marie (JIG). Une dizaine de sites sont signalés pour accueillir cette hirondelle en période de nidification entre les premiers jours d'avril et la dernière décade de juin. La présence de nids est constatée sous des structures de paravalanches dans les gorges de Luz (Chèze) le 25/04 (GDu). Nicheuses également dans une grotte à Estérençuby et sur un fronton à Arnéguy avec trois nids (GoL), ainsi qu'à Nay avec 3 juv. volants le 25/06 (CGu). Les données estivales correspondent probablement à des petits rassemblements d'oiseaux autochtones.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* (d=270)
Plusieurs notées encore au cours du mois de novembre, la dernière le 27/11 au marais d'Orx (PLe). La première printanière est vue à Bénéjacq le 20/02 (JIG) puis les arrivées sont régulières

à partir du 9/03 sur toute la région. La migration bat son plein au cours du mois d'avril, avec par exemple 200 à Saint-Martin-de-Seignanx le 8/04 (FCa) ou 200 sur la Nive à Ustaritz le 21/04 (GoL). La nidification est constatée largement sur la région concernée entre le 12/04 et le 20/08. À Montaner, localité de 240 foyers, l'espèce est notée nicheuse dans 15 habitations (FBa). Les regroupements de la fin août sont le prélude à la migration postnuptiale, qui commence dans la première décade de septembre ; un groupe de 800 est noté au lac du Gabas le 23/09, la dernière à Bénéjacq le 25/10 (JIG).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (d=71)

Les premières apparaissent les 16/03 à Biarritz (FCa), 18/03 à Bours (SPé) et 19/03 à Clarac (VDu) ; 80 à 100 sont observées au lac du Gabas le 29/04 lors du pic de migration printanière (JIG). Des indices de reproduction sont relevés

du 4/05 à Villefranque (GoL) au 18/08 à Navarrenx (FCa) où des jeunes sont encore nourris. À Montaner, localité de 240 foyers, l'espèce est notée nicheuse dans 10 habitations (FBa). Peu de rassemblements sont notés lors de la migration postnuptiale. Les dernières de l'automne se montrent les 10 et 15/10 à Bénéjacq (JIG).

Hirondelle rousseline *Cecropis daurica* (d=2)

Deux observations printanières au Huchet au sein de groupes d'Hirondelles rustiques, les 8/04 et 5/05 (PLe / RNNCH).

CETTIDAE

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (d=163)

Présente à l'année sur les zones humides de la côte landaise et du Pays basque, l'espèce remonte les cours d'eau et s'établit sur les étangs collinéens. Présente ainsi à Bours le long de l'Adour (DRa) et le long du gave de Pau. Les cours d'eau plus en amont pourraient ne pas satisfaire aux exigences de l'espèce en période de reproduction puisqu'aucun contact n'y est relevé, de même que sur le gave d'Oloron et ses affluents.

AEGITHALIDAE

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (d=275)

En hiver, troupes de 18 à Luquet le 28/12 et de 28 en 3 groupes à Baudreix le 5/01 (GDu). Les seules données de reproduction concernent la construction de nids les 16/03 à Bours (SPé), 22/03 à Lons (MCh) et 6/05 à Lées-Athas (SDu). Jusqu'à 32 individus comptés le 15/06 à Ger dans une troupe pluri-spécifique (JIG). L'espèce a été observée à 1480 m d'altitude le 11/08 à Lées-Athas (CIC).

PHYLLOSCOPIDAE

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus (d=4)**

Les contacts se concentrent sur l'arrière dune landaise entre Labenne et Messanges du 24 au 27/10 avec 4 individus (FCa). Un oiseau est également remarqué à Saint-Geours-de-Mareme le 20/10 (PLe).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (d=16)
Premier retour prénuptial le 31/03 à Tarnos (SéD) puis le 13/04 à Seignosse (PLe, S. Darblade) et Sarrance (SDu). Les données recueillies en période de reproduction concernent deux populations. Celle proche de la côte basque ou landaise avec des mentions classiques telles qu'Anglet (PUT) ou Soorts-Hossegor (FCa), et celle montagnarde plus méconnue dans la répartition avec des données à Lourdes (GDu, VDu, FBa), Villelongue et Aucun (CHo), Agos-Vidalos (PMi), Laruns (JIG), Lées-Athas et Urdos (SDu). Dernière mention de l'année le 18/07 à Argelès-Gazost (CHo).

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (d=4)
5 chanteurs sont notés à Soulom le 13/05 et encore 1 le 27/05 (CHo). Un mâle chanteur est entendu tardivement à Louvie-Soubiron (1300 m) le 01/07 (SDu, JmT) ainsi qu'à Louvie-Juzon (1120 m) le 04/07 (SDu).

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (d=436)
Très commun et présent toute l'année, la région accueillant des oiseaux venus du nord. Les premiers chants sont entendus à partir du 19/02 à Jatxou (GoL). La migration d'automne devient plus significative à partir du 28/09 avec notamment 50 oiseaux à Messanges ou 15 à Anglet les 03 et 07/10 (FCa).

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* (d=5)
Premiers le 03/04 à Hasparren (SéD), puis le 13/04 à Soustons (PLe). Autres contacts les 24/04 à Bidarray (GoL), 26/05 à Ixassou et 30/06 à Sare pour un chanteur mixte (FCa).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (d=62)
Espèce strictement migratrice sous nos contrées, le dernier contact en 2012 fut noté le 08/11 à Saint-Martin-de-Seignaux (FCa). Puis les premiers retours sont remarqués les 20, 23 et 27/03 à Bordères-et-Lamensans, Saint-André-de-Seignaux, Capbreton et Artix (FCa, JIG). Le dernier printanier est observé à Agos-Vidalos le 07/05 (JIG). Les précurseurs automnaux se signalent dès le 16/07 (GDu) puis les 03, 06 et 07/08 (JIG). Le passage se montre alors assez régulier jusqu'au dernier contact le 01/10 à Hendaye (FCa).

SYLVIDAE

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (308)

Présente sur l'ensemble de l'aire géographique, les altitudes les plus élevées atteintes par des chanteurs sont de 1700 m à Arrens-Marsous le 07/06 (SDu), ou de 1474 m à Arbéost (ANa). L'espèce s'élève en reproduction jusqu'à 1000 m au Pays basque (GoL). La migration automnale reprend courant août, des pics de passage se déroulant surtout en septembre-octobre, ainsi 15 vues le 28/09 à Messanges (FCa) ou 30 le 02/10 à Campan (JIG). Encore 15 le 26/10 à Messanges (FCa).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* (d=22)

Premier retour printanier le 10/04 (SéD), surtout contactée au chant. Elle atteint à Urdos l'altitude de 1150 m le 26/06 et 1450 m le 11/07 (SDu). La migration est surtout remarquée à partir de début septembre et s'achève le 02/10 avec un dernier oiseau à Campan (JIG).

Fauvette épervière *Sylvia nisoria***

Fauvette babillarde *Sylvia curruca**

Fauvette orphée *Sylvia hortensis** (d=1)

Une donnée à Mouguerre le 08/09 pour cette espèce rare dans notre région (ABi), constituant la 7^{ème} observation depuis 1960.

Fauvette grisette *Sylvia communis* (d=65)

Premières les 25/03 à Montaner (FBa) et 28/03 à Oloron-Sainte-Marie (RSm). Les chants retentissent à partir du 12/04 à Ger, où la reproduction s'étend jusqu'au 28/07 (ANa). Puis les premiers migrateurs sont décelés dès le 07/08 à Rébénacq (JIG). La dernière (tardive !) est notée à Anglet le 31/10 (FCa).

Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata**

Fauvette pitchou *Sylvia undata* (d=26)

La forêt landaise constitue le bastion de l'espèce dans la région avec des densités localement importantes, ainsi 15 individus à Messanges le 19/11 (GoL). Nourrissages le 15/05 à Onesse-et-Laharie et juvéniles fraîchement envolés le 07/06 (PUT), la reproduction sur le site est



L'étude de l'hivernage de la **Fauvette à tête noire** serait particulièrement intéressante à conduire, notamment pour déterminer les habitats exploités à cette saison (photo P. NAVARRE).

fortement perturbée par la pluie et la productivité en jeunes plus faible de moitié que les années précédentes (PUT). Dans le sud-ouest du Pays basque, la répartition de l'espèce est concentrée sur les landes entre 300 et 500m ; la reproduction y est confirmée (AAn, SéD). Une donnée d'hivernage plus à l'est à Montory est mentionnée le 15/12 (SDu) et correspondant au même type d'habitat. L'espèce hiverne en petit nombre également plus à l'est à Ger (GDu, coll. GOPA). Une donnée ponctuelle à Puydarrieux le 24/03 peut être rattachée à une migration printanière (VDu).

Fauvette passerinette *Sylvia inornata* (d=7)

Une femelle est observée le 25/04 à Estérençuby à 700 m d'altitude sans suite (AAn). Un mâle demeure au Pic de Jer à Lourdes à 900 m

La **Fauvette mélanocéphale** est aujourd'hui solidement implantée dans la région, un second noyau s'établissant également dans les Hautes-Pyrénées (photo S. TILLO).



d'altitude du 30/04 au 05/05 (GDu, CHo, FBa, VDdu).

Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* (d=21)

La population des Hautes-Pyrénées fournit des données en période de reproduction à Boû-Silhen (DRa) et à Lourdes au Pic de Jer (GDu, CHo, FBa, VDdu). Les autres données sont côtières, d'Hendaye à Capbreton (divers obs.).

LOCUSTELLIDAE

Locustelle tachetée *Locustella naevia* (d=10)
Premiers chanteurs à Onesse-et-Laharie le 12/04 (PUT) et à Puydarrieux le 16/04 (VDdu). La reproduction est confirmée à Onesse-et-Laharie avec une même femelle présentant une plaque incubatrice le 12/05 et le 02/06 (PUT). La migration d'automne apporte des données à Cieutat le 01/09 (FBa) et à Messanges du 02/09 au 28/09 (FCa).

Locustelle lusciniöide *Locustella luscinioides*

ACROCEPHALIDAE

Hypolaïs ictérine *Hypolaïs icterina**

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* (d=105)

Première, très précoce, le 23/03 à Garrosse (PUT), puis les 18/04 à Ustaritz (GoL) et 19/04 à Bénéjacq (JIG). Les premières femelles avec plaque incubatrice apparaissent tardivement le 22/06 à Onesse-et-Laharie et les premiers jeunes y sont capturés en juillet (PUT). Les premiers migrateurs postnuptiaux apparaissent déjà le 27/07 à Bénéjacq (JIG) ; la dernière est notée le 08/09 à Bayonne (GoL).

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* (d=3)

3 données hors baguage rattachées au passage postnuptial, à Messanges du 04/09 au 29/09 (FCa). Par ailleurs, 1 individu est capturé le 29/08 à Bayonne dans la barthe de l'Urdains (P. Fontanilles *et al.*).

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* (d=15)

Commun lors des passages migratoires, l'oiseau est toutefois assez peu décelé sans recherche spécifique. Retours les 4/04 à Saint-Vincent-de-Paul (FCa), 7/04 à Villefranque (STi) et 9/04 (à Orx (SDu). Un oiseau capturé le 29/04 à Messanges avec 28 autres était porteur d'une bague britannique (STi). Un mâle chanteur reste au moins jusqu'au 22/06 à Saint-Gein (CIC), seul site possible de reproduction. Les premiers migrateurs automnaux sont notés le 25/07 au lac de l'Ayguelongue (PhL) puis tous les jours du 8/08 au 5/09 (divers obs.). Des retardataires les 12 et 15/10 à Messanges (GoL, STi).

Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola***

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris**

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* (d=25)

Quelques attardées les 10 et 11/11 à Villefranque et Hontanx (FCa, GoL, CIC). Puis retour printanier à partir du 13/04 à Seignosse (PLe, S. Darblade). Pas d'information sur la reproduction cette année. Dernières à Messanges le 26/10 (FCa).

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

CISTICOLIDAE

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* (d=59)

Répartie sur les trois départements, de manière dispersée sauf sur quelques secteurs comme Messanges ou Villefranque (GoL, FCa). L'évolution des effectifs à Ger montre une augmentation régulière au cours de l'année avec l'apport des jeunes produits localement ; les effectifs y sont maximaux au cours de l'hiver (GDu), démontrant soit la présence d'hivernants dans notre région, soit de rassemblements hivernaux d'individus locaux.

BOMBYCILLIDAE

Jaseur boréal *Bombycilla garrulus (d=2)**



Jaseur boréal photographié à Saint-Paul-les-Dax en janvier 2013 (photo F. CAZABAN).

Les 8^{ème} et 9^{ème} données pour le bassin de l'Adour ont été obtenues lors de l'hiver 2012-2013 : un individu le 15/01 au Cirque de Litor (Arbéost) à 1300 m d'altitude (E. Champagne) et un autre du 29 au 31/01 à Saint-Paul-les-Dax (FCa).

TICHODROMADIDAE

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* (d=12)

En hivernage, l'espèce est observée sur les sites suivants de Bigorre : Pibeste (600 m), col d'Ech (800 m) (PMi), église de Luz-Saint-Sauveur (CHo) et Lortet (FBa, VDdu). En période de reproduction, les observations vont de 2040 à 2500 m d'altitude, avec transports de nourriture observés le 22/07 sur la commune de Lées-Athas (SHo, PUT, SDu).

SITTIDAE

Sittelle torchepot *Sitta europaea* (d=281)

Visite d'un nichoir dès le 28/01 à Moliets-et-Maa (JFe) puis le 8/03 à Aureilhan-65 (DRa), construction de nids du 8/03 au 12/04 avec utilisation de cavités de Pics épeiche, mar, de Lilford et noir (JIG), nourrissage au nid le 17/05 à Lourdios-Ichère (JIG, SHo).

CERTHIDAE

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* (d=13)

Espèce très peu documentée : à Osse-en-Aspe, nid dans une chandelle de hêtre avec nourrissage de la femelle par le mâle le 13/05, la femelle retournant au nid (JIG) et donnée de piémont remarquable, le 20/07 à Ance (SDu).

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* (d=285)

Premiers chants dès fin décembre (FBa, GoL), puis réguliers à partir de février (divers obs.). Les seules données de reproduction concernent un accouplement au sol, observé le 15/03 à Ibos (ANa) et le nourrissage au nid le 12/04 à Aureilhan-65 (DRa).

TROGLODYTIDAE

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (d=492)

Quelques chants sont signalés au coeur de l'hiver, les 23/12 à Saint-Martin-de-Seignanx (ANa), 28/12 à Montaner (FBa) et 22/01 à Asté (DRa) ; ils se généralisent à partir du 18/02 (divers obs.). Un nid est découvert dans une grange le 31/05 à Vielleségure (FCa, N. Loubeyres, P. Fonteneau). Des juvéniles sont nourris hors du nid le 4/07 à Saint-Geours-de-Marenne (FCa) et tardivement le 13/09 à 1000 m à Osse-en-Aspe (GeL, SBZ). L'espèce atteint 1760 m d'altitude le 7/06 à Arrens-Marsous (SDu).

STURNIDAE

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* (d=350)

En période de reproduction, début des chants et parades début mars (divers obs.) puis transport de matériau de nid le 22/03 à Morcenx (PUT), nourrissage au nid les 16/04 à Mazères-Lezons, 18/04 à Artiguelouve, 30/04 à Angaïs (JIG), 5/05 à Bordères-sur-l'Echez et 16/06 à Tarbes (GDu). Juvéniles volants à partir du 10/05 et début de formation de troupes postnuptiales le 10/06 (JIG).

Étourneau unicolore *Sturnus unicolor**

Étourneau roselin *Pastor roseus**

CINCLIDAE

Cincle plongeur *Cinclus cinclus* (d=49)

La seule concentration hivernale relevée concerne 5 individus le 2/12 au Lac des Gaves à Préchac (GDu). Quelques mentions hivernales en zone de plaine, notamment à Bours, Tostat (SPé), Artiguelouve (SHo, SDu), Bésingrand (JIG), Os-Marsillon (FCa, PLe) et le 27/12 au lac du Gabas (EDu). La reproduction est prouvée pour la première fois à Bénéjacq, avec un couple accompagné d'un jeune récemment envolé le 20/05 (CGr). Autres données d'intérêt, un individu est cantonné le 1/06 à Espiute, bien loin des montagnes (FCa), et des couples nourrissent 2 jeunes volants les 2/06 à Ance (FCa) et 27/06 à Nay (CGu).

MUSCICAPIDAE

TURDINAE

Merle à plastron *Turdus torquatus* (d=46)

Migrateurs tardifs le 7/11 à Sarrance (SDu) puis hivernants à Alçay le 28/12 (FCa) et à Mauléon-Licharre et Tardets-Sorholus le 31/12 (J. L. Iratchet, *vide* SDu). Premiers retours printaniers les 18/03 à Castet et 23/03 à Accous (SDu). Des migrants sont observés jusqu'à mi-avril : Messanges le 5/04 (JFe), Labenne le 7/04 (JfG), Osse-en-Aspe le 12/04 (JIG), Larrau le 13/04 avec 18 individus (SéD) et Arette le 22/04 (SDu). En période de reproduction, l'espèce est contactée dans une fourchette altitudinale allant de 1250 à 1850 m, localement en hêtraie pure (SDu). Dernier le 26/10 à Lescun (SDu).

Merle noir *Turdus merula* (d=666)

Premiers chants à partir de fin janvier (divers obs.) ; construction de nid dès le 18/02 à Tarbes (SPé), nid achevé le 29/03 à Bénéjacq (JIG), accouplements le 11/03 à Tostat (SPé), nourrissages aux nids du 10/04 au 10/05, jeunes volants du 30/04 au 12/06 (divers obs.). En montagne, l'espèce est contactée régulièrement jusqu'à 1500 m d'altitude (SDu, CIC).

Grive litorne *Turdus pilaris* (d=34)

Lors de l'hiver 2012-2013 l'espèce est notée sur 25 communes, avec des effectifs parfois impor-

tants : 100 à Sireix le 7/12 à 1450 m d'altitude (PMi), 150 à Tournus-Darré le 27/01 (FBa) et 132 à Villenave-près-Marsac le 21/02 (SPé). Derniers hivernants les 18/03 à Bilhères (SDu), 24/03 à Ger (JIG) et 29/03 à Montaner (FBa).

Grive musicienne *Turdus philomelos* (d=318)
Migrateurs observés encore le 30/03 à Vic-en-Bigorre (FBa). Premiers chants courant janvier (divers obs.) avec 8 chanteurs sur 300 m linéaires le 20/02 à Meillon (JIG). Un œuf frais trouvé au sol le 16/04 à Arette (SDu), nourrissage au nid le 15/04 à Morcenx (PUT) et jeunes juste volants le 31/07 à Sarrance (2^{ème} ponte) (SDu). En montagne, des chanteurs sont contactés jusqu'à 1760 m en vallée d'Arrens (SDu). Premiers migrateurs postnuptiaux le 30/09 à Tarbes (SPé) puis le passage bat son plein fin octobre avec par exemple, 100 à Saint-Martin-de-Seignanx le 25/10 et 200 à Messanges le 27/10 (FCa).

Grive mauvis *Turdus iliacus* (d=75)
En hivernage (décembre-février), l'espèce est notée sur 26 communes avec de faibles effectifs : maximum de 33 individus le 10/12 à Clarac (FBa). En migration pré-nuptiale, maximum de 50 oiseaux à Ustaritz le 5/03 (GoL), derniers les 28/03 à Pau (SDu) et 29/03 à Bénéjacq (JIG). Retours postnuptiaux le 20/10 à Sainte-Engrâce (SDu).

Grive draine *Turdus viscivorus* (d=57)
Troupe hivernale de 30 oiseaux le 8/11 à Aydius (SDu). Premiers chants dès fin décembre, devenant réguliers courant janvier (divers obs.), couvainson dans une chandelle de bouleau le 25/04 à Lourdios-Ichère (JIG), juvénile venant de quitter le nid le 31/07 à Sarrance (SDu) sont les seules données reçues pour cette espèce en période de reproduction. Rassemblements postnuptiaux d'individus locaux à partir de mi-août, avec de petites troupes de 15 à 25 individus (CIC, JIG, SDu).

MUSCICAPINAE

Gobemouche gris *Muscicapa striata* (d=36)
Premiers migrateurs pré-nuptiaux tardifs : 11/05 à Saint-Jean-Pied-de-Port (FCa) et 14/05 à Vic-

en-Bigorre (FBa). En période de reproduction, des chanteurs cantonnés ont été notés en altitude en juin : Campan à 1150 m, Beyrède-Jumet à 1520 m et Lées-Athas à 1450 m (SDu). Pas d'autres données de reproduction pour cette espèce fort discrète. Premiers migrateurs postnuptiaux les 22/08 à Bagnères-de-Bigorre (DRa) et 25/08 à Ger (JIG), derniers les 29/09 à Messanges (FCa) et 3/10 à Bénéjacq (JIG).

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* (d=689)

Les premiers chants sont réguliers en plaine à partir de fin janvier (divers obs.) ; en montagne des chanteurs sont notés à Aydius (1500 m) le 25/04, malgré un sol recouvert uniformément de neige (SDu) ; l'espèce atteint 1750 m d'altitude le 7/06 en vallée d'Arrens (SDu). Cinq chanteurs sur 1 km à Saint-Etienne-de-Baïgorry le 26/05 (FCa). Les données de reproduction s'étalent du 28/04 à Ustaritz (transport de nourriture, GoL) au 23/08 à Lées-Athas (juvénile juste volant issu d'une 2^{ème} ponte, SDu). Retour des hivernants début octobre avec, par exemple, 35 oiseaux à Anglet le 5/10 (FCa).

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* (d=31)

Arrivées relativement tardives : 11/04 à Aureilhan (DRa) et 16/04 à Morcenx (PUT). Encore certainement un migrateur le 27/05 à Aydius à 1070 m d'altitude (SDu). Aucune donnée d'intérêt pour la période de reproduction pour cette espèce très discrète. 4 individus chassent à la tombée de la nuit sur un chemin à Villefranche le 05/09 (JmF) ; derniers postnuptiaux les 13/09 à Momas (SDu) et 29/09 à Messanges (FCa).

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* (d=10)
Aucune donnée printanière pour l'espèce. Au passage postnuptial, observée à partir du 2/09 à Messanges avec 6 individus (FCa) puis à Bayonne et Orx (GoL, FCa) ; dernier le 29/09 à Messanges (FCa).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (d=101)
En migration pré-nuptiale, les observations vont du 19/04 au 5/05 (divers obs.). Une seule observation de l'espèce en période de reproduction :

Un **Tarier des prés** est observé très tardivement le 04/11 en Bigorre, les données postérieures à début novembre sont exceptionnelles pour ce migrateur transsaharien (photo J. BOUILLERCE).



un mâle chanteur en juin à Saint-Engrâce (MLB), puis premiers retours les 5/08 à Oloron-Sainte-Marie (RSm), 9/08 à Sainte-Marie-de-Gosse (SéD), 10/08 à Bénéjacq (JIG) et 11/08 à Espouey (SDu) pour un pic de fin août à mi-septembre. Maximum de 40 oiseaux les 2 et 4/09 à Messanges (FCa) ; derniers les 1/10 à Hendaye (FCa) et 3/10 à Bénéjacq (JIG).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* (d=147)

Premiers chants le 18/02 à Ustaritz (GoL). En période de reproduction, construction de nid le 8/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), utilisation d'anciens nids d'Hirondelle rustique à Ance et Féas (FCa), des juvéniles volants du 17/05 à Morcenx (PUT) au 9/08 à Bedous à 1520 m d'altitude (SDu). Le passage migratoire post-nuptial est sensible à partir de fin septembre (divers obs.).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (d=31)

En migration pré-nuptiale, premiers les 31/03 à Sénac (DRa), 3/04 à Urt (RSm) et 7/04 à Béné-

jacq (JIG). En période de reproduction, uniquement noté à Salles-d'Argelès (PMi), Garrosse et Morcenx (PUT). Premiers post-nuptiaux les 28/07 à Borce (SDu) et 18/08 à Bénéjacq (JIG), derniers les 9/10 à Montaner (FBa) et 18/10 à Puydarrieux (VDu).

Monticole de roche *Monticola saxatilis* (d=17)

L'espèce est observée dans une tranche altitudinale allant de 668 m à Bidarray à 2070 m à Laruns (divers obs.). Dans le cadre d'une étude de la biologie de reproduction de l'espèce, 9 territoires ont été suivis en 2013 avec les résultats suivants : seuls 4 couples étaient cantonnés avec des pontes s'étalant du 28/05 au 10/06 et des envols du 30/06 au 12/07 pour une productivité de 1,7 jeune/couple (JIG). L'influence très néfaste des conditions météorologiques du printemps 2013 fut patente. Dernière observation de l'espèce le 27/09 au col du Pourtalet (JIG).

Monticole bleu *Monticola solitarius* (d=3)

Contacté sur les sites devenus traditionnels de Sare (JfG) et Bidarray (GoL) avec une observa-

L'**Accenteur mouchet** se reproduit en altitude au-delà de la limite des forêts, mais la destination hivernale de ces individus est inconnue : fond des vallées, piémont, ou en partie au sud des Pyrénées ?
(photo P. NAVARRE).



tion hivernale de 2 oiseaux sur ce dernier site le 9/12 (SéD).

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (d=74)

Un migrateur postnuptial observé très tardivement le 4/11 à Chelle-Debat (FBa, VDU). Premiers pré-nuptiaux les 19/04 à Bénéjacq (JIG), 20/04 à Jarret (FBa, VDU) et 22/04 à Ségus (GDu). Dernier migrateur le 26/05 à Ger (JIG). En période de reproduction, observé uniquement au col de Soulor à 1470 m d'altitude (divers obs.) et au col du Pourtalet à 1700 m (JIG). Premiers migrateurs postnuptiaux les 13/08 à Lagos (JIG) et 14/08 à Ger (ANa) avec un maximum de 29 oiseaux sur ce site le 21/09 (JIG). Derniers les 20/10 à Ger (JIG), 21/10 à Vic-en-Bigorre (FBa) et 23/10 à Sare (GoL).

Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (d=139)

Premiers chants le 7/03 à Bazillac (SPé), 6 mâles sur 1 km linéaire à Ger le 24/03 (JIG) puis juvéniles volants les 12/05 à Luby-Betmont (FBa) et 15/05 à Onesse-et-Laharie (PUT). Les seules données d'altitude proviennent du col de

Soulor, avec reproduction avérée à 1490 m (divers obs.).

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (d=116)

Premiers migrateurs pré-nuptiaux le 23/03 à Saubusse (JFe), Ger (JIG) et Capbreton (FCa). Maximum de 15 oiseaux le 13/04 au lac de Soum (Arbéost) (EDu), dernier le 12/05 à Bénéjacq (CGr). En période de reproduction, nourrissages au nid le 1/07 au col de Soulor (JIG), juvéniles volants de fin juin à début août (SDu, JIG) ; l'année 2013 a vu de nombreux échecs des premières pontes et des reproductions tardives dans les Pyrénées suite aux conditions météorologiques printanières très défavorables. Passage postnuptial à partir des 10/08 à Bénéjacq (CGr) et 14/08 à Julos (FBa) pour un maximum de 36 migrateurs à Tarnos le 15/09 (FCa). Derniers les 27/10 au col de Soulor et 31/10 à Tarnos (ANa). Plusieurs individus du taxon *leucorrhoea* (Traquet du Groenland) ont été notés : 5/05 à Moliets-et-Maa (PLé) et fin septembre-début octobre à Ger pour 9 individus différents (JIG).

Traquet oreillard *Oenanthe hispanica****PRUNELLIDAE****Accenteur mouchet *Prunella modularis*** (d=289)

Premiers chants début février puis réguliers à fin février (divers obs.), juvéniles volants observés les 30/04 à Morcenx (PUT), 20/05 au col de Soulor (ANa) et 28/08 (très tardif) à Urdos (SDu). L'espèce est contactée en altitude, en période de reproduction, à 1760 m en vallée d'Arrens (SDu) et à 1850 m à Laruns (JIG).

Accenteur alpin *Prunella collaris* (d=33)

En hivernage, l'espèce est notée sur des sites où elle ne niche pas : Biarritz avec 2 individus le 22/03 (ABi), Lecumberry le 28/12 (FCa), Bidarrray les 9/12 avec 10 oiseaux (SéD) et 2/01 (FCa, SLe), Mauvezin le 3/02 (SPé), Lugagnan le 7/02 (DRa) et Soulom le 14/02 (CHo). En période de reproduction, elle est contactée dans une tranche altitudinale allant de 1590 à 2250 m (SDu, JIG), avec des juvéniles volants nourris par des adultes les 16/07 à Laruns (JIG) et 3/08 à Aydius (SDu).

PASSERIDAE**Moineau domestique *Passer domesticus*** (d=418)

En hiver (décembre-février), troupes de 60 individus à Messanges le 21/01, 50 à Saint-Pée-sur-Nivelle le 6/01 et Ustaritz le 18/02 (GoL). En période de reproduction, accouplements le 24/04 à Pau (JjH), construction de nid le 25/04 à Adast (GDu), nourrissage au nid les 9/04 à Aureilhan-65 (DRa), 2/06 (2^{ème} ponte) à Bénéjacq (JIG) et 12/06 à Tostat (SPé). Encore des juvéniles nourris par des adultes le 7/08 à Ixtasou (GoL).

Moineau friquet *Passer montanus* (d=86)

En hiver (décembre-février), contacté uniquement sur 11 communes avec des troupes de 40 individus à Ustaritz et de 20 à Villefranque (GoL). En période de reproduction, rapporté uniquement de 11 communes (divers obs.) sans autre donnée d'intérêt !

Moineau soulcie *Petronia petronia* (d=5)

L'espèce est rapportée uniquement des Hautes-Pyrénées, sur les communes de Saint-Martin avec un maximum de 10 individus le 21/03 (DRa) et Cieutat avec 22 oiseaux le 15/09 (FBa).

Niverolle alpine *Montifringilla nivalis* (d=9)

En hiver, 3 le 9/12 à Sainte-Engrâce (I. Rebours), un groupe de 20 oiseaux au lac d'Ardiden (2500 m) le 7/01 (PMi), une cinquantaine le 15/01 au col de Soulor (E. Champagne) et 2 au lac de Soum (Arbéost, 1532 m) le 17/03 (GDu). En période de reproduction, des parades le 27/05 à Barèges (PMi), unique donnée d'intérêt reçue.

MOTACILLIDAE**Bergeronnette printanière *Motacilla flava*** (d=54)

Une retardataire rencontrée le 20/11 à Artix (JFe). Puis, le premier retour est signalé le 03/04 à Saint-Etienne-d'Orthe (FCa). La migration atteint un pic entre le 19/04 et le 04/05 avec respectivement 30 oiseaux à Bénéjacq (JIG) et 40 à Bassussarry (GoL). Le passage automnal débute à partir du 04/08 à Arbéost (SDu, MLB). Le pic du passage se situe début septembre avec 300 individus dénombrés le 02/09 et 200 le 04/09 à Messanges, ou 120 en trois groupes en migration active le 06/09 à Tarnos (FCa). Le dernier individu est contacté le 26/10 (FCa). Quatre oiseaux de la sous-espèce *M. f. flavissima* sont observés le 04/05 à Bassussarry (GoL).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* (d=114)

Des jeunes sont vus à Lourdios-Ichère le 17/05 (JIG, SHo), puis à Salles le 06/06 (PMi) et à Estérençuby le 24/06 (GoL). La dispersion postnuptiale emporte des oiseaux jusqu'à 1650 m d'altitude le 09/08 à Laruns (CIC). La migration automnale est signalée en octobre sur la côte (divers obs.), parfois en mer au large de Saint-Jean-de-Luz, des oiseaux coupant vraisemblablement le golfe de Gascogne pour rejoindre les côtes nord-espagnoles (FCa).

Bergeronnette grise *Motacilla alba* (d=428)

Les effectifs en dortoirs hivernaux n'atteignent pas les valeurs des deux hivers précédents, avec au mieux le quart des effectifs : par exemple 50 à Saubusse le 20/12 (FCa), 63 à Itxassou le 05/01 (GoL) ou 47 à Saint-Gein le 13/01 (CIC). En période de reproduction, les premiers transports de nourriture sont notés le 11/04 à Camou-Cihigue, puis le 11/05 à Ustaritz (GoL). Un individu est observé le 14/06 à 1800 m d'altitude au col du Pourtalet (JIG). La migration d'automne s'installe courant septembre et un maximum de 200 oiseaux est dénombré le 26/10 à Messanges (FCa).

Bergeronnette de Yarrell *Motacilla alba yarrellii* (d=20)

Présente à Anglet du 04/11 au 13/02 (FCa, GoL). L'hivernage demeure cantonné aux communes proches du littoral basque et sud landais, les dernières observations ayant lieu le 04/03 à Saubusse (FCa) et Briscous (SéD). Sept individus dénombrés le 23/10 à Saint-Pée-sur-Nivelle marquent les premiers retours automnaux (GoL).

Pipit de Richard *Anthus richardi* (d=11)

Un premier oiseau est photographié le 03/11 à Sare (SéD) puis l'hivernage à l'aéroport d'Anglet débute le 23/11 (GoL). Les effectifs sur ce site atteignent un maximum de 6 oiseaux le 29/01 et un dernier s'attarde jusqu'au 02/03 (GoL, FCa, SéD, EDu). À l'automne, deux individus sont observés à Ger le 27/10 (JIG), puis 3 le 29/10 (CHo).

Pipit rousseline *Anthus campestris* (d=14)

Une seule donnée printanière cette année, le 10/05 à Bartres (CHo). Les autres oiseaux sont vus lors du passage postnuptial, à partir du 31/08 à Ger avec trois individus en halte (JIG) ; ils sont dès lors observés sur un large front traversant les Pyrénées notamment au col de Soulor le 03/09 (JIG). Les autres communes sont Messanges, Bénéjacq, Tarnos, Montaner, Etchébar, Laruns et Moulédous (divers obs.). Les derniers migrants sont observés à Ger le 06/10 (JIG).

Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni* (d=1)**

Ce pipit sibérien est d'occurrence très rare en France. Un individu était en compagnie d'un groupe de Pipits farlouses en halte migratoire à Lecumberry le 28/09 (SéD) (sous réserve d'homologation par le CHN).

Pipit des arbres *Anthus trivialis* (d=84)

Les précurseurs printaniers apparaissent le 19/03 à Léon (PLe / RNNCH). Les suivants, probablement ralentis par le mauvais temps, ne sont décelés que les 04/04 à Bénéjacq (JIG) et 07/04 à Morcenx (PUT). Les altitudes les plus élevées atteintes par des chanteurs cantonnés sont de 1850 m à Arrens-Marsous (SDu), 1750 m à Urdo (SDu, PNa) et 1650 m à Laruns (JIG). À Bidarray, 7 chanteurs sont dénombrés sur 1,8 km le 16/06 (FCa). Les premiers migrants sont vus à Saubusse le 22/08 (FCa), mais les premiers groupes d'importance se signalent à Messanges avec 20 oiseaux le 02/09 et 30 le 04/09 (FCa). Encore 20 le 30/09 à Osse-en-Aspe (GeL, SBV), le dernier étant noté à Montaner le 25/10 (FBa).

Pipit farlouse *Anthus pratensis* (d=364)

Jusqu'à 70 individus sont dénombrés en hivernage le 23/12 à Tarnos, 70 également à Pey le 08/01 et à Ustaritz le 19/03 (GoL). En moyenne pourtant en hiver, les oiseaux sont rassemblés en groupes de 9 à 10 individus. La migration de printemps s'amorce à partir du 02/03 à Hendaye (FCa). Plusieurs groupes en migration active sont signalés le 05/04 à Montaner totalisant une cinquantaine d'oiseaux (FBa) ; les derniers du printemps sont vus à Ustaritz le 29/04 (GoL). Retours à partir du 12/09 à Poumarous (DRa), déjà 60 au lac du Gabas le 27/09 (JIG) et des effectifs de 100 à 200 font halte sur les pelouses du col de Soulor le 08/10 (DRa). La migration reste très active en octobre avec également 100 individus cumulés à Messanges le 27/10 (FCa).

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus**

Pipit maritime *Anthus petrosus* (d=9)

Observé à l'unité entre Anglet et Tarnos du 06/11 au 10/02 (divers obs.).

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (d=105)



Le dortoir d'Arette, qui avait accueilli au moins 4 millions de **Pinsons du Nord** au cours de l'hiver 2010-2011, s'est reconstitué cet hiver avec plusieurs centaines de milliers d'individus, attirant des prédateurs comme ce **Faucon pèlerin** (photo P. NAVARRE).

Les hivernants de plaine ont déjà transhumé pour certains en novembre. Ainsi, à Saint-Martin-de-Seignanx le 03/11, 2 individus sont observés (GoL). Un également les 06/11 à Aureilhan (DRa) et 11/11 à Hontanx (CIC). Des hivernants demeurent toutefois en altitude, comme à Arrens-Marsous (1600 m) avec un rassemblement de 27 individus le 06/01 (GDu). 30 également en plaine à Rivière-Saas-et-Gourby le 09/01 et encore le 22/03 (FCa). Les premiers chanteurs se font entendre le 31/03 à Accous (SDu, SLe) ; la reproduction s'installe pleinement courant mai, juin, juillet avec des transports de nourriture jusqu'au 06/07 (SDu). Des juvéniles sont aperçus encore le 10/08 à Laruns (CIC), montrant que la reproduction s'attarde en été. Des comportements territoriaux sont remarqués jusqu'en septembre à Itxassou (FCa). Les premiers migrateurs sont observés en plaine le 27/10 à Messanges (FCa).

FRINGILLIDAE

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* (d=689)
100 oiseaux migrent à Sare le 3/11 (SéD), 500 à Anglet le lendemain (FCa). Troupes hivernales de 3000 ind. le 10/12 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), 1500 le 8/12 à Biarrotte (SéD) et 1000 le 28/01 à Bassussary (GoL). Premiers chanteurs les 18/02 à Ustaritz et 19/02 à Jatxou (GoL), suivis du 1^{er} chant bigourdan le 22/02 à Aureilhan (DRa). La migration printanière est observée les 15/03 à Ustaritz (GoL) et 19/03 avec 500 oiseaux à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Premières parades le 9/04 à Saint-Pierre-d'Irube et construction d'un nid le 11/05 à Cambo-les-Bains (GoL), nourrissages le 23/05 à Montaner (FBa) et 1^{ers} jeunes le 27/05 à Morcenx (PUT). Migration automnale détectée le 18/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), puis 3000 en 20 min. d'obs. le 21/10 à Anglet et 1000 à Messanges le 27/10 (FCa).

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* (d=172)

200 oiseaux sont posés sur un semis le 3/11 à Moulédous (FBa). Le dernier migrateur est observé le 9/11 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). En hivernage, 3000 le 8/12 à Biarrotte (SéD), 500 le 10/12 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et 200 le 31/01 à Montaner (FBa). Seul est visité le dortoir d'Arette au sein duquel plusieurs centaines de milliers d'oiseaux se rassemblent le 20/12 (SDu). Une remontée de gros effectifs printaniers est notée un peu partout : par exemple, 10000 le 1/03 à Lanne-65 (DRa), 13000 le 21/03 à Saint-Martin (DRa) ou encore 900 le 12/03 à Boeil-Bezing (JIG). Derniers les 29/03 à Montaner (FBa), 2/04 à Bénéjacq (JIG) et 8/04 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). Retour automnal les 18/10 à Arbéost (JIG) et 20/10 à Saint-Engrâce (SDu) et Bidarray (JfG).

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (d=10)

Troupes de 32 oiseaux à Tostat le 7/12 (SPé), 30 à Vic-en-Bigorre le 17/01 et autant à Montaner le 9/02 (FBa). L'espèce est contactée jusqu'à 1550 m d'altitude le 7/11 à Aydius (SDu). 7 oiseaux migrent encore le 19/12 à Morcenx (PUT). Maigres indices de reproduction, puisque seul un chanteur est entendu le 19/03 à Clarac (FBa).

Roselin cramoisi *Erythrina erythrina***

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (d=69)
Présent jusqu'à 1800 m le 2/11 à Laruns (SDu). Observé seulement à l'unité sur 37 communes (divers obs). Un oiseau chante le 2/12 à Ustaritz puis le 18/02 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL). Des transports de nourriture sont notés le 1/06 à Chéraute (XBa, B. Ducoat), des jeunes à peine volants le 17/08 à Borce (1350m) (SDu) et des jeunes volants à Clarac le même jour (FBa).

Verdier d'Europe *Chloris chloris* (d=258)
En hiver, troupe de 25 le 20/11 à Messanges et de 20 le 4/02 à Bénésse-Maremne (GoL). Premiers chants le 31/01 à Ustaritz (GoL). Des juvéniles sont observés les 24/04 à Bénésse-Maremne et 28/04 à Ustaritz (GoL), et le 1/06 à Arrast-Larrebieu (FCa, N. Loubeyres, P. Fonte-

neau). L'espèce est jugée nicheuse probable jusqu'à une altitude de 1470 m à Arbéost (SDu) et de 1550 m à Beyrède-Jumet dans une sapinière claire (SDu). Déjà 2 migrateurs le 23/09 à Ustaritz (GoL) ; 60 en dortoir le 24/09 à Orx (FCa).

Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (d=72)
300 migratrices le 4/11 à Anglet (FCa). La plus grosse troupe observée en hiver compte 152 ind. le 9/11 à Ustaritz (GoL). La migration pré-nuptiale débute le 23/03 à Orx (FCa) pour s'achever le 23/04 à Saint-Marie-de-Gosse (SDu, JIG). Chanteuse le 13/04 à Arrens-Marsous (1547m) (EDu). Côté reproduction, un adulte nourrit un juv. volant à Laruns (2000 m) le 4/09 (SDu). Nicheurs probables à Ger et Arbéost (ANa), Saint-Pée-sur-Nivelle (FCa), Bidarray, Itxassou et Souraïde (GoL) ainsi qu'à Ossun (GDu). 30 oiseaux présents à Messanges le 26/10 et 50 le lendemain (FCa).

Linotte à bec jaune *Linaria flavirostris***

Sizerin flammé *Acanthis flammea / cabaret*** (=1)
Un oiseau le 15/11 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa), unique mention de l'espèce.

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* (d=21)
Un chanteur à Lées-Athas le 31/01 et jusqu'à 15 individus le 8/05 à Arette (SDu). Contactée jusqu'à 1850 m d'altitude le 28/06 à Laruns (JIG), l'espèce est observée sur 15 communes dont une seule côtière, Anglet, le 12/12 (FCa). Un passage postnuptial en direction du sud-ouest est décelé les 21/10 à Licq-Athérey et 22/10 à Ossas-Suhare (SDu).

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (d=306)
Encore 100 migrateurs le 4/11 à Anglet (FCa). Durant l'hiver, des troupes de 200 oiseaux le 27/12 à Eslourenties-Daban (EDu) et 50 à Tarnos le 12/12 (FCa). Premier chanteur le 6/03 à Ustaritz (GoL). Un couple construit un nid le 13/04 à Rabastens-de-Bigorre (FBa) alors que 10 oiseaux migrent encore le 23/04 à Saint-Laurent-de-Gosse (JIG). L'espèce se reproduit avec certitude à Argelès-Gazost (transport de nourri-



Deux observations de **Chardonneret élégant** à 1700-1800 m à Laruns : l'espèce n'hésite pas à s'élever très haut en montagne, même si elle devient plus localisée au-delà de 1000 m (photo J. FERRÉ).

ture le 25/04, GDu), Ibos (couveur observé le 25/05 et présence de 2 juv. le 23/06, ANa), Ustaritz (GoL), Bugnein (PLe), Arrast-Larrebieu (FCa, N. Loubeyres, P. Fonteneau) et Morcenx (envol de 2 jeunes le 27/07, PUT). En montagne, elle atteint 1550 m le 5/06 à Beyrède-Jumet (SDu), 1700 et 1821 m les 5/07 et 10/08 sur deux sites de la commune de Laruns (JIG, CIC). 200 en migration le 27/10 à Messanges (FCa).

Venturon montagnard *Carduelis citrinella* (d=10)

La reproduction est notée seulement possible ou probable sur les communes d'Arette, Lées-Athas, Urdos (SDu, PNa), Urdos (SDu, PNa), Laruns (JIG), Barèges (CHo) et Campan (SDu). Un individu signalé le 16/06 à Lacarry (AAAn) était probablement en dispersion. Regroupement postnuptial de 60 oiseaux le 22/07 à Lées-Athas (PUT, SDu, SHo).

Serin cini *Serinus serinus* (d=90)

L'espèce est très peu mentionnée en hiver. Premiers chanteurs les 16/02 à Ibos (ANa) et 18/02 à Saint-Pierre-d'Irube et Ustaritz (GoL). Observation de juvéniles les 1/06 à Charre (FCa, N. Loubeyres, P. Fonteneau) et 4/06 à Ustaritz (GoL). Un couple est contacté à 1800 m d'altitude le 3/06 à Laruns (JIG). Chant automnal le 26/10 à Montaner (FCa). Des oiseaux en migration active le 27/10 à Messanges (FCa).

Tarin des aulnes *Spinus spinus* (d=179)

750 migrateurs le 4/11 à Anglet, les derniers mouvements étant détectés le 12/11 à Tarnos (SDu). Troupes hivernales de 100 le 19/11 à Messanges (FCa), 80 le 4/02 à Bénésse-Mareme et 70 à Messanges le même jour (GoL). Des troupes de 50 oiseaux sont plus communément observées, notamment à Saint-Martin-de-Seignanx et Orx (GoL) ou encore Briscous (SéD). Des chanteurs sont entendus le 22/02 à Saint-

Martin-de-Seignanx (FCa) et le 18/03 à Montaner (FBa). La migration pré-nuptiale s'étend du 21/03 à Morcenx (PUT) au 23/04 à Sainte-Marie-de-Gosse (SDu, JIG). L'espèce est contactée en période de reproduction en montagne à Accous (1400 m) le 10/05 et à Laruns (750 m) le 14/07 (SDu). Retour le 23/10 à Sare (GoL), le 25/10 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa) et le 26/10 à Messanges avec 300 oiseaux puis 500 le lendemain (FCa).

EMBERIZIDAE

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* (d=2)
Deux oiseaux sont observés le 3/11 à Tarnos, le premier sur la digue, le second sur la dune (GoL).

Bruant lapon *Calcarius lapponicus** (d=1)
Observation d'un individu sur la station d'épuration de Capbreton le 9/02 (JfG).

Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos***

Bruant jaune *Emberiza citrinella* (d=87)
Troupe hivernale de 20 oiseaux le 5/11 à Moulédous (FBa) et de 10 le 13/02 à Lacassagne (DRa, FBa, JmF). Premiers chants à Montaner le 9/03 (FBa), le lendemain à Ger (ANa), le 31/03 à Sénac (DRa) puis jusqu'à une altitude de 1650 m à Aydius le 17/05 malgré la présence d'une neige abondante (SDu). Présence en période de reproduction jusqu'à 1821 m à Laruns (CIC). La reproduction est certaine à Ger et Arbéost avec des transports de nourriture, respectivement les 14 et 21/07 (ANa), à Bedous (1530 m) où des jeunes quémament de la nourriture le 9/08 (SDu). Jeunes volants également le 13/08 à Etsaut (SDu) et le 27/08 à Hasparren (GoL). Troupe de 26 à Boû-Silhen le 27/10 (GDu).

Bruant zizi *Emberiza cirulus* (d=124)
L'espèce est observée sur 52 communes. Des groupes de 28 oiseaux le 23/12 à Tarnos (FCa), 19 le 30/01 au même endroit (EDu) et 6 le 11/11 à Briscous (SéD). Chants hivernaux les 25/12 et 30/01 à Ustaritz (GoL) et le 9/02 à Anglet (FCa), puis le 1/03 à Lugagnan (DRa), le 5/03 à Denquin et Tarsacq (JIG). Des transports de nourri-



Le **Bruant des roseaux** demeure commun en hivernage dans les vallées cultivées très ouvertes, exploitant les fossés et canaux de drainage qui délimitent les grandes parcelles de maïs moissonné (photo D. RAGUET).

ture sont observés du 26/04 à Saint-Pierre-d'Irube (GoL) au 3/07 à Précilhon (SDu), l'espèce effectuant deux pontes annuelles. Des jeunes volants le 4/07 à Bénésse-Maremne (FCa), et plus tardivement le 5/08 à Oloron-Sainte-Marie (SDu). Chant automnal le 31/10 à Anglet (FCa).

Bruant fou *Emberiza cia* (d=33)
Espèce hivernante sur 13 communes (divers obs), avec notamment 18 oiseaux à Ger-65 le 26/02 et 14 à Lourdes le 23/12 (GDu), ou encore 9 à Sénac le 13/02 (DRa, FBa, JmF). Premiers chants le 18/04 à Mendive (AAn). La reproduction est possible ou probable à Espelette (AHG), Bidarray (GoL), Itxassou (JfG), Saint-Engrâce, Arette, Léas-Athas, Etsaut, Aydius (SDu), Arrens-Marsous (EDu), Ségus (SDu, SHo) et Jarret (VDu, FBa) et certaine à Borce le 24/07 avec

un juv. volant qui quémande de la nourriture (SDu). L'espèce est contactée jusqu'à 1640 m d'altitude à Urdos le 11/07 (SDu).

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* (d=3)

Observé sur l'unique commune de Laruns au col du Pourtalet, avec des chanteurs jusqu'à 1900 m (JIG, PUT, SHo).

Bruant nain *Emberiza pusilla***

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (d=150)

150 oiseaux migrent le 4/11 à Anglet, le dernier mouvement étant détecté le 9 de ce mois à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa). En hiver, 100 à Pey le 8/01 et 70 à Ustaritz le 6/12 (GoL), 60 à Moulédous le 31/12 (FBa). Un oiseau en halte migratoire à la mangeoire le 4/03 à Morcenx (PUT). Dernier contact le 24/03 à Ger (JIG). 5 chanteurs dans les barthes de Pey le 28/06 (FCa). Un adulte alarme le 6/08 à Biscarosse (FCa). Retour de l'espèce le 7/10 à Puydarrieux (VDu), le 17/10 à Léon avec 50 ind. (PLe) et le 20/10 à Ger (JIG). Troupe de 200 à Messanges le 26/10 (FCa).

Bruant proyer *Emberiza calandra* (d=36)

Jolie troupe hivernale de 60 oiseaux le 9/02 à Lacassagne parmi lesquels un individu leucique est repéré (FBa) et revu au même endroit le 13/02 parmi 30 oiseaux (FBa, DRa, JmF). 11 à Ger le 3/03 (ANa). Chants balbutiants le 19/01 à Montaner, plus aboutis le 25/02 sur cette même commune (FBa). Mauvaise année pour l'espèce, puisque des chanteurs ne sont signalés que sur 9 communes du bassin de l'Adour, dont Sare (AAn). Un migrateur postnuptial le 27/10 à Messanges (FCa) et un groupe de 9 individus le même jour à Saint-Sever (FBa).

ESPECES ÉCHAPPEES DE CAPTIVITE

(catégorie E de la *Liste officielle des Oiseaux de France*)

ANATIDAE

Cygne noir *Cygnus atratus* (d=17)

L'individu de Saint-Sever est de nouveau signalé entre le 10/11 et le 13/01 (CIC). Les autres mentions proviennent du marais d'Orx, où un seul individu est présent tout au long de la période considérée (divers obs.). C'est probablement ce dernier oiseau qui est signalé le 23/12 sur la réserve de Saint-Martin-de-Seignanx (ANa) et le 18/04 sur l'étang d'Yrieu (GoL).

Canard des Bahamas *Anas bahamensis* (d=1)

6 individus sont observés ponctuellement le 31/12 sur le lac du Gabas (ANa).

Nette demi-deuil *Netta peposaca* (d=1)

1 le 15/11 à Saint-Martin-de-Seignanx (FCa).

PSITTACIDAE

Perruche ondulée *Melopsittacus undulatus* (d=2)

1 les 17/06 et 28/10 à Ustaritz, probablement échappée dans le voisinage (GoL).

Inséparable rosegorge *Agapornis roseicollis* (d=1)

1 le 25/10 à Peyrehorade (PLe).

Volume 13 : complément et erratum

GRANGÉ J.-L., 2013. Le Pic de Lilford *Dendrocopos leucotos lilfordi* (SHARPE & DRESSER, 1871) : historique de sa découverte et réflexions sur les tribulations de ses dénominations taxinomiques. *Le Casseur d'os*, vol. 13: 96-122.

Précision sur les spécimens utilisés par SHARPE et DRESSER pour décrire le Pic de Lilford en 1871

En sus du spécimen en provenance d'Épire qui a servi à décrire le taxon *lilfordi*, 9 autres individus ont été examinés par les auteurs dont 6 se trouvent au Muséum de Manchester. Bien que 2 d'entre eux portent la mention « type » de la main de DRESSER, M. Henry MCGHIE (Directeur des collections du Muséum de Manchester) m'indique qu'ils doivent être plutôt considérés comme « paratypes ». Nous ignorons où se trouvent les 2 spécimens restants, récoltés par T. KRÜPER.

Jean-Louis GRANGÉ

Erratum: Tableau 3 des effectifs du Pic de Lilford

Suite à une erreur de saisie dans le Tableau 3, page 112, certaines fourchettes d'effectifs du Pic de Lilford sont incomplètes (absence de la valeur haute). Les effectifs exacts sont présentés dans le corps du texte. Voici le Tableau corrigé.

Tableau 3. Effectifs de *Dendrocopos leucotos lilfordi*

Pays	Nombre de couples	Évolution	Source
France	300 - 400	Stable	GRANGÉ (2001)
Espagne	78- 95	Stable	MARTI & DEL MORAL (2003)
Italie	250-350	Decrease	PERONACE et al., 2012
Grèce	200 - 500	Stable	A. SAKOULIS (<i>in litt.</i>) 2002
Albanie	200 - 500	Decrease	B. TAULANT (<i>in litt.</i>) 2002
Turquie	500-900 ³	Decrease	J.& A. TAVAREZ, K.A. BOYLA (<i>in litt.</i>) 2010
Croatie	1300 - 1800	Stable	D. CIKOVIC (<i>in litt.</i>) 2010
Serbie	500 - 1000	Stable	BIRDLIFE INTERNATIONAL (2004), M. RAKOVIC (2011)
Slovenie	20 - 30	Rare	J. GRÉGORI (<i>in litt.</i>), 1996 ; M. PERUSEK, 2006
Bosnie	<10 ⁴	Rare	B. GASIC (<i>in litt.</i>) 2010
Macédoine ¹	200 - 400	Stable ?	BERNONI (1984)
Bulgarie	700-1100	Decrease	SPIRIDINOV <i>et al.</i> , 2011
Roumanie	<100	Rare	A. SANDOR (<i>in litt.</i>) 2005
Géorgie	1000-1200 ⁵	Unknown	G. RAJEBASHVILI (<i>in litt.</i>) 2011
Azerbaïdjan	0 - 10	Rare	E. SULTANOV (<i>in litt.</i>) 2010
Arménie	0 - 10	Accidentel	www.armeniabirding.info (National Bird List)
Russie (Caucase)	1000-1200 ⁵	Unknown	/
Total²	6358-9605		

1 – Classé comme vulnérable sur la Liste rouge de ce pays.

2 – avec une hypothèse de 1000 - 1200 couples en Géorgie et Russie.

3 – Estimation grossière, selon les auteurs.

4 – B. GASIC me précise que, du point de vue faunistique : « *In this way B&H is the worst explored country in region* ».

5 – Estimations proposées par l'auteur. Aucune estimation disponible pour l'espèce dans ces pays.